



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

NYPL RESEARCH LIBRARIES



3 3433 06910229 5

Heiligensteins

Lug. Klein 10 giugno 1831 — a — 12 Km
Ortaria 23 gennaio 1830 —

Effemeridi
3-ONV

406




EFFEMERIDI ASTRONOMICHE
DI MILANO
PER L'ANNO 1830

CON

APPENDICE
DI OSSERVAZIONI E MEMORIE
ASTRONOMICHE.



MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA
1829.



I N D I C E.

<i>Spiegazioni dei simboli e delle abbreviazioni</i>	<i>pag. v</i>
<i>Feste mobili, numeri dell'anno e quattro tempora</i>	<i>" vi</i>
<i>Eclissi dell'anno 1835, obliquità apparente dell'eclittica e mutazione dei punti equinoziali in longitudine</i>	<i>" vii</i>
<i>Occultazioni delle principali stelle dietro la Luna per l'anno 1830</i>	<i>viii</i>
<i>Fenomeni ed osservazioni, posizioni del Sole, della Luna e dei Satelliti di Giove</i>	<i>" i</i>
<i>Semidiametro del Sole, tempo impiegato dal Sole a passare pel meridiano, e longitudine del nodo della Luna di 6 in 6 giorni</i>	<i>73</i>
<i>Posizioni dei pianeti</i>	<i>" 74</i>
<i>Ascensioni rette delle 36 Stelle principali tratte dal catalogo compilato dal signor Baily</i>	<i>" 88</i>
<i>Declinazioni delle 36 Stelle principali tratte dal catalogo compilato dal signor Baily</i>	<i>" 89</i>

A P P E N D I C E.

<i>Nota sull'interpolazione dei luoghi della Luna di Barnaba Oriani</i>	<i>3</i>
<i>Obliquità dell'eclittica dedotta dalle osservazioni solstiziali del medesimo</i>	<i>" 9</i>
<i>Sulla piccola ineguaglianza del moto della Terra che ha per argomento la longitudine del Sole meno il perigeo della Luna di Francesco Carlini</i>	<i>57</i>
<i>Declinazioni di stelle determinate col circolo meridiano del R. Osservatorio di Modena da Giuseppe Bianchi</i>	<i>109</i>
<i>Ascensioni rette della Luna osservate e paragonate colle tavole da Francesco Carlini</i>	<i>117</i>
<i>Osservazioni della Cometa periodica dell'Enke fatte al settore equatoriale di cinque piedi da Francesco Carlini</i>	<i>156</i>
<i>Osservazioni meteorologiche fatte alla Specola di Milano nell'anno 1827 da G. Angelo Cesaris</i>	<i>157</i>

AVVERTIMENTO.

Nell'indicare alcune variazioni che nel presente volume si sono introdotte, relative alla disposizione dei diversi articoli ed agli elementi del calcolo delle Effemeridi, è dovere ancora di render nota la molta parte di merito che nel calcolo medesimo hanno avuta i signori Abate Giovanni Cappelli e Roberto Stambucchi, i quali sotto l'operosa direzione del primo allievo signor Don Paolo Frisiani vi si sono applicati con grande impegno e con grande diligenza.

Seguendo l'esempio dato dal signor Enke editore delle nuove Effemeridi di Berlino, abbiamo noi pure sostituito da per tutto il tempo medio astronomico al tempo vero, ed abbiamo calcolato per mezzodi medio le posizioni del Sole e dei pianeti, e pér mezzodì e mezzanotte medi quelle della Luna. Devonsi solo eccettuare le fasi lunari ed il nascere e tramontare del Sole che per uniformarci all'uso comune si sono espressi in tempo vero.

Puomo inoltre riformate le tavole del Sole impiegate al calcolo delle longitudini e dei logaritmi delle distanze giusta i nuovi elementi pubblicati dal signor Bessel (*Astronomische Nachrichten*, n.^o 133), da cui non ci siamo dipartiti che in ciò che riguarda l'ineguaglianza lunare, per la quale abbiamo adottato il coefficiente determinato dal signor Airy (*Transazioni filosofiche pel 1828*) e le formole risultanti dai calcoli esposti nell'appendice a questo volume, pag. 57.

APPENDICE ALL'EFFEMERIDI 1830.

	<i>Errori.</i>		<i>Correzioni.</i>
Pag. 57 lin. 3	11 agosto		12 agosto
" 69 " 11	3 ^{II} ,18		2 ^{II} ,18

APPENDICE ALL'EFFEMERIDI 1830.

	<i>Errori.</i>		<i>Correzioni.</i>
Pag. 76 lin. 9	terza perturbatrice		forza perturbatrice
" 102 " 5	i due termini		i tre termini

S P I E G A Z I O N E D E I S I M B O L I E D E I L E A B B R E V I A T U R E.

SEGNI DEL ZODIACO.

- ♈ Ariete.
- ♉ Tèro.
- ♊ Gemelli.
- ♋ Cancro.
- ♌ Leone.
- ♍ Vergine.
- ♎ Libra.
- ♏ Scorpione.
- ♐ Sagittario.
- ♑ Capricorno.
- ♒ Aquario.
- ♓ Pesci.

○ Sole.

- ⌚ indica Giorni.
- ⌚ Ore.
- ⌚ Segni.
- ⌚ Gradi.
- ⌚ Minuti.
- ⌚ Secondi.
- ⌚ Congiunzione.
- ⌚ Opposizione.
- ⌚ Nodo ascendente.
- ⌚ Nodo discendente.

PIANETI.

- ☿ Mercurio.
- ♀ Venere.
- ♂ Terra.
- ♂ Marte.
- ♃ Cerere.
- ♄ Pallade.
- ♅ Giunone.
- ♆ Vesta.
- ♇ Giove.
- ♈ Saturno.
- ♉ Urano.

☽ Luna.

- ☿ indica Mattina.
- ☽ Sera.
- ▲ Australe.
- ▼ Boreale.
- diff. Differenza.
- dist. min. Distanza minima.
- imm. Immersione.
- em. Emersione.
- AR. Ascensione retta.
- Lat. Latitudine.

FESTE MOBILI.

Settuagesima	7	Febbrajo.
Giorno delle Ceneri	24	Febbrajo.
Pasqua di Risurrezione	11	Aprile.
Litanie alla Romana	17 18 19	Maggio.
Ascensione del Signore	20	Maggio.
Litanie all'Ambrosiana	24 25 26	Maggio.
Pentecoste	30	Maggio.
Santissima Trinità	6	Giugno.
Corpus Domini	10	Giugno.
Avvento all'Ambrosiana	14	Novembre.
Avvento alla Romana	28	Novembre.

NUMERI DELL'ANNO.

Numero d'Oro	7.
Ciclo Solare	19.
Epatta	6.
Indizione Romana	3.
Lettera Domenicale	C.

QUATTRO TEMPORA.

Di Primavera	3	5	6	Marzo.
D'Estate	2	4	5	Giugno.
D'Autunno	15	17	18	Settembre.
D'Inverno	15	17	18	Dicembre.

ECLISSI DELL' ANNO 1830.

ebbrajo. Eclisse di Sole invisibile a Milano.

Congiunzione vera della Luna col Sole a $17^h 27'$.

März. Eclisse di Luna invisibile a Milano.

Principio dell'Eclisse a $23^h 47'$.

Fine a $4^h 14'$.

März. Eclisse di Sole invisibile a Milano.

Congiunzione vera della Luna col Sole a $3^h 28'$.

Agosto. Eclisse di Sole invisibile a Milano.

Congiunzione vera della Luna col Sole a $0^h 34'$.

Settembre. Eclisse di Luna visibile in tutta l'Europa.

Principio dell'Eclisse a $9^h 26'$.

Fine a $13^h 8'$.

Settembre. Eclisse di Sole invisibile a Milano.

Congiunzione vera del Sole colla Luna a $15^h 0'$.

Giorni dell'anno	Obliquità apparente dell'eclittica.	Nutazione de' punti equinoziali in longit.	Giorni dell'anno	Obliquità apparente dell'eclittica.	Nutazione de' punti equinoziali in longit.
0	$23^{\circ} 27' 31,5''$	- 1,6	190	$23^{\circ} 27' 31,8''$	- 4,3
10	27 31,6	- 1,3	200	27 31,9	- 4,1
20	27 31,8	- 1,2	210	27 32,1	- 4,0
50	27 32,1	- 1,2	220	27 32,3	- 4,1
40	27 32,3	- 1,4	230	27 32,5	- 4,4
50	27 32,4	- 1,8	240	27 32,7	- 4,8
60	27 32,6	- 2,2	250	27 32,8	- 5,2
70	27 32,8	- 2,8	260	27 32,9	- 5,8
80	27 32,8	- 3,3	270	27 32,9	- 6,4
90	27 32,7	- 4,0	280	27 32,9	- 6,9
100	27 32,6	- 4,6	290	27 32,8	- 7,5
110	27 32,5	- 5,0	300	27 32,6	- 7,8
120	27 32,3	- 5,2	310	27 32,5	- 8,0
130	27 32,2	- 5,3	320	27 32,3	- 8,2
140	27 32,0	- 5,4	330	27 32,2	- 8,0
150	27 31,8	- 5,3	340	27 32,1	- 7,8
160	27 31,7	- 5,0	350	27 32,0	- 7,6
170	27 31,7	- 4,8	360	27 32,0	- 7,3
180	27 31,7	- 4,5	365	27 32,0	- 7,1

**OCCULTAZIONI DELLE PRINCIPALI STELLE DIETRO LA LUNA
PER L'ANNO 1830 A MILANO.**

Giorni del mese.	Stelle occultate.	Tempo della inamera.	Tempo della emers.	Distanza dal cerchio della D nell' em.	Cong. appar. sull' orbita.	Distanza minima dal lem. della D.
Genn. 2	μ X . . . 5.	7 ^h 44'	8 ^m 33'	62 ^s A		
13	τ ζ . . . 4	10 38	11 46	75 B		
Febb. 7	ξ \circ . . . 5	8 10	9 25	47 B		
13	κ Π . . . 4	10 9	11 18	46 A		
Marzo 1	α β . . . 2	2 ^h 12'	3' 30''
14	η Δ . . . 4.5	16 3	16 50	86 A		
28	δ^1 β . . . 5	8 15	9 3	59 B		
28	π Ω . . . 1	11 40	3 15 B
Aprile 5	τ Ω . . . 4	8 41	9 22	76 A		
7	δ Π . . . 4.5	16 15	16 42	46 B		
Mai. 24	α β . . . 1	19 30	20 1	50 B		
24	η Δ . . . 4.5	10 00	11 42	78 B		
5	m Π . . . 5	15 10	3 0 B
18	α β . . . 1	15 28	4 45 B
27	η Π . . . 3.4	9 30	10 45 B
Luglio 16	α β . . . 1	10 30	11 22	62 B		
Agosto 6	ϕ 5	9 44	10 8	10 A		
Sett. 6	μ Balana. 4	12 30	12 30 A
Ottob. 5	γ β . . . 3.4	10 41	12 25	75 B		
5	δ^1 β . . . 5	15 0	16 13	70 B		
Nov. 5	α β . . . 1	19 12	19 43	37 B		
14	Ω	15 58	16 20	12 B		
29	γ β . . . 3.4	8 20	9 7	86 A		
29	δ^1 β . . . 5	13 9	1 30 A
29	π β . . . 1	16 17	17 12	50 B		

GENNAIO 1830.

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSI DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
1	Primo quarto 15 ^h 11'	14	I. SATELLITE.
8	Plenilunio 16 9	15	5 5' 52" imm.
16	Ultimo quarto 16 40	17	23 34 16
24	Novilunio 5 32	19	18 2 42
30	Primo quartò 23 24	21	12 31 5
	CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE.	23	6 59 30
2	μ Η 5. ^a 7 25	24	1 27 53
5	γ Β 3. 4. ^a 1 1	26	19 56 18
5	θ Β 5. ^a 12 21	28	14 24 30
5	α Β 1. ^a 16 4	30	8 53 5
8	λ □ 4. 5. ^a 10 33	31	3 21 36
11	ο Ω 4. ^a 6 57	21	21 49 50
13	τ Ω 4. ^a 12 48		II. SATELLITE.
14	β ΙΙΙ 3. 4. ^a 0 6	14	9 25 53
15	θ ΙΙΙ 4. 5. ^a 19 1	17	22 44 10
17	χ ΙΙΙ 4. ^a 3 55	21	13 1 50
18	γ Δ 4. 5. ^a 18 54	25	1 20 21
19	η Δ 4. 5. ^a 1 3	28	14 37 56
19	θ Δ 4. 5. ^a 5 56		III. SATELLITE.
19	φ Ofiuco 4. 5. ^a 22 42	20	3 46 31 imm.
20	m Μ 5. ^a 3 39	20	5 41 4 em.
23	ρ Δ 5. ^a 0 19	27	6 44 49 imm.
26	λ Δ 4. ^a 15 50	27	9 40 14 em.
27	φ Δ 5. ^a 0 49		
	FENOMENI ED OSSERVAZIONI.		
1	○ nel perigeo.		
7	○ nella mass. latit. elioc. A.		
13	○ H.		
14	○ λ Δ.		
15	○ apogea.		
19	○ ' Δ.		
20	○ in Δ a 0 ^h 25'.		
25	μ Δ.		
26	H' ○ ○.		
27	○ perigea. ○ in mass. elong. occid.		
30	○ nel perielio.		

Effe. 1830.

GENNAJO 1830.

Giorni dell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	TEMPO medio a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì medio.	Nascere del Sole.	Tramontare del Sole.
1	1	Ven.	o 3 49,4	18 46 14,7	18 42 25,0	7 39	4 21
2	2	Sab.	o 4 17,8	18 50 39,6	18 46 21,5	7 38	4 22
3	3	Dom.	o 4 45,7	18 55 4,2	18 50 18,1	7 38	4 22
4	4	Lun.	o 5 13,3	18 59 28,3	18 54 14,6	7 37	4 23
5	5	Mart.	o 5 40,4	19 3 52,0	18 58 11,2	7 37	4 23
6	6	Merc.	o 6 7,1	19 8 15,3	19 2 7,7	7 36	4 24
7	7	Giov.	o 6 33,2	19 12 38,0	19 6 4,3	7 35	4 25
8	8	Ven.	o 6 58,9	19 17 0,3	19 10 0,8	7 34	4 26
9	9	Sab.	o 7 24,0	19 21 22,0	19 13 57,4	7 34	4 26
10	10	Dom.	o 7 48,6	19 25 43,6	19 17 54,0	7 33	4 27
11	11	Lun.	o 8 12,5	19 30 3,8	19 21 50,6	7 32	4 28
12	12	Mart.	o 8 36,1	19 34 23,8	19 25 47,1	7 32	4 28
13	13	Merc.	o 8 58,9	19 38 43,3	19 29 43,7	7 31	4 29
14	14	Giov.	o 9 21,0	19 43 2,0	19 33 40,2	7 30	4 30
15	15	Ven.	o 9 42,4	19 47 20,3	19 37 36,8	7 29	4 31
16	16	Sab.	o 10 3,5	19 51 37,7	19 41 33,3	7 28	4 32
17	17	Dom.	o 10 25,7	19 55 54,5	19 45 29,9	7 26	4 34
18	18	Lun.	o 10 43,5	20 0 10,8	19 49 26,4	7 25	4 35
19	19	Mart.	o 11 2,2	20 4 26,1	19 53 23,0	7 24	4 36
20	20	Merc.	o 11 20,2	20 8 40,8	19 57 19,6	7 23	4 37
21	21	Giov.	o 11 37,7	20 12 54,8	20 1 16,1	7 22	4 38
22	22	Ven.	o 11 54,4	20 17 8,1	20 5 12,6	7 21	4 39
23	23	Sab.	o 12 10,2	20 21 20,4	20 9 9,2	7 20	4 40
24	24	Dom.	o 12 25,3	20 25 32,1	20 13 5,7	7 18	4 42
25	25	Lun.	o 12 39,6	20 29 42,9	20 17 2,2	7 17	4 43
26	26	Mart.	o 12 53,0	20 33 53,0	20 20 58,8	7 16	4 44
27	27	Merc.	o 13 5,7	20 38 2,2	20 24 55,3	7 15	4 45
28	28	Giov.	o 13 17,5	20 42 10,6	20 28 51,9	7 14	4 46
29	29	Ven.	o 13 28,4	20 46 18,1	20 32 48,5	7 13	4 47
30	30	Sab.	o 13 38,5	20 50 24,7	20 36 45,1	7 12	4 48
31	31	Dom.	o 13 47,9	20 54 30,8	20 40 41,6	7 11	4 49

Giorni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole australe.	LOGARITMO della distanza della Terra dal Sole.
1	9° 10' 37" 37,3	281° 33' 35"	23° 1' 59"	9,9926395
2	9 11 38 47,6	282 39 48	22 56 52	9,9926392
3	9 12 39 57,6	283 45 56	22 51 18	9,9926413
4	9 13 41 7,1	284 51 57	22 45 17	9,9926459
5	9 14 42 16,2	285 57 52	22 38 49	9,9926531
6	9 15 43 24,9	287 3 40	22 31 54	9,9926629
7	9 16 44 33,2	288 9 21	22 24 32	9,9926755
8	9 17 45 41,2	289 14 54	22 16 44	9,9926908
9	9 18 46 48,8	290 20 20	22 8 29	9,9927099
10	9 19 47 56,0	291 25 37	21 59 49	9,9927301
11	9 20 49 3,0	292 30 45	21 50 43	9,9927540
12	9 21 50 9,6	293 35 45	21 41 11	9,9927807
13	9 22 51 16,0	294 40 36	21 31 14	9,9928101
14	9 23 52 22,1	295 45 17	21 20 53	9,9928422
15	9 24 53 28,0	296 49 49	21 10 6	9,9928767
16	9 25 54 33,6	297 54 11	20 58 55	9,9929136
17	9 26 55 38,9	298 58 23	20 47 21	9,9929527
18	9 27 56 43,9	299 2 25	20 35 22	9,9929929
19	9 28 57 48,5	301 6 16	20 23 0	9,9930570
20	9 29 58 52,6	302 9 56	20 10 15	9,9930821
21	10 0 59 56,2	303 13 25	19 57 7	9,9931289
22	10 2 0 59,1	304 16 43	19 43 37	9,9931773
23	10 3 2 1,3	305 19 49	19 29 45	9,9932271
24	10 4 3 2,8	306 22 43	19 15 31	9,9932784
25	10 5 4 3,4	307 25 26	19 0 56	9,9933312
26	10 6 5 2,9	308 27 56	18 46 1	9,9933854
27	10 7 6 1,4	309 30 14	18 30 44	9,9934412
28	10 8 6 58,7	310 32 19	18 15 8	9,9934985
29	10 9 7 54,8	311 34 12	17 59 12	9,9935574
30	10 10 8 49,6	312 35 53	17 42 57	9,9936179
31	10 11 9 43,0	313 37 21	17 26 23	9,9936802

GENNAJO 1830.

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della Luna pel meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte medis.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1 Ven.		0 ° 2 19 34	0 ° 9 22 9	0 ° 53 56A	1 ° 30 18A	5 39
2 Sab.		0 16 24 28	0 23 26 27	2 5 17	2 38 19	6 31
3 Dom.		1 0 27 59	1 7 28 55	3 8 54	3 36 34	7 23
4 Lun.		1 14 29 6	1 21 28 16	4 0 54	4 21 34	8 17
5 Mart.		1 28 26 10	2 5 22 29	4 38 16	4 50 47	9 11
6 Merc.		2 12 16 51	2 19 8 53	4 58 57	5 2 45	10 6
7 Giov.		2 25 58 10	3 2 44 20	5 2 12	4 57 25	11 1
8 Ven.		3 9 27 2	3 16 5 54	4 48 29	4 35 42	11 56
9 Sab.		3 22 40 40	3 29 11 9	4 19 21	3 59 45	12 48
10 Dom.		4 5 37 14	4 11 58 53	3 37 15	3 12 15	13 38
11 Lun.		4 18 16 9	4 24 29 10	2 45 9	2 16 19	14 25
12 Mart.		5 0 38 12	5 6 45 54	1 46 9	1 15 0	15 10
13 Merc.		5 12 45 38	5 18 44 54	0 43 15	0 11 14	15 53
14 Giov.		5 24 41 52	6 0 37 8	0 20 45B	0 52 23B	16 36
15 Ven.		6 6 31 28	6 13 25 2	1 23 22	1 53 27	17 18
16 Sab.		6 18 19 1	6 24 13 54	2 22 20	2 49 47	18 1
17 Dom.		7 0 10 24	7 6 9 11	3 15 31	3 39 16	18 45
18 Lun.		7 12 10 54	7 18 16 11	4 0 47	4 19 47	19 31
19 Mart.		7 24 25 35	8 0 39 39	4 36 0	4 49 0	20 19
20 Merc.		8 6 58 49	8 13 23 27	4 58 59	5 5 15	21 11
21 Giov.		8 19 53 47	8 26 29 58	5 7 38	5 6 0	22 4
22 Ven.		9 3 12 0	9 9 59 46	5 0 10	4 50 3	23 0
23 Sab.		9 16 53 2	9 23 51 23	4 35 37	4 16 52	23 56
24 Dom.		10 0 54 17	10 8 1 9	3 54 1	3 27 18	* *
25 Lun.		10 15 11 19	10 22 23 59	2 57 5	2 23 48	0 52
26 Mart.		10 29 38 25	11 6 53 50	1 48 2	1 10 23	1 47
27 Merc.		11 14 9 31	11 21 24 49	0 31 32	0 7 50A	2 42
28 Giov.		11 28 39 8	0 5 51 58	0 47 2A	1 25 23	3 35
29 Ven.		0 43 2 54	0 20 11 35	2 2 12	2 36 56	4 28
30 Sab.		0 27 17 47	1 4 21 19	3 9 2	3 38 3	5 21
31 Dom.		1 11 22 1	1 18 19 50	4 3 35	4 25 20	6 14

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna		DIAMETRO orizzontale della Luna		Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte media.	a mezzo di medio.	a mezza notte media.		
1	h o 23	° 1 9B	59 11	59 9	32 18	32 17	11 29 M	11 55 S
2	1 18	5 40	59 7	59 3	32 16	32 14	o 4 S	* *
3	2 14	9 53	58 58	58 53	32 11	32 8	o 38	1 8 M
4	3 12	13 28	58 46	58 38	32 5	31 59	1 15	2 20
5	4 10	16 12	58 29	58 19	31 55	31 49	1 55	3 29
6	5 10	17 54	58 8	57 56	31 44	31 37	2 40	4 35
7	6 9	18 29	57 42	57 28	31 30	31 22	3 30	5 38
8	7 7	17 57	57 12	56 56	31 14	31 5	4 26	6 34
9	8 4	16 24	56 39	56 22	30 56	30 46	5 25	7 24
10	8 58	14 1	56 4	55 47	30 34	30 27	6 25	8 7
11	9 49	10 59	55 31	55 15	30 18	30 10	7 25	8 45
12	10 38	7 31	55 1	54 48	30 2	29 55	8 25	9 17
13	11 26	4 46	54 36	54 27	29 48	29 43	9 25	9 47
14	12 12	0 5A	54 20	54 15	29 39	29 37	10 24	10 13
15	12 59	3 54	54 12	54 11	29 35	29 35	11 21	10 42
16	13 45	7 34	54 13	54 18	29 36	29 39	*	11 9
17	14 34	10 57	54 25	54 35	29 42	29 48	o 19 M	11 35
18	15 24	13 54	54 48	55 3	29 55	30 3	1 20	0 4 S
19	16 16	16 15	55 20	55 39	30 12	30 23	2 20	0 38
20	17 11	17 49	56 0	56 23	30 34	30 46	3 20	1 14
21	18 9	18 25	56 46	57 10	30 50	31 12	4 19	3 1
22	19 8	17 53	57 34	57 58	31 26	31 39	5 16	2 50
23	20 9	16 10	58 21	58 42	31 51	32 3	6 11	3 49
24	*	*	59 1	59 18	32 13	32 22	7 6	4 50
25	21 9	13 22	59 32	59 43	32 30	32 36	7 45	6 7
26	22 9	9 38	59 51	59 56	32 40	32 43	8 22	7 18
27	23 7	5 16	59 58	59 56	32 44	32 43	8 58	8 34
28	0 5	0 35	59 52	59 46	32 41	32 38	9 33	9 47
29	1 1	4 6B	59 38	59 28	32 33	32 27	10 7	10 57
30	1 58	8 28	59 16	59 3	32 21	32 14	10 42	*
31	2 55	12 16	58 49	58 35	32 6	31 59	11 17	0 10 M

30

20

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSE DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
7	Plenilunio 8 ^h 23 ^m		I. SATELLITE.
15	Ultimo quarto 13 5	2	16 18 12 imm.
22	Novilunio 17 13	4	10 46 36
	CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE.	6	5 14 57
1	γ ♀ 3. 4. ^a 14 19	7	23 43 20
1	δ ^t ♀ 5. ^a 16 20	*	18 11 41
1	α ♀ 1. ^a 21 19	11	12 40 4
4	λ □ 4. 5. ^a 19 44	13	7 8 25
5	k □ 5. ^a 2 47	15	1 36 48
7	ξ Ω 5. ^a 9 49	16	20 5 8
7	ο Ω 4. ^a 14 53	18	14 33 31
9	τ Ω 4. ^a 20 46	20	9 1 51
10	β III 3. 4. ^a 7 58	22	3 30 14
12	θ III 4. 5. ^a 14 47	23	21 58 33
13	κ III 4. ^a 11 48	*	16 26 56
15	γ Δ 4. 5. ^a 5 9	25	10 55 15
15	η Δ 4. 5. ^a 9 32	27	
15	θ Δ 4. 5. ^a 14 29		II. SATELLITE.
16	φ Ofiuco 4. 5. ^a 7 35	1	3 56 20
16	m M ^t 5. ^a 12 40	4	17 13 51
19	ρ ^t ≫ 5. ^a 10 42	8	6 32 10
23	λ ≈ 4. ^a 1 40	11	19 49 36
23	φ ≈ 5. ^a 10 36	15	9 7 45
25	μ X 5. ^a 20 48	18	22 25 9
26	ξ ^t Balena 5. ^a 14 28	22	11 43 9
	FENOMENI ED OSSERVAZIONI.	26	1 0 30
			III. SATELLITE.
2	♀ stazionario.	3	10 42 42 imm.
3	♂ ○.	3	13 38 58 em.
10	○ nella mass. latit. elioc. B.	10	14 40 33 imm.
11	♂ inf. ○.	10	17 37 42 em.
12	○ nel perielio.	*	17 38 46 imm.
12	♂ apogea.	17	21 36 44 em.
14	♀ stazionario.	24	22 36 56 imm.
19	○ in X a 15 ^h 1 ^m .	25	1 35 45 em.
23	Eclisse invisibile di ○.		
24	♂ perigea.		
24	♀ stazionario.		

Giorni dell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	Tempo medio a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì medio.	Nascere del Sole.	Tramontare del Sole.
32	1	Lun.	o 13 56,3	20 58 35,8	20 44 38,1	7 9	4 51
33	2	Mart.	o 14 3,8	21 2 30,9	20 48 34,7	7 8	4 52
34	3	Merc.	o 14 10,7	21 6 43,3	20 52 31,2	7 6	4 54
35	4	Giov.	o 14 16,7	21 10 45,7	20 56 27,7	7 5	4 55
36	5	Ven.	o 14 21,7	21 14 47,4	21 0 24,3	7 3	4 57
37	6	Sab.	o 14 26,0	21 18 48,2	21 4 20,8	7 2	4 58
38	7	Dom.	o 14 29,5	21 22 48,2	21 8 17,3	7 1	4 59
39	8	Lun.	o 14 32,1	21 26 47,4	21 12 13,9	7 0	5 0
40	9	Mart.	o 14 33,7	21 30 45,8	21 16 10,7	6 58	5 2
41	10	Merc.	o 14 35,0	21 34 43,5	21 20 7,1	6 57	5 3
42	11	Giov.	o 14 35,3	21 38 40,3	21 24 3,6	6 55	5 5
43	12	Ven.	o 14 34,8	21 42 36,4	21 28 0,2	6 54	5 6
44	13	Sab.	o 14 33,5	21 46 31,7	21 31 56,8	6 53	5 7
45	14	Dom.	o 14 31,6	21 50 26,2	21 35 53,3	6 51	5 9
46	15	Lun.	o 14 29,1	21 54 20,2	21 39 49,8	6 49	5 11
47	16	Mart.	o 14 25,6	21 58 13,3	21 43 46,4	6 48	5 12
48	17	Merc.	o 14 21,5	22 2 5,8	21 47 43,0	6 46	5 14
49	18	Giov.	o 14 16,7	22 5 57,6	21 51 39,6	6 45	5 15
50	19	Ven.	o 14 11,2	22 9 48,7	21 55 36,2	6 43	5 16
51	20	Sab.	o 14 5,1	22 13 39,1	21 59 32,7	6 42	5 18
52	21	Dom.	o 13 58,3	22 17 28,9	22 3 29,3	6 40	5 20
53	22	Lun.	o 13 50,9	22 21 18,0	22 7 25,8	6 38	5 22
54	23	Mart.	o 13 42,9	22 25 6,5	22 11 22,3	6 37	5 23
55	24	Merc.	o 13 34,2	22 28 54,3	22 15 18,9	6 35	5 25
56	25	Giov.	o 13 25,0	22 32 41,6	22 19 15,4	6 34	5 26
57	26	Ven.	o 13 15,1	22 36 28,3	22 23 12,0	6 32	5 28
58	27	Sab.	o 13 4,6	22 40 14,3	22 27 8,5	6 31	5 29
59	28	Dom.	o 12 53,6	22 43 59,9	22 31 5,1	6 29	5 31

Giorni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole australe.	LOGARITMO della distanza della Terra dal Sole.
1	10° 12' 10" 34,9	314° 38' 36"	17° 9' 31"	9,9937444
2	10 13 11 25,4	315 39 38	16 52 21	9,9938106
3	10 14 12 14,5	316 40 28	16 34 53	9,9938789
4	10 15 13 2,0	317 41 5	16 17 8	9,9939493
5	10 16 13 48,2	318 41 30	15 59 6	9,9940221
6	10 17 14 30,8	319 41 42	15 40 48	9,9940972
7	10 18 15 16,1	320 41 42	15 22 14	9,9941746
8	10 19 15 58,0	321 41 30	15 3 24	9,9942544
9	10 20 16 38,7	322 41 6	14 44 19	9,9943364
10	10 21 17 18,1	323 40 31	14 24 59	9,9944207
11	10 22 17 56,2	324 39 44	14 5 25	9,9945073
12	10 23 18 33,1	325 38 45	13 45 37	9,9945960
13	10 24 19 8,7	326 37 35	13 25 34	9,9946866
14	10 25 19 43,0	327 36 14	13 5 20	9,9947790
15	10 26 20 16,0	328 34 43	12 44 52	9,9948731
16	10 27 20 48,1	329 33 0	12 24 12	9,9949687
17	10 28 21 18,6	330 31 7	12 3 20	9,9950656
18	10 29 21 48,2	331 29 4	11 42 16	9,9951638
19	11 0 22 16,2	332 26 51	11 21 1	9,9952631
20	11 1 22 42,8	333 24 27	10 59 36	9,9953632
21	11 2 23 8,0	334 21 54	10 38 0	9,9954642
22	11 3 23 31,2	335 19 11	10 16 15	9,9955660
23	11 4 23 53,1	336 16 18	9 54 20	9,9956685
24	11 5 24 13,2	337 13 17	9 32 16	9,9957717
25	11 6 24 31,3	338 10 6	9 10 3	9,9958755
26	11 7 24 47,5	339 6 46	8 47 42	9,9959799
27	11 8 25 1,4	340 3 17	8 25 14	9,9960851
28	11 9 25 13,5	340 59 40	8 2 38	9,9961911

GENNAJO 1830.

	Giorni del mese. Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della Luna per meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1	Ven.	0° 2° 19' 34"	0° 9° 22' 9"	0° 53' 56A	1° 30' 18A	5° 39'
2	Sab.	0 16 24 28	0 23 26 27	2 5 17	2 38 19	6 31
3	Dom.	1 0 27 59	1 7 28 55	3 8 54	3 36 34	7 23
4	Lun.	1 14 29 6	1 21 28 16	4 0 54	4 21 34	8 17
5	Mart.	1 28 26 10	2 5 22 29	4 38 16	4 50 47	9 11
6	Merc.	2 12 16 51	2 19 8 53	4 58 57	5 2 45	10 6
7	Giov.	2 25 58 10	3 2 44 20	5 2 12	4 57 23	11 1
8	Ven.	3 9 27 2	3 16 5 54	4 48 29	4 35 42	11 56
9	Sab.	3 22 40 40	3 29 11 9	4 19 21	3 59 45	12 48
10	Dom.	4 5 37 14	4 11 58 53	3 37 15	3 12 15	13 38
11	Lun.	4 18 16 9	4 24 29 10	2 45 9	2 16 19	14 25
12	Mart.	5 0 38 12	5 6 43 34	1 46 9	1 15 0	15 10
13	Merc.	5 12 45 38	5 18 44 54	0 43 15	0 11 14	15 53
14	Giov.	5 24 41 52	6 0 37 8	0 20 45B	0 52 23B	16 36
15	Ven.	6 6 31 18	6 12 25 2	1 23 22	1 53 27	17 18
16	Sab.	6 18 19 1	6 24 13 54	2 22 20	2 49 47	18 1
17	Dom.	7 0 10 24	7 6 9 11	3 15 31	3 39 16	18 45
18	Lun.	7 12 10 54	7 18 16 11	4 0 47	4 19 47	19 31
19	Mart.	7 24 25 35	8 0 39 39	4 36 0	4 49 9	20 19
20	Merc.	8 6 58 49	8 13 23 27	4 58 59	5 5 13	21 11
21	Giov.	8 19 53 47	8 26 29 58	5 7 38	5 6 0	22 4
22	Ven.	9 3 12 0	9 9 59 46	5 0 10	4 50 3	23 0
23	Sab.	9 16 53 2	9 23 51 23	4 35 37	4 16 52	23 56
24	Dom.	10 0 54 17	10 8 1 9	3 54 1	3 27 18	* *
25	Lun.	10 15 11 19	10 22 23 59	2 57 5	2 23 48	0 52
26	Mart.	10 29 38 25	11 6 53 50	1 48 2	1 10 23	1 47
27	Merc.	11 14 9 31	11 21 24 49	0 31 32	0 7 50A	2 42
28	Giov.	11 28 59 8	0 5 51 58	0 47 2A	1 25 23	3 35
29	Ven.	0 13 2 54	0 20 11 35	2 2 12	2 36 56	4 28
30	Sab.	0 27 17 47	1 4 21 19	3 9 2	3 38 3	5 21
31	Dom.	1 11 22 1	1 18 19 50	4 5 35	4 25 20	6 14

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna		DIAMETRO orizzontale della Luna		Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte media.	a mezzo di medio.	a mezza notte media.		
1	3 53'	15° 17'B	58' 20"	58' 5"	31' 51"	31' 43"	11 54'M	1 21'M
2	4 51	17 19	57 50	57 35	31 34	31 26	0 37'S	2 26
3	5 48	18 18	57 20	57 5	31 18	31 10	1 25	3 31
4	6 46	18 11	56 51	56 36	31 2	30 54	2 18	4 27
5	7 42	17 5	56 22	56 8	30 46	30 39	3 13	5 18
6	8 37	15 4	55 54	55 41	30 31	30 24	4 12	6 3
7	9 29	12 19	55 28	55 15	30 16	30 9	5 12	6 42
8	10 19	9 3	55 2	54 50	30 3	29 56	6 13	7 16
9	11 7	5 25	54 40	54 30	29 50	29 45	7 12	7 47
10	11 54	1 36	54 22	54 15	29 40	29 36	8 12	8 14
11	12 40	2 14A	54 9	54 6	29 34	29 32	9 10	8 42
12	13 27	5 58	54 5	54 5	29 31	29 31	10 8	9 12
13	14 14	9 27	54 8	54 13	29 33	29 36	11 9	9 38
14	15 3	12 34	54 21	54 31	29 40	29 45	* *	10 5
15	15 53	15 9	54 43	54 58	29 52	30 0	0 7M	10 57
16	16 46	17 4	55 16	55 36	30 10	30 21	1 4	11 12
17	17 41	18 8	55 58	56 22	30 53	30 46	2 3	11 51
18	18 39	18 12	56 48	57 15	31 0	31 15	3 0	0 38S
19	19 38	17 7	57 43	58 11	31 30	31 45	3 56	1 32
20	20 38	14 54	58 39	59 5	32 1	32 15	4 46	2 34
21	21 39	11 37	59 29	59 52	32 28	32 41	5 33	3 41
22	*	*	60 11	60 27	32 51	33 0	6 15	4 53
23	22 59	7 29	60 38	60 46	33 6	33 10	6 53	6 9
24	23 39	2 48	60 49	60 48	33 12	33 11	7 29	7 27
25	0 38	2 5B	60 43	60 34	33 9	33 4	8 5	8 39
26	1 37	6 45	60 22	60 6	32 57	32 48	8 41	9 55
27	2 35	10 55	59 49	59 29	32 39	32 28	9 17	11 9
28	3 34	14 17	59 8	58 46	32 17	32 5	9 56	*

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

	<i>Oriente</i>	$19^{\text{h}} 0'$	<i>Occidente</i>
1	.3	4..2	○ 1.
2 01	4.	.3	○ .2
3 02	4.	1.	○ .3
4	4.	2.	○ .1 .3
5	4.	1.	○ .2 3.
6	.4		○ 3. 1. 2.
7	.4	3. 2. 1	○
8	3.	.4 .2	○ 1.
9	.3	.1 ○ 4.	.2
10		1. ○ 2 ○ 3	.4
11	2.	○ .1	.3 .4
12		1. ○ .2	3. .4
13		○ 3. 1 2.	.4
14		3. 2 ○ 1	4.
15	3.	.2	○ 1. 4.
16	.3	.1 ○	.2 4.
17 04 01		○ 2.	30
18	2.4.	○ .1	.3
19	4.	1.	○ 3. 20
20	4.		○ 1 ○ 3. 2.
21	4.	1 ○ 3. 2.	○
22	.4	3. .2	○ 1.
23	.4	.3 .1	○ .2
24	.4	.3 ○ 1.	2.
25 01	2. .4	○ 2.	3.
26		1 ○ 2 ○	.4 3.
27		○ .1 3. 2.	.4
28		1. 3. 2. ○	.4
29	3.	.2	○ 1. .4
30	.3	.1 ○	.2 4.
31		.3 ○ 1. 2.	4.

Giorni.	FASI DELLA LUNA.	Giorni.	ECLISSI DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
7	Plenilunio 8 ^h 23'	2	I. SATELLITE.
15	Ultimo quarto 13 5	3	16 18 12 imm.
22	Novilunio 17 13	4	10 46 36
	CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE.	6	5 14 57
1	γ ♈ 3. 4. ^a 14 19	7	23 43 20
1	θ ^r ♈ 5. ^a 16 20	* 9	18 11 41
1	α ♈ 1. ^a 21 19	11	12 40 4
4	λ □ 4. 5. ^a 19 44	13	7 8 25
5	k □ 5. ^a 2 47	15	1 36 48
7	ξ ♀ 5. ^a 9 49	16	20 5 8
7	ο ♀ 4. ^a 14 53	18	14 33 31
9	τ ♀ 4. ^a 20 46	20	9 1 51
10	β III 3. 4. ^a 7 58	22	3 30 14
12	θ III 4. 5. ^a 14 47	23	21 58 33
13	κ III 4. ^a 11 48	* 25	16 26 56
15	γ ≈ 4. 5. ^a 5 9	27	10 55 15
15	η ≈ 4. 5. ^a 9 52		II. SATELLITE.
15	θ ≈ 4. 5. ^a 14 29	1	3 56 20
16	φ Ofiuco 4. 5. ^a 7 35	4	17 13 51
16	m III 5. ^a 12 40	8	6 32 10
19	ρ ^r ≈ 5. ^a 10 42	11	19 49 36
23	λ ≈ 4. ^a 1 40	15	9 7 45
23	φ ≈ 5. ^a 10 36	18	22 25 9
25	μ X 5. ^a 20 48	22	11 43 9
26	ξ Balena 5. ^a 14 28	26	1 0 30
	FENOMENI ED OSSERVAZIONI.		III. SATELLITE.
2	♂ stazionario.	3	10 42 42 imm.
3	♂ ⊕ ⊖	3	13 38 58 em.
10	nella mass. latit. elioc. B.	10	14 40 33 imm.
11	♂ inf. ⊖	10	17 37 42 em.
12	♂ nel perielio.	* 17	18 38 46 imm.
12	♂ apogea.	17	21 36 44 em.
14	♀ stazionario.	24	22 36 58 imm.
19	⊕ in X a 15 ^h 11 ^m .	25	1 35 45 em.
23	Eclisse invisibile di ⊖.		
24	♂ perigea.		
24	♀ stazionario.		

Giorni dell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	Tempo medio a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì medio.	Nascere del Sole.	Tramontare del Sole.
60	1	Lun.	0 12 41,9	22 47 44,9	22 35 1,7	6 27	5 33
61	2	Mart.	0 12 29,8	22 51 29,2	22 38 58,2	6 25	5 35
62	3	Merc.	0 12 17,2	22 55 13,2	22 42 54,8	6 24	5 36
63	4	Giov.	0 12 4,1	22 58 56,6	22 46 51,3	6 22	5 38
64	5	Ven.	0 11 50,5	23 2 39,6	22 50 47,9	6 21	5 39
65	6	Sab.	0 11 36,5	23 6 22,1	22 54 44,4	6 19	5 41
66	7	Dom.	0 11 22,0	23 10 4,1	22 58 41,0	6 18	5 42
67	8	Lun.	0 11 7,1	23 13 45,7	23 2 37,5	6 16	5 44
68	9	Mart.	0 10 51,8	23 17 27,0	23 6 34,1	6 15	5 45
69	10	Merc.	0 10 36,2	23 21 7,9	23 10 30,6	6 13	5 47
70	11	Giov.	0 10 20,2	23 24 48,5	23 14 27,2	6 12	5 48
71	12	Ven.	0 10 4,0	23 28 38,7	23 18 23,7	6 10	5 50
72	13	Sab.	0 9 47,4	23 32 8,7	23 22 26,3	6 9	5 51
73	14	Dom.	0 9 30,6	23 35 48,3	23 26 16,8	6 7	5 53
74	15	Lun.	0 9 13,4	23 39 27,7	23 30 13,4	6 5	5 55
75	16	Mart.	0 8 56,2	23 43 7,0	23 34 9,9	6 4	5 56
76	17	Merc.	0 8 38,7	23 46 46,1	23 38 6,5	6 2	5 58
77	18	Giov.	0 8 21,0	23 50 24,8	23 42 3,0	6 1	5 59
78	19	Ven.	0 8 3,1	23 54 3,5	23 45 59,6	5 59	6 1
79	20	Sab.	0 7 45,1	23 57 42,0	23 49 56,1	5 58	6 2
80	21	Dom.	0 7 27,1	0 1 20,4	23 53 52,7	5 56	6 4
81	22	Lun.	0 7 8,7	0 4 58,7	23 57 49,3	5 54	6 6
82	23	Mart.	0 6 50,4	0 8 36,9	0 1 45,8	5 53	6 7
83	24	Merc.	0 6 32,0	0 12 15,1	0 5 42,4	5 51	6 9
84	25	Giov.	0 6 13,6	0 15 53,1	0 9 38,9	5 50	6 10
85	26	Ven.	0 5 55,2	0 19 31,2	0 13 35,5	5 48	6 12
86	27	Sab.	0 5 36,7	0 23 9,2	0 17 32,0	5 46	6 14
87	28	Dom.	0 5 18,2	0 26 47,2	0 21 28,6	5 45	6 15
88	29	Lun.	0 4 59,7	0 30 25,2	0 25 25,1	5 43	6 17
89	30	Mart.	0 4 41,2	0 34 3,1	0 29 21,7	5 41	6 19
90	31	Merc.	0 4 22,7	0 37 41,3	0 33 18,3	5 40	6 20

Giorni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole australe.	LOGARITMO della distanza della Terra dal Sole.
1	11 10 25 23,6	341 55 55	7 39 56	9,9962980
2	11 11 25 31,6	342 52 2	7 17 7	9,9964058
3	11 12 25 37,4	343 48 1	6 54 12	9,9965147
4	11 13 25 40,9	344 43 52	6 31 11	9,9966248
5	11 14 25 42,4	345 39 37	6 8 5	9,9967361
6	11 15 25 41,8	346 35 15	5 44 54	9,9968487
7	11 16 25 39,2	347 30 46	5 21 38	9,9969627
8	11 17 25 34,4	348 26 11	4 58 18	9,9970781
9	11 18 25 27,6	349 21 30	4 34 54	9,9971949
10	11 19 25 18,9	350 16 44	4 11 27	9,9973130
11	11 20 25 8,4	351 11 53	3 47 57	9,9974325
12	11 21 24 55,9	352 6 57	3 24 24	9,9975532
13	11 22 24 41,6	353 1 57	3 0 49	9,9976750
14	11 23 24 25,6	353 56 53	2 37 11	9,9977978
15	11 24 24 7,8	354 51 44	2 13 32	9,9979216
16	11 25 23 48,3	355 46 33	1 49 51	9,9980461
17	11 26 23 27,0	356 41 19	1 26 10	9,9981712
18	11 27 23 4,1	357 36 2	1 2 27	9,9982967
19	11 28 22 39,5	358 30 42	0 38 45	9,9984224
20	11 29 22 13,0	359 25 20	0 15 2	9,9985483
21	0 0 21 44,1	0 19 57	0 8 40	9,9986741
22	0 1 21 14,5	1 14 32	0 52 21	9,9987996
23	0 2 20 42,3	2 9 5	0 56 2	9,9989249
24	0 3 20 8,2	3 3 38	1 19 41	9,9990499
25	0 4 19 31,9	5 58 9	1 43 18	9,9991744
26	0 5 18 53,6	4 52 40	2 6 52	9,9992986
27	0 6 18 13,1	5 47 11	2 30 24	9,9994223
28	0 7 17 30,6	6 41 42	2 53 53	9,9995456
29	0 8 16 45,7	7 36 12	3 17 18	9,9996687
30	0 9 15 58,5	8 30 43	3 40 39	9,9997914
31	0 10 15 8,9	9 25 15	4 3 56	9,9999140

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della Luna per meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1 Lun.	2 5° 43' 37"	2 12° 35' 3"	5° 8' 44A	5° 15' 27A	5 57'	
2 Mart.	2 19 21 25	2 26 2 52	5 17 40	5 15 31	6 51	
3 Merc.	3 2 39 35	3 9 11 47	5 9 12	4 58 56	7 45	
4 Giov.	3 15 39 44	3 22 3 42	4 44 57	4 27 33	8 37	
5 Ven.	3 28 23 57	4 4 40 46	4 7 1	3 43 41	9 27	
6 Sab.	4 10 54 22	4 17 5 2	3 17 52	2 49 56	10 15	
7 Dom.	4 23 13 0	4 29 18 30	2 20 13	1 49 6	11 1	
8 Lun.	5 5 21 45	5 11 22 59	1 16 55	0 44 4	11 45	
9 Mart.	5 17 22 26	5 23 20 20	0 10 52	0 22 18B	12 28	
10 Merc.	5 29 16 56	6 5 12 30	0 55 7B	1 27 13	13 11	
11 Giov.	6 11 7 18	6 17 1 39	1 58 20	2 28 7	13 53	
12 Ven.	6 22 55 51	6 28 50 15	2 56 18	3 22 36	14 36	
13 Sab.	7 4 45 14	7 10 41 11	3 46 47	4 8 35	15 20	
14 Dom.	7 16 38 31	7 22 37 42	4 27 47	4 44 9	16 5	
15 Lun.	7 28 39 11	8 4 45 29	4 57 30	5 7 37	16 52	
16 Mart.	8 10 51 5	8 17 2 32	5 14 22	5 17 33	17 41	
17 Merc.	8 23 18 20	8 29 38 59	5 17 0	5 12 38	18 32	
18 Giov.	9 6 4 58	9 12 36 45	5 4 18	4 51 57	19 25	
19 Ven.	9 19 14 42	9 25 59 8	4 35 32	4 15 4	20 19	
20 Sab.	10 2 50 16	10 9 48 11	3 50 39	3 22 27	21 14	
21 Dom.	10 16 52 50	10 24 3 59	2 50 44	2 15 51	22 9	
22 Lun.	11 1 21 15	11 8 44 3	1 38 16	0 58 36	23 5	
23 Mart.	11 16 11 38	11 23 43 5	0 17 30	0 24 14A	* *	
24 Merc.	0 1 17 19	0 8 53 12	1 5 46A	1 46 16	0 1	
25 Giov.	0 16 29 30	0 24 4 59	2 24 54	3 0 52	0 57	
26 Ven.	1 1 38 26	1 9 8 43	3 33 29	4 2 10	1 54	
27 Sab.	1 16 34 51	1 25 55 57	4 26 27	4 46 3	2 51	
28 Dom.	2 1 11 20	2 8 20 31	5 0 47	5 10 35	3 48	
29 Lun.	2 15 23 10	2 22 19 7	5 15 32	5 15 45	4 44	
30 Mart.	2 29 8 24	3 5 51 9	5 11 29	5 3 0	5 40	
31 Merc.	3 12 27 38	3 18 58 11	4 50 36	4 34 38	6 33	

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna			DIAMETRO orizzontale della Luna			Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte media.		a mezzo di medio.	a mezza notte media.			
1	4 33'	16° 41' B	58 23'	58 1''	31 52''	31 40''	10 36 M	0 18 M		
2	5 32	18 1	57 39	57 18	31 28	31 16	11 24	1 22		
3	6 29	18 5	56 57	56 38	31 5	30 55	0 14 S	2 22		
4	7 25	17 28	56 20	56 3	30 45	30 36	1 9	3 16		
5	8 19	15 46	55 47	55 32	30 27	30 19	2 6	4 3		
6	9 11	13 18	55 18	55 6	30 11	30 5	3 5	4 42		
7	10 1	10 14	54 54	54 44	29 58	29 52	4 4	5 17		
8	10 50	6 45	54 34	54 26	29 47	29 43	5 3	5 50		
9	11 37	3 0	54 18	54 12	29 39	29 35	6 3	6 17		
10	12 24	0 50 A	54 6	54 2	29 32	29 30	7 1	6 45		
11	13 10	4 37	53 59	53 58	29 28	29 28	7 58	7 15		
12	13 57	8 12	53 58	54 0	29 28	29 29	8 58	7 40		
13	14 45	11 27	54 4	54 9	29 30	29 33	9 57	8 8		
14	15 34	14 13	54 17	54 27	29 38	29 43	10 55	8 59		
15	16 25	16 23	54 59	54 53	29 50	29 58	11 53	9 11		
16	17 18	17 47	55 10	55 28	30 7	30 17	* *	9 47		
17	18 13	18 17	55 49	56 12	30 24	30 41	0 50 M	10 30		
18	19 10	17 45	56 37	57 4	30 55	31 9	1 45	11 19		
19	20 8	16 8	57 32	58 1	31 24	31 40	2 35	0 17 S		
20	21 7	15 26	58 30	59 0	31 50	32 12	3 22	1 18		
21	22 7	9 47	59 27	59 54	32 27	32 41	4 4	2 28		
22	23 7	5 21	60 18	60 38	32 54	33 6	4 45	3 39		
23	*	*	60 55	61 8	33 15	33 22	5 21	4 57		
24	0 7	0 30	61 16	61 19	33 27	33 28	5 57	6 13		
25	1 7	4 26 B	61 17	61 10	33 27	33 23	6 35	7 27		
26	2 8	9 3	60 59	60 44	33 17	33 10	7 12	8 46		
27	3 9	12 57	60 24	60 2	32 59	32 46	7 51	10 1		
28	4 10	15 53	59 38	59 11	32 33	32 19	8 33	11 11		
29	5 10	17 41	58 44	58 17	32 4	31 49	9 19	*		
30	6 10	18 19	57 50	57 23	31 34	31 20	10 10	0 15 M		
31	7 7	17 51	56 58	56 34	31 6	30 53	11 4	1 12		

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

Oriente

16^h 30'

Occidente

1	•2	1.	○	.4	.3	
2		.2	○	.1	3 64	
3		.1	○	.2	3.	.4
4		3.	○	1.	2.	.4
5 01	3.	2.	○			4.
6	.3	.2	1.	○		4.
7		.3	○	.1	.2	4.
8		1.	○	2.	4. 3	
9		2.	4. ○	.1	.3	
10	4.	.1	○		3.	20
11	4.		.3.	○	1.	2.
12	4.	3.	2.	.1	○	
13	.4	.3	.2	○		10
14	.4		.3	○	.1	.2
15	.4		1.	○	2.	.3
16		2 64		○	.1	.3
17		1.	.3	○		3.
18 •3			○	1. 2 64		40
19		3.	2 61 ○			.4
20		.3	.2	○ 1.		.4
21 01		.3	○	2.		.4
22		1.	○	2 63		4.
23		2.	○	.1	.3	4.
24		1.	.2	○		4 63
25			○ 3.	4. .1	.2	
26		5.	4 61 2.	○		
27		4 63 2.		○ 1.		
28	4.	.3	.1 ○	.2		
29	4.		1. ○	.3	2.	
30	.4		○	.1	.3	
31	.4		1 62 ○			3.

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSE DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
7	Plenilunio 20 ^h 5 ^m		I. SATELLITE.
15	Ultimo quarto 19 26	2	1 53' 57" imm.
22	Novilunio 12 4	3	20 22 16
29	Primo quarto 8 31	*	14 50 40
	CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE	7	9 19 0
2	ξ Σ 5. ^a 21 59	9	3 47 24
3	σ Σ 4. ^a 3 8	10	22 15 43
5	τ Σ 4. ^a 9 36	*	12 16 44 8
5	β ΠΠ 3. 4. ^a 21 1	14	11 12 28
6	η ΠΠ 3. 4. ^a 18 6	16	5 40 54
7	δ ΠΠ 4. 5. ^a 15 52	18	0 9 14
9	χ ΠΠ 4. ^a 5 4	19	18 37 39
10	γ Δ 4. 5. ^a 18 22	*	21 13 6 0
10	η Δ 4. 5. ^a 22 47	23	7 34 26
11	θ Δ 4. 5. ^a 3 49	25	2 2 47
11	φ Ophiuco 4. 5. ^a 21 14	26	20 31 15
15	ρ' Δ 5. ^a 3 27	*	28 14 59 35
21	μ Χ 5. ^a 17 50	30	9 28 2
22	μ Balena 4. ^a 23 14		II. SATELLITE.
24	γ Ψ 3. 4. ^a 13 40	2	13 54 24
24	θ' Θ 5. ^a 17 10	6	3 11 38
24	α Θ 1. ^a 20 10	*	9 16 28 39
27	λ Δ 4. 5. ^a 14 50	13	5 45 49
30	ξ Σ 5. ^a 4 21	16	19 2 46
30	σ Σ 4. ^a 9 19	20	8 16 53
	FENOMENI ED OSSERVAZIONI.	23	21 36 48
5	♀ in massima latitudine A.	27	10 53 50
7	♂ apogea.		III. SATELLITE.
15	♂ stazionario.	1	18 27 29 imm.
14	♂ ξ Χ.	1	21 30 30 em.
18	♂ σ Χ.	8	22 25 47 imm.
20	○ in Β a 2 ^h 53 ^m .	9	0 29 35 em.
21	♀ ○ ○.	16	2 24 1 imm.
21	♂ perigea.	16	4 28 40 em.
26	♂ Η.	23	6 22 55 imm.
26	♂ ○ ○.	23	9 28 23 em.
28	♂ nel perielio.	30	10 21 14 imm.
30	♂ col ○.	50	13 27 32 em.
			IV. SATELLITE.
		11	12 44 6 imm.
		11	14 14 32 em.
		28	6 36 16 imm.
		28	8 24 44 em.

Giorni dell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	Tempo medio a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì medio.	Nascere del Sole.	Tremontare del Sole.
91	1	Giov.	0 4 4,3	0 41 19,5	0 37 14,9	5 39	6 21
92	2	Ven.	0 3 46,1	0 44 57,8	0 41 11,4	5 37	6 23
93	3	Sab.	0 3 27,9	0 48 36,1	0 45 8,0	5 36	6 24
94	4	Dom.	0 3 9,8	0 52 14,5	0 49 4,5	5 34	6 26
95	5	Lun.	0 2 51,9	0 53 55,2	0 53 1,1	5 33	6 27
96	6	Mart.	0 2 34,3	0 59 32,1	0 56 57,6	5 31	6 29
97	7	Merc.	0 2 16,8	1 3 11,0	1 0 54,1	5 30	6 30
98	8	Giov.	0 1 59,4	1 6 50,2	1 4 50,7	5 28	6 32
99	9	Ven.	0 1 42,3	1 10 29,6	1 8 47,2	5 26	6 34
100	10	Sab.	0 1 25,5	1 14 9,4	1 12 43,8	5 24	6 36
101	11	Dom.	0 1 8,8	1 17 49,3	1 16 40,4	5 23	6 37
102	12	Lun.	0 0 59,6	1 21 29,6	1 20 36,9	5 21	6 39
103	13	Mart.	0 0 36,6	1 25 10,2	1 24 33,5	5 19	6 41
104	14	Merc.	0 0 21,1	1 28 51,1	1 28 30,0	5 18	6 42
105	15	Giov.	0 0 5,7	1 32 32,3	1 32 26,6	5 16	6 44
106	16	Ven.	23 59 57,9	1 36 14,0	1 36 23,1	5 14	6 46
107	17	Sab.	23 59 36,3	1 39 56,0	1 40 19,7	5 13	6 47
108	18	Dom.	23 59 22,3	1 43 38,4	1 44 16,2	5 11	6 49
109	19	Lun.	23 59 8,5	1 47 21,2	1 48 12,8	5 10	6 50
110	20	Mart.	23 58 55,2	1 51 4,4	1 52 9,3	5 8	6 52
111	21	Merc.	23 58 42,4	1 54 48,2	1 56 5,9	5 7	6 53
112	22	Giov.	23 58 29,9	1 58 32,3	2 0 2,5	5 5	6 55
113	23	Ven.	23 58 17,0	2 2 16,8	2 3 59,0	5 3	6 57
114	24	Sab.	23 58 6,4	2 6 1,9	2 7 55,6	5 2	6 58
115	25	Dom.	23 57 55,4	2 9 47,4	2 11 52,1	5 1	6 59
116	26	Lun.	23 57 44,8	2 13 33,4	2 15 48,7	5 0	7 0
117	27	Mart.	23 57 34,7	2 17 19,8	2 19 45,2	4 58	7 2
118	28	Merc.	23 57 25,1	2 21 6,8	2 23 41,8	4 57	7 3
119	29	Giov.	23 57 16,0	2 24 54,2	2 27 38,3	4 56	7 4
120	30	Ven.	23 57 7,4	2 28 42,1	2 31 34,8	4 54	7 6

GIORNI del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole boreale.	LOGARITMI della distanza della Terra dal Sole.
1	0° 11' 14" 17,0	10° 19' 48"	4° 27' 8"	0,0000365
2	0° 12' 13" 22,8	11° 14' 22"	4° 50' 16"	0,0001589
3	0° 13' 12" 26,1	12° 8' 58"	5° 13' 18"	0,0002815
4	0° 14' 11" 27,1	13° 3' 35"	5° 36' 15"	0,0004044
5	0° 15' 10" 25,9	13° 58' 15"	5° 59' 5"	0,0005275
6	0° 16' 9" 22,7	14° 52' 58"	6° 21' 50"	0,0006508
7	0° 17' 8" 17,3	15° 47' 43"	6° 44' 28"	0,0007743
8	0° 18' 7" 9,8	16° 42' 31"	7° 6' 58"	0,0008982
9	0° 19' 6" 0,3	17° 37' 23"	7° 29' 12"	0,0010225
10	0° 20' 4" 48,9	18° 32' 19"	7° 51' 39"	0,0011465
11	0° 21' 3" 35,7	19° 27' 18"	8° 13' 47"	0,0012711
12	0° 22' 2" 20,7	20° 22' 23"	8° 35' 47"	0,0013956
13	0° 23' 1" 3,9	21° 17' 32"	8° 57' 39"	0,0015199
14	0° 23' 59" 45,4	22° 12' 46"	9° 19' 21"	0,0016440
15	0° 24' 58" 25,2	23° 8' 5"	9° 40' 55"	0,0017677
16	0° 25' 57" 3,3	24° 3' 30"	10° 2' 19"	0,0018907
17	0° 26' 55" 39,8	24° 59' 0"	10° 23' 34"	0,0020130
18	0° 27' 54" 14,7	25° 54' 37"	10° 44' 38"	0,0021345
19	0° 28' 52" 47,9	26° 50' 19"	11° 5' 32"	0,0022548
20	0° 29' 51" 19,4	27° 46' 8"	11° 26' 15"	0,0023740
21	1° 0' 49" 49,1	28° 42' 4"	11° 46' 46"	0,0024919
22	1° 1' 48" 17,0	29° 58' 6"	12° 7' 7"	0,0026084
23	1° 2' 46" 43,1	30° 34' 14"	12° 27' 15"	0,0027235
24	1° 3' 45" 7,2	31° 30' 30"	12° 47' 11"	0,0028372
25	1° 4' 43" 29,6	32° 26' 52"	13° 6' 54"	0,0029494
26	1° 5' 41" 49,9	33° 23' 22"	15° 26' 25"	0,0030603
27	1° 6' 40" 8,2	34° 19' 59"	13° 45' 42"	0,0031697
28	1° 7' 38" 24,5	35° 16' 43"	14° 4' 46"	0,0032777
29	1° 8' 36" 38,6	36° 13' 34"	14° 23' 35"	0,0033845
30	1° 9' 34" 50,8	37° 10' 53"	14° 42' 11"	0,0034902

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della Luna pel meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1 Giov.	3 25° 23' 14"	4 1° 43' 14"	4° 15' 24A	3° 53' 18A	7 24'	
2 Ven.	4 7 58 39	4 14 10 1	3 28 39	3 1 49	8 13	
3 Sab.	4 20 17 46	4 26 22 25	2 33 9	2 2 59	8 59	
4 Dom.	5 2 24 26	5 8 24 14	1 31 41	0 59 34	9 44	
5 Lun.	5 14 22 13	5 20 18 48	0 25 58	0 5 45B	10 27	
6 Mart.	5 26 14 20	6 2 9 8	0 38 18B	1 10 20	11 10	
7 Merc.	6 8 3 32	6 13 57 47	1 41 32	2 11 36	11 52	
8 Giov.	6 19 52 10	6 25 46 56	2 40 14	3 7 8	12 35	
9 Ven.	7 1 42 20	7 7 38 35	3 32 2	3 54 41	13 18	
10 Sab.	7 13 35 55	7 19 34 37	4 14 49	4 32 14	14 3	
11 Dom.	7 25 34 55	8 1 37 5	4 46 43	4 58 5	14 49	
12 Lun.	8 7 41 25	8 13 48 16	5 6 9	5 10 48	15 37	
13 Mart.	8 19 57 58	8 26 10 51	5 11 54	5 9 22	16 26	
14 Merc.	9 2 27 19	9 8 47 46	5 3 8	4 53 8	17 17	
15 Giov.	9 15 12 36	9 21 42 12	4 39 22	4 21 52	18 9	
16 Ven.	9 28 16 58	10 4 57 17	4 0 42	3 36 0	19 2	
17 Sab.	10 11 43 24	10 18 35 38	3 7 56	2 36 46	19 56	
18 Dom.	10 25 34 8	11 2 38 57	2 2 48	1 26 28	20 49	
19 Lun.	11 9 49 59	11 17 6 58	0 48 16	0 8 47	21 44	
20 Mart.	11 24 29 50	0 1 56 54	0 31 19A	1 11 17A	22 39	
21 Merc.	0 9 28 21	0 17 2 51	1 50 20	2 72 39	23 35	
22 Giov.	0 24 39 14	1 2 16 14	3 2 27	3 34 0	* *	
23 Ven.	1 9 52 34	1 17 26 54	4 1 41	4 24 58	0 32	
24 Sab.	1 24 57 58	2 2 24 40	4 43 27	4 56 56	1 31	
25 Dom.	2 9 45 57	2 17 1 3	5 5 18	5 8 37	2 30	
26 Lun.	2 24 9 21	3 1 10 29	5 7 3	5 0 52	3 28	
27 Mart.	3 8 4 15	3 14 50 41	4 50 23	4 35 59	4 24	
28 Merc.	3 21 20 58	3 28 2 23	4 18 4	3 57 3	5 18	
29 Giov.	4 4 28 24	4 10 48 30	3 33 21	3 7 22	6 8	
30 Ven.	4 17 3 17	4 23 13 21	2 39 29	2 10 5	6 56	

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna		DIAMETRO orizzontale della Luna		Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			mezzo di medio.	mezza notte media.	mezzo di edio.	mezza notte media.		
1	h 2	16° 25'	' 11	55' 51"	' 40	' 29	o o S	h 2 M
2	8 55	14 10	55 32	55 15	30 19	30 9	1 0	2 42
3	9 46	11 16	54 59	54 46	30 1	29 54	1 58	3 20
4	10 34	7 55	54 35	54 25	29 48	29 42	2 56	3 54
5	11 22	4 16	54 17	54 10	29 37	29 34	3 58	4 20
6	12 8	0 26	54 4	54 0	29 31	29 29	4 57	4 48
7	12 55	3 23A	53 58	53 56	29 27	29 27	5 53	5 17
8	13 41	7 4	53 56	53 57	29 26	29 27	6 52	5 45
9	14 29	10 28	53 59	54 3	29 28	29 50	7 51	6 12
10	15 18	13 26	54 8	54 15	29 33	29 35	8 49	6 39
11	16 8	15 50	54 23	54 33	29 41	29 46	9 47	7 13
12	17 0	17 30	54 44	54 57	29 53	29 59	10 43	7 47
13	17 54	18 19	55 12	55 29	30 8	30 17	11 38	8 37
14	18 49	18 11	55 48	56 8	30 27	30 38	* *	9 12
15	19 45	17 1	56 30	56 54	30 51	31 4	0 29 M	10 5
16	20 42	14 50	57 19	57 45	31 17	31 32	1 16	11 4
17	21 39	11 41	58 12	58 40	31 46	32 1	1 59	0 9 S
18	22 37	7 42	59 7	59 33	32 16	32 30	2 39	1 17
19	23 35	3 7	59 57	60 20	32 44	32 56	3 16	2 30
20	0 35	1 48B	60 40	60 56	33 7	33 16	3 50	3 46
21	1 35	6 59	61 8	61 15	33 22	33 26	4 27	4 59
22	* *	* *	61 18	61 16	33 28	33 27	5 3	6 17
23	2 36	11 3	61 9	60 56	33 23	33 16	5 41	7 33
24	3 39	14 37	60 40	60 21	33 7	32 56	6 23	8 49
25	4 42	17 5	59 57	59 32	32 44	32 30	7 9	9 59
26	5 44	18 19	59 4	58 36	32 15	31 59	7 59	11 1
27	6 44	18 18	58 6	57 38	31 43	31 27	8 53	11 55
28	7 42	17 12	57 10	56 43	31 12	30 58	9 51	* *
29	8 37	15 11	56 18	55 55	30 44	30 31	10 51	0 43 M
30	9 29	12 27	55 33	55 14	30 19	30 9	11 51	1 21

APRILE 1830.

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

	Oriente	15 ^h 0'	Occidente
1	.4	○	3 12.
2	.4 3. .1	○ 2.	
3	3. 2.	.4 ○	1.
4	.3 .1	○ .2	.4
5		○ 1.	.2. .4 30
6	01	2.	○ .3 .4
7	.2 1.	○	3. .4
8		○ 1 3. .3	4.
9	3 1	○ 2.	4.
10	3. 2.	○ 1.	.4.
11	.3 .1	○ 4.	20
12	4. .3	○ 1. 2.	
13	4. 2. .1	○	.5
14	4. .2 1.	○	.3
15	4.	○ .1	3 2
16	.4	1. 3.	○ 2.
17	.4 3. 2.	○	.1
18	.4 .3 .1 .2	○	
19	.4 .3	○ 1.	.2
20	2. 1	○ 4	.3
21	.2	○	.4 .3 10
22		○ .1 .2 3.	.4
23		1. 3.	○ 2. .4
24	3. 2.	○	.1 .4
25	.3 1. .2	○	4.
26	.3	○ 1. .2	.4.
27	02	.1 ○	.3 4.
28	04	.2 ○ 1.	.3
29	01	4.	○ .2 .5.
30	03	4.	1. ○ .2.

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSI DE'SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
7	Plenilunio 12 ^h 40'	2	I. SATELLITE.
15	Ultimo quarto 4 55	3	3 56 25 imm.
21	Novilunio 19 50	3	22 24 22
28	Primo quarto 23 25	5	16 53 15
	CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE.	7	11 21 43
2	τ Ω 4. ^a 15 43	9	5 50 6
3	β ΗΠ 3. 4. ^a 3 5	11	0 18 35
4	θ ΗΠ 4. 5. ^a 22 0	12	18 46 59
6	χ ΗΠ 4. ^a 6 59	* 14	13 15 28
8	γ Δ 4. 5. ^a 0 19	16	7 43 53
8	η Δ 4. 5. ^a 4 43	18	2 12 23
8	θ Δ 4. 5. ^a 9 43	19	20 40 49
9	φ Οφιuco 4. 5. ^a 3 2	* 21	15 9 19
9	μ ΗΠ 5. ^a 8 11	23	9 37 46
12	d ♀ 5. ^a 7 12	25	4 6 17
12	ρ ♀ 5. ^a 9 15	26	22 34 44
16	λ ≈ 4. ^a 6 48	28	17 3 17
16	φ ≈ 5. ^a 16 19	* 30	11 31 45
19	μ Χ 5. ^a 3 49		II. SATELLITE.
19	ξ ¹ Balena 5. ^a 21 25	1	0 10 43
22	γ Δ 3. 4. ^a 0 18	* 4	13 27 40
22	θ Δ 5. ^a 3 45	8	2 44 34
22	α Δ 1. ^a 6 43	* 11	16 1 28
24	□ 5. ^a 22 0	15	4 18 21
25	λ □ 4. 5. ^a 6 47	18	18 35 12
25	ξ Ω 5. ^a 12 4	22	7 52 4
29	τ Σ 4. ^a 22 0	25	21 8 57
30	β ΗΠ 3. 4. ^a 10 0	29	10 25 49
31	η ΗΠ 3. 4. ^a 1 30		III. SATELLITE.
	FENOMENI ED OSSERVAZIONI.	*	14 19 40 imm.
5	ψ stazionario.	7	17 26 43 em.
9	φ nella mass. latit. elioc. B.	14	18 17 50 imm.
10	φ 44. ^a Χ.	21	21 25 41 em.
16	in massima elongazione orientale.	22	1 24 46 em.
20	φ in massima elongazione occiden-	29	2 15 2 imm.
21	○ in □ a 3 ^h 37 ^m .	29	5 24 27 em.
24	φ φ 132 ψ.		IV. SATELLITE.
		15	0 30 52 imm.
		15	2 34 14 em.
		31	18 26 15 imm.
		31	20 43 32 em.

Giorni dell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	TEMPO medio a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì medio.	Nascere del Sole.	Tramontare del Sole.
121	1	Sab.	23 56' 59,3	2 32' 30,5	2 35' 31,4	4 53'	7 7
122	2	Dom.	23 56 51,7	2 36 19,4	2 39 27,9	4 52	7 8
123	3	Lun.	23 56 44,6	2 40 8,9	2 43 24,5	4 50	7 10
124	4	Mart.	23 56 38,1	2 43 58,9	2 47 21,0	4 49	7 11
125	5	Merc.	23 56 32,1	2 47 49,5	2 51 17,6	4 48	7 12
126	6	Giov.	23 56 26,8	2 51 40,6	2 55 14,1	4 46	7 14
127	7	Ven.	23 56 21,9	2 55 32,2	2 59 10,7	4 45	7 15
128	8	Sab.	23 56 17,6	2 59 24,5	3 3 7,2	4 44	7 16
129	9	Dom.	23 56 13,8	3 3 17,3	3 7 3,8	4 43	7 17
130	10	Lun.	23 56 10,6	3 7 10,7	3 11 0,4	4 41	7 19
131	11	Mart.	23 56 8,1	3 11 4,6	3 14 56,9	4 40	7 20
132	12	Merc.	23 56 6,1	3 14 59,2	3 18 53,5	4 39	7 21
133	13	Giov.	23 56 4,8	3 18 54,4	3 22 50,0	4 38	7 22
134	14	Ven.	23 56 3,9	3 22 50,1	3 26 46,6	4 37	7 23
135	15	Sab.	23 56 3,8	3 26 46,5	3 30 43,1	4 36	7 24
136	16	Dom.	23 56 4,2	3 30 43,5	3 34 39,7	4 34	7 26
137	17	Lun.	23 56 5,2	3 34 41,0	3 38 36,2	4 33	7 27
138	18	Mart.	23 56 6,7	3 38 39,1	3 42 32,8	4 32	7 28
139	19	Merc.	23 56 9,0	3 42 37,9	3 46 29,3	4 31	7 29
140	20	Giov.	23 56 11,6	3 46 37,1	3 50 25,9	4 30	7 30
141	21	Ven.	23 56 14,8	3 50 36,9	3 54 22,5	4 29	7 31
142	22	Sab.	23 56 18,7	3 54 37,3	3 58 19,0	4 28	7 32
143	23	Dom.	23 56 23,0	3 58 38,2	4 2 15,6	4 27	7 33
144	24	Lun.	23 56 27,9	4 2 39,7	4 6 12,1	4 26	7 34
145	25	Mart.	23 56 33,2	4 6 41,6	4 10 8,7	4 25	7 35
146	26	Merc.	23 56 39,2	4 10 44,1	4 14 5,2	4 24	7 36
147	27	Giov.	23 56 45,5	4 14 47,0	4 18 1,8	4 23	7 37
148	28	Ven.	23 56 52,4	4 18 50,5	4 21 58,3	4 22	7 38
149	29	Sab.	23 56 59,6	4 22 54,3	4 25 54,0	4 21	7 39
150	30	Dom.	23 57 7,2	4 26 58,5	4 29 51,5	4 20	7 40
151	31	Lun.	23 57 15,3	4 31 3,1	4 33 48,0	4 19	7 41

Giorni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole bereale.	LOGARITMO della distanza della Terra dal Sole.
1	1° 16' 33" 1,1	38° 7' 40"	15° 0' 32"	0,0035948
2	1 11 31 0,3	39 4 54	15 18 37	0,0036985
3	1 12 29 15,6	40 2 17	15 36 28	0,0038013
4	1 13 27 20,0	40 59 47	15 54 3	0,0039034
5	1 14 25 22,5	41 57 26	16 11 23	0,0040048
6	1 15 23 23,1	42 55 13	16 28 26	0,0041056
7	1 16 21 22,2	43 53 8	16 45 13	0,0042058
8	1 17 19 19,6	44 51 12	17 1 43	0,0043053
9	1 18 17 15,5	45 49 24	17 17 56	0,0044048
10	1 19 15 10,0	46 47 40	17 35 53	0,0045019
11	1 20 13 3,1	47 46 15	17 49 31	0,0045990
12	1 21 10 54,9	48 44 54	18 4 52	0,0046951
13	1 22 8 45,5	49 43 42	18 19 55	0,0047904
14	1 23 6 34,8	50 42 38	18 34 39	0,0048843
15	1 24 4 23,0	51 41 43	18 49 5	0,0049768
16	2 25 2 10,1	52 40 58	19 5 11	0,0050679
17	2 25 59 56,1	53 40 21	19 16 59	0,0051573
18	2 26 57 41,0	54 39 53	19 30 27	0,0052448
19	2 27 55 24,8	55 39 34	19 43 35	0,0053303
20	2 28 53 7,4	56 39 23	19 56 24	0,0054137
21	2 29 50 48,8	57 39 20	20 8 52	0,0054950
22	2 0 48 29,0	58 39 26	20 20 59	0,0055742
23	2 1 46 7,9	59 39 39	20 32 45	0,0056511
24	2 2 43 45,6	60 40 0	20 44 10	0,0057258
25	2 3 41 22,0	61 40 29	20 55 14	0,0057984
26	2 4 38 57,0	62 41 6	21 5 57	0,0058688
27	2 5 36 30,6	63 41 49	21 16 17	0,0059372
28	2 6 34 2,9	64 42 40	21 26 16	0,0060035
29	2 7 31 33,8	65 43 37	21 36 52	0,0060678
30	2 8 29 3,3	66 44 40	21 45 6	0,0061303
31	2 9 26 31,5	67 45 50	21 53 57	0,0061911

	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della Luna pel meridiano.
			a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1	Sab.	4 29 19 17	5 5 21 46	1 39 31A	1 8 8A	7 42	
2	Dom.	5 11 21 22	5 17 18 43	0 36 16	0 4 13	8 26	
3	Lun.	5 23 14 22	5 29 8 52	0 27 42B	0 59 10B	9 8	
4	Mart.	6 5 2 43	6 10 56 23	0 29 55	1 59 37	9 50	
5	Merc.	6 16 50 16	6 22 44 46	2 28 2	2 54 51	10 33	
6	Giov.	6 28 40 10	7 4 36 44	3 19 48	3 42 38	11 16	
7	Ven.	7 10 34 45	7 16 34 22	4 3 4	4 20 53	12 0	
8	Sab.	7 22 35 47	7 28 39 9	4 35 52	4 47 48	12 47	
9	Dom.	8 4 44 35	8 10 52 15	4 56 31	5 1 52	13 34	
10	Lun.	8 17 2 15	8 23 14 45	5 3 43	5 2 2	14 24	
11	Mart.	8 29 29 55	9 5 47 54	4 56 42	4 47 44	15 14	
12	Merc.	9 12 8 55	9 18 33 9	4 35 9	4 19 1	16 6	
13	Giov.	9 25 0 52	10 1 32 17	3 59 25	3 36 30	16 57	
14	Ven.	10 8 7 41	10 14 47 18	3 10 29	2 41 36	17 49	
15	Sab.	10 21 31 26	10 28 20 19	2 10 8	1 36 27	18 41	
16	Dom.	11 5 14 10	11 12 13 6	1 0 58	0 24 8	19 33	
17	Lun.	11 19 17 12	11 26 26 26	0 13 30A	0 51 20A	20 26	
18	Mart.	0 3 40 37	0 10 59 24	1 28 46	2 5 5	21 20	
19	Merc.	0 18 22 15	0 25 48 28	2 39 38	3 11 41	22 15	
20	Giov.	1 3 17 13	1 10 47 26	3 40 33	4 5 42	23 12	
21	Ven.	1 18 18 2	1 25 47 49	4 26 35	4 42 49	* *	
22	Sab.	2 3 15 33	2 10 40 5	4 54 7	5 0 24	0 11	
23	Dom.	2 18 0 21	2 25 15 23	5 1 37	4 57 56	1 10	
24	Lun.	3 2 24 26	3 9 26 54	4 49 36	4 36 57	2 9	
25	Mart.	3 16 22 26	3 23 10 51	4 20 24	4 0 23	3 6	
26	Merc.	3 29 52 9	4 6 26 31	3 37 21	3 11 47	3 59	
27	Giov.	4 12 54 16	4 19 15 53	2 44 8	2 14 51	4 50	
28	Ven.	4 25 31 50	5 1 42 44	1 44 21	1 13 0	5 37	
29	Sab.	5 7 49 14	5 13 51 58	0 41 10	0 9 11	6 23	
30	Dom.	5 19 51 39	5 25 48 57	0 22 37B	0 53 57B	7 6	
31	Lun.	6 1 44 31	6 7 39 1	1 24 32	1 54 5	7 48	

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna		DIAMETRO orizzontale della Luna		Nasce della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte media.	a mezzo di medio.	a mezza notte media.		
1	h 10 19	o 9 11B	54' 57"	54' 42"	30' 0"	29' 52"	o 49 S	h 1 51 M
2	11 6	5 35	54 30	54 19	29 45	29 39	1 51	2 25
3	11 53	1 47	54 11	54 5	29 35	29 31	2 49	2 53
4	12 39	2 44A	54 1	53 59	29 29	29 28	3 45	3 21
5	13 26	5 51	53 58	53 59	29 27	29 29	4 44	3 49
6	14 13	9 24	54 1	54 5	29 29	29 31	5 44	4 16
7	15 2	12 34	54 10	54 16	29 34	29 38	6 42	4 42
8	15 52	15 13	54 24	54 33	29 41	29 46	7 42	5 14
9	16 44	17 11	54 42	54 53	29 52	29 58	8 39	5 48
10	17 37	18 19	55 5	55 18	30 4	30 11	9 36	6 25
11	18 32	18 31	55 32	55 47	30 19	30 27	10 27	7 10
12	19 27	17 42	56 3	56 20	30 36	30 45	11 16	8 1
13	20 23	15 53	56 38	56 58	30 55	31 6	11 59	8 58
14	21 19	13 7	57 18	57 40	31 17	31 28	* *	9 59
15	22 15	9 32	58 2	58 24	31 40	31 52	o 37 M	11 5
16	23 11	5 16	58 46	59 7	32 5	32 16	1 15	o 11 S
17	o 8	o 35	59 28	59 48	32 28	32 39	1 49	1 25
18	1 6	4 14B	60 5	60 21	32 48	32 56	2 23	2 37
19	2 5	8 51	60 33	60 42	33 3	33 8	3 0	3 52
20	3 6	12 54	60 47	60 48	33 11	33 11	3 35	5 7
21	* *	* *	60 45	60 37	33 9	33 5	4 13	6 21
22	4 9	16 2	60 25	60 10	32 59	32 51	4 56	7 34
23	5 13	17 58	59 51	59 28	32 40	32 28	5 44	8 42
24	6 16	18 37	59 5	58 39	32 15	32 1	6 37	9 43
25	7 16	18 2	58 12	57 45	31 46	31 31	7 36	10 34
26	8 14	16 22	57 17	56 51	31 16	31 2	8 36	11 18
27	9 9	13 51	56 25	56 1	30 48	30 35	9 38	11 56
28	10 0	10 42	55 39	55 19	30 25	30 12	10 38	* *
29	10 49	7 9	55 2	54 47	30 2	29 54	11 40	o 28 M
30	11 37	3 21	54 34	54 23	29 47	29 41	o 40 S	o 56
31	12 23	o 32A	54 15	54 10	29 37	29 34	1 37	1 24

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

	Oriente	14 ^h 0 ^m	Occidente
1	4.	5. 2.	○ .1
2	4.	5. 1 δ 2	○
3	.4	.3	○ 1. .2
4	.4	.1	○ 2. .3
5	.4	2.	○ 1. .3
6		4. .1 ○ .2	5.
7		1. ○ 3. 4. 2.	
8		3. 2.	○ .1 .4
9	5.	.2 1.	○ .4
10	.5	○ .1.2	.4
11		.1 ○ 3 δ 2	.4.
12	2.	○ 1.	.3 .4.
13		.1 ○	3. 4. 20
14	○ 1	○ 3. 4 δ 2	
15		3. 2. 4. ○ 1	
16	5. 4.	.2 1.	○ .1.2
17	4.	.5	○ .1.2
18	4.	1.	○ 2. 50
19	.4	2.	○ 1. .3
20	.4	.1.2 ○	.3
21	4	○ 1. 3. .2	
22	○ 1	.4 3. 2. ○	
23		3. .2 1 δ 4	○
24		.5	○ 1 δ 2 .4
25		1. .3 ○	2. .4
26		2.	○ .1 .3 .4
27		.1.2 ○	3. .4
28		○ 1. 3 δ 2	.4.
29	○ 2	3. .1 ○	4. 10
30	3. 2.	○	4. .1
31	.3	○ 1 δ 4 δ 2	

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSI DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
6	Plenilunio 2 ^b 56'		I. SATELLIT.
13	Ultimo quarto 11 27	1	6 0 19 imm.
20	Novilunio 3 40	3	0 28 47
27	Primo quarto 15 53	4	18 57 20
	CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE.	*	15 25 51
1	θ III 4. 5. ^a 4 41	6	7 54 26
2	x II 4. 5. ^a 13 41	8	2 22 57
4	γ V 4. 5. ^a 6 53	10	20 51 32
4	η V 4. 5. ^a 11 18	11	15 20 4
4	θ V 4. 5. ^a 16 14	15	9 48 41
5	φ Oifuco 4. 5. ^a 7 26	15	4 17 14
5	m III 5. ^a 12 35	18	22 45 51
6	d \gg 5. ^a 4 11	20	17 14 25
6	p \gg 5. ^a 6 18	22	11 43 2
12	λ V 4. ^a 12 40	24	6 11 39
12	φ V 5. ^a 12 18	26	0 40 18
15	μ X 5. ^a 14 30	27	19 8 53
16	ξ Balena 5. ^a 5 40	29	15 37 34
16	μ Balena 4. ^a 18 38		II. SATELLIT.
18	γ V 3. 4. ^a 9 49	1	23 42 40 imm.
18	θ V 5. ^a 15 41	5	12 59 33
18	α V 1. ^a 16 24	9	2 16 25
23	ξ V 5. ^a 20 54	12	15 33 21
24	α V 5. ^a 13 24	16	4 50 15
25	τ V 4. ^a 6 27	19	18 7 12
26	β III 3. 4. ^a 17 38	23	7 24 9
27	η III 3. 4. ^a 9 2	26	20 41 7
28	θ III 4. 5. ^a 0 8	* 30	9 58 9
	FENOMENI ED OSSERVAZIONI.	5	III. SATELLITE.
3	○ stazionario.	5	6 15 58 imm.
4	○ nell' afelio.	5	9 24 7 em.
11	○ nell' afelio.	12	10 13 35 imm.
15	○ inf. ○.	* 12	13 24 30 em.
21	○ in ○ a 11 ^h 30 ^m .	* 19	14 12 43 imm.
27	○ in massima latit. eliocentrica A.	19	17 24 23 em.
27	○ stazionario.	26	18 11 56 imm.
		26	21 24 20 em.
			IV. SATELLIT.
		* 17	12 22 51
		* 17	14 55 45

Giorni dell'anno,	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	TEMPO medio a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì medio.	Nascere del Sole.	Tramontare del Sole.
152	1	Mart.	23 57 11,8	4 35 8,3	4 37 11,6	4 19	7 41
153	2	Merc.	23 57 32,8	4 39 13,7	4 41 41,1	4 18	7 42
154	3	Giov.	23 57 42,0	4 43 19,5	4 45 37,7	4 18	7 42
155	4	Ven.	23 57 51,7	4 47 25,7	4 49 34,2	4 17	7 43
156	5	Sab.	23 58 1,7	4 51 32,3	4 53 30,8	4 16	7 44
157	6	Dom.	23 58 12,0	4 55 39,1	4 57 27,3	4 16	7 44
158	7	Lun.	23 58 22,6	4 59 46,3	5 1 23,9	4 15	7 45
159	8	Mart.	23 58 33,6	5 3 54,0	5 5 20,5	4 15	7 45
160	9	Merc.	23 58 44,8	5 8 1,8	5 9 17,1	4 14	7 46
161	10	Giov.	23 58 56,8	5 12 9,8	5 13 13,7	4 14	7 46
162	11	Ven.	23 59 8,1	5 16 18,2	5 17 10,2	4 14	7 46
163	12	Sab.	23 59 20,1	5 20 26,8	5 21 6,8	4 13	7 47
164	13	Dom.	23 59 32,3	5 24 35,5	5 25 3,3	4 13	7 47
165	14	Lun.	23 59 44,7	5 28 44,6	5 28 59,9	4 13	7 47
166	15	Mart.	23 59 57,3	5 32 53,7	5 32 56,4	4 13	7 47
167	16	Merc.	0 0 10,1	5 37 3,1	5 36 53,0	4 13	7 47
168	17	Giov.	0 0 23,0	5 41 12,5	5 40 49,5	4 12	7 48
169	18	Ven.	0 0 35,9	5 45 22,1	5 44 46,1	4 12	7 48
170	19	Sab.	0 0 49,0	5 49 31,7	5 48 42,6	4 12	7 48
171	20	Dom.	0 1 2,1	5 53 41,3	5 52 39,1	4 12	7 48
172	21	Lun.	0 1 15,2	5 57 51,0	5 56 35,7	4 12	7 48
173	22	Mart.	0 1 28,3	6 2 0,6	6 0 32,2	4 12	7 48
174	23	Merc.	0 1 41,3	6 6 10,2	6 4 28,8	4 12	7 48
175	24	Giov.	0 1 54,3	6 10 19,8	6 8 25,3	4 12	7 48
176	25	Ven.	0 2 7,1	6 14 29,2	6 12 21,9	4 12	7 48
177	26	Sab.	0 2 19,9	6 18 38,5	6 16 18,4	4 13	7 47
178	27	Dom.	0 2 32,5	6 22 47,8	6 20 15,0	4 13	7 47
179	28	Lun.	0 2 44,8	6 26 56,7	6 24 11,6	4 13	7 47
180	29	Mart.	0 2 57,0	6 31 5,5	6 28 8,2	4 13	7 47
181	30	Merc.	0 3 8,9	6 35 14,0	6 32 4,8	4 13	7 47

LOGARITMO della distanza della Terra dal Sole.	DECLINAZIONE del Sole boreale.	ASCENSIONE retta del Sole.	GIUGNO Sole.
0,0062502	22° 2' 25"	68° 47' 6"	15 58,5
0,0063080	22 10 30	69 48 28	16 24,3
0,0063645	22 18 13	70 49 55	16 49,0
0,0064196	22 23 32	71 51 28	16 12,6
0,0064734	22 32 27	72 53 7	13 55,2
0,0065260	22 38 59	73 54 50	15 10 56,9
0,0065773	22 45 7	74 56 38	16 8 17,8
0,0066273	22 50 51	75 58 31	17 5 38,0
0,0066758	22 56 11	77 0 28	18 2 57,6
0,0067229	23 1 7	78 2 29	19 0 16,6
0,0067686	23 5 38	79 4 34	19 57 35,1
0,0068125	23 9 46	80 6 43	20 54 53,4
0,0068547	23 13 29	81 8 54	21 52 11,2
0,0068949	23 16 47	82 11 9	22 49 28,6
0,0069330	23 19 41	83 13 26	23 46 45,8
0,0069689	23 22 10	84 15 46	2 24 44 2,7
0,0070025	23 24 15	85 18 7	2 25 41 19,4
0,0070337	23 25 55	86 20 30	2 26 38 55,7
0,0070622	23 27 10	87 22 54	2 27 35 51,7
0,0070881	23 28 0	88 25 18	2 28 33 7,4
0,0071115	23 28 25	89 27 43	2 29 30 22,8
0,0071323	23 28 25	90 30 7	3 0 27 37,9
0,0071506	23 28 1	91 32 31	3 1 24 52,5
0,0071664	23 27 12	92 34 54	3 2 22 6,6
0,0071797	23 25 58	93 37 15	3 3 19 20,3
0,0071906	23 24 19	94 39 55	26 3 4 16 33,5
0,0071991	23 22 16	95 41 52	27 3 5 13 46,2
0,0072055	23 19 47	96 44 6	28 3 6 10 58,4
0,0072097	23 16 55	97 46 18	29 3 7 8 10,3
0,0072121	23 13 38	98 48 26	30 3 8 5 21,8

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passeggio della Luna pel meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1 Mart.	6 15° 35' 2"	6 19° 27' 10"	2 22 21 B	2 49 38	8 30	
2 Merc.	6 25 21 56	7 1 17 49	3 13 57	3 36 48	9 13	
3 Giov.	7 7 15 14	7 13 14 32	3 57 21	4 15 29	9 57	
4 Ven.	7 19 16 1	7 25 19 55	4 30 37	4 42 54	10 43	
5 Sab.	8 1 26 26	8 7 35 40	4 52 1	4 57 48	11 30	
6 Dom.	8 15 47 44	8 20 2 39	5 0 7	4 58 50	12 20	
7 Lun.	8 25 20 30	9 2 41 14	4 53 55	4 45 19	13 10	
8 Mart.	9 9 4 51	9 15 31 20	4 33 4	4 17 15	14 2	
9 Merc.	9 23 9 44	9 28 32 54	3 57 57	3 35 23	14 55	
10 Giov.	10 5 7 39	10 11 45 58	3 9 45	2 41 20	15 47	
11 Ven.	10 18 26 55	10 25 10 54	2 10 29	1 37 33	16 38	
12 Sab.	11 5 58 2	11 8 48 25	1 2 57	0 27 9	17 29	
13 Dom.	11 15 42 7	11 22 39 16	0 9 21 A	0 46 14	18 20	
14 Lun.	11 29 39 52	0 6 43 56	1 22 18	1 57 37	19 12	
15 Mart.	0 15 51 24	0 21 1 54	2 31 21	3 2 55	20 5	
16 Merc.	0 28 15 19	1 5 31 8	3 31 46	3 57 19	20 59	
17 Giov.	1 12 48 49	1 20 7 40	4 19 5	4 36 40	21 56	
18 Ven.	1 27 26 55	2 4 45 41	4 49 43	4 58 9	22 54	
19 Sab.	2 12 3 2	2 19 18 6	5 1 23	4 59 54	23 52	
20 Dom.	2 26 39 56	3 3 37 44	4 53 38	4 42 49	* *	
21 Lun.	3 10 40 47	3 17 38 29	4 27 47	4 8 54	0 50	
22 Mart.	3 24 30 23	4 1 16 12	3 46 38	3 21 27	1 46	
23 Merc.	4 7 55 48	4 14 29 14	2 53 49	2 24 16	2 40	
24 Giov.	4 20 56 38	4 27 18 18	1 53 15	1 21 18	3 29	
25 Ven.	5 3 34 39	5 19 46 8	0 48 38	0 15 50	4 16	
26 Sab.	5 15 53 20	5 21 56 50	0 16 48 B	0 48 55 B	5 1	
27 Dom.	5 27 57 16	6 3 55 19	1 20 15	1 50 29	5 46	
28 Lun.	6 9 51 38	6 15 46 55	2 19 22	2 46 40	6 27	
29 Mart.	6 21 41 49	6 27 36 56	3 12 7	3 35 38	7 9	
30 Merc.	7 3 33 56	7 9 30 21	3 56 39	4 15 16	7 53	

	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna		DIAMETRO orizzontale della Luna		Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			mezzo di medio.	mezza notte media.	mezzo di medio.	mezza notte media.		
1	15° 10'	4° 23'A	54' 6"	54' 5"	29' 32"	29' 31"	2 35' 8"	1 53' M
2	13 56	8 4	54' 6	54' 8	29' 32	29' 33	3 35	2 19
3	14 44	11 26	54' 13	54' 20	29' 36	29' 39	4 33	2 45
4	15 34	14 20	54' 28	54' 37	29' 44	29' 49	5 34	3 15
5	16 26	16 37	54' 48	55' 0	29' 55	30' 1	6 33	3 48
6	17 19	18 7	55' 12	55' 25	30' 8	30' 15	7 31	4 34
7	18 14	18 41	55' 39	55' 53	30' 22	30' 30	8 24	5 5
8	19 10	18 13	56' 7	56' 22	30' 38	30' 46	9 14	5 56
9	20 6	16 44	56' 36	56' 52	30' 54	31' 2	10 0	6 50
10	21 2	14 15	57' 7	57' 22	31' 11	31' 19	10 41	7 52
11	21 58	10 56	57' 38	57' 54	31' 28	31' 36	11 19	8 57
12	22 53	6 55	58' 10	58' 25	31' 45	31' 53	11 53	9 53
13	23 48	2 27	58' 40	58' 55	32' 2	32' 10	* *	11 13
14	0 44	2 14B	59' 9	59' 22	32' 17	32' 24	0 25 M	0 25 S
15	1 41	6 52	59' 33	59' 43	32' 31	32' 36	0 58	1 34
16	2 40	11 6	59' 51	59' 57	32' 40	32' 44	1 33	2 49
17	3 40	14 39	60' 0	60' 0	32' 45	32' 45	2 8	4 0
18	4 42	17 11	59' 58	59' 52	32' 44	32' 41	2 48	5 14
19	5 45	18 31	59' 43	59' 31	32' 36	32' 29	3 32	6 24
20	* *	* *	59' 17	58' 59	32' 21	32' 12	4 22	7 26
21	6 47	18 34	58' 40	58' 19	32' 1	31' 50	5 18	8 22
22	7 47	17 26	57' 56	57' 32	31' 37	31' 24	6 17	9 11
23	8 44	15 17	57' 8	56' 44	31' 11	30' 58	7 21	9 53
24	9 38	12 21	56' 21	55' 59	30' 46	30' 34	8 23	10 27
25	10 29	6 55	55' 39	55' 20	30' 22	30' 12	9 25	10 59
26	11 18	5 8	55' 3	54' 49	30' 3	29' 55	10 28	11 26
27	12 6	1 13	54' 36	54' 27	29' 48	29' 43	11 26	11 54
28	12 52	2 42A	54' 19	54' 15	29' 39	29' 37	0 24 S	* *
29	13 39	6 29	54' 12	54' 12	29' 35	29' 35	1 22	0 22 M
30	14 26	10 0	54' 14	54' 20	29' 36	29' 39	2 24	0 50

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

	Oriente	15 ^h 0'	Occidente
1		164.5 ○	2.
2	4.	2. ○ .1 .3	
3	4.	1. .2 ○	.3
4	4.	○ 1. 3○2	
5	4	1○3. ○2.	
6	4	3. .2 ○1.	
7	.4 .3	○ .1 .2	
8		.4 .31. ○ 2.	
9		2. ○ .1 .3	40
10		1○2 ○ .4 .3	
11		○ 1. .2 3. .4	
12	○3	.1 ○ 2.	.4
13		3. 2. ○ 1.	.4
14	02	3. ○	4. 10
15		3. 1. ○ 2. 4.	
16		2. ○ .1 .3 4.	
17		.2○1 ○ 4. .3	
18		4. ○ .1 .2 3.	
19		4. 1. ○ 3. 2.	
20	4.	3○2 ○ 1.	
21	4.	3. .1 ○	20
22	4	3 ○ 2.	10
23	.4	2. ○ 1○3	
24	.4	.2 1. ○ .3	
25		.4 ○ 1○2 3.	
26		1. ○ 3○42.	
27		3○2 ○ 1. 4	
28	3.	.1 .2 ○ .4	
29		.3 ○ 1. 2. .4	
30		2. ○ 3○1 .4	

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSE DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
5	Pleilumio 15 ^h 2 ^m	1	I. SATELLITE.
12	Ultimo quarto 16 14	3	8 6 10 imm.
19	Novilumio 12 51	3	2 34 52
27	Primo quarto 9 13	4	21 3 30
CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE		6	17 46 12 em.
1	γ Δ 4. 5. ^a 14 40	*	12 14 52
1	η Δ 4. 5. ^a 19 8	10	6 43 57
1	θ Δ 4. 5. ^a 23 48	12	1 12 18
5	d ≫ 5. ^a 19 42	13	19 41 3
5	e ≫ 5. ^a 21 43	*	14 9 45
9	λ ≈ 4. ^a 18 11	17	8 38 31
10	φ ≈ 5. ^a 3 46	19	3 7 13
11	29 Η 5. ^a 0 32	20	21 36 1
12	μ Η 5. ^a 17 20	22	16 4 44
13	ξ ¹ Balena 5. ^a 11 42	*	10 33 32
14	μ Balena 4. ^a 1 2	26	5 2 16
15	γ Ω 3. 4. ^a 17 14	27	23 31 5
15	α Ω 1. ^a 21 31	29	17 59 51
18	λ □ 4. 5. ^a 18 47	*	12 28 41
21	α Ω 5. ^a 22 18	II. SATELLITE.	
23	τ Ω 4. ^a 14 52	3	23 15 11 imm.
24	β II 3. 4. ^a 1 55	7	14 11 36 em.
24	η II 3. 4. ^a 17 14	11	4 28 50
25	θ II 4. 5. ^a 20 10	14	17 46 6
27	χ II 4. ^a 5 3	18	7 3 24
28	γ Δ 4. 5. ^a 22 18	21	20 20 46
28	η Δ 4. 5. ^a 15 0	*	9 58 10
30	φ Osiuco 4. 5. ^a 1 19	28	22 55 38
30	m III 5. ^a 6 29	III. SATELLITE.	
FENOMENI ED OSSERVAZIONI.		3	22 11 2 imm.
1	δ apogea.	4	1 24 10 em.
2	Ω nella mass. latit. elioc. B.	11	2 10 19 imm.
5	λ δ Θ.	11	5 24 10 em.
8	χ in massima elongaz. occidentale.	18	6 10 12 imm.
13	δ perigea.	18	9 24 48 em.
20	φ ο ω Θ.	*	10 10 8 imm.
21	φ in massima latitudine elioc. B.	25	13 25 24 em.
23	Θ in Ζ a 21 ^h 53 ^m . φ δ □.	IV. SATELLITE.	
27	δ apogea.	4	6 22 5 imm.
31	H Θ Θ.	4	9 2 39 em.
		21	0 21 32 imm.
		21	3 12 52 em.

Giorai dell'anno.	Giorai del mese.	Giorni della settimana.	Tempo medio a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì medio.	Nascere del Sole.	Tramontare del Sole.
182	1	Giov.	0 3 20,8	6 39 22,4	6 36 1,3	4 14	7 46
183	2	Ven.	0 3 32,2	6 43 30,4	6 39 57,9	4 14	7 46
184	3	Sab.	0 3 43,5	6 47 38,3	6 43 54,4	4 14	7 46
185	4	Dom.	0 3 54,4	6 51 45,8	6 47 51,0	4 14	7 46
186	5	Lun.	0 4 5,0	6 55 52,9	6 51 47,5	4 15	7 45
187	6	Mart.	0 4 15,3	6 59 59,8	6 55 44,1	4 15	7 45
188	7	Merc.	0 4 25,3	7 4 6,3	6 59 40,6	4 16	7 44
189	8	Giov.	0 4 36,8	7 8 12,4	7 3 37,2	4 16	7 44
190	9	Ven.	0 4 44,0	7 12 18,2	7 7 33,8	4 17	7 43
191	10	Sab.	0 4 52,9	7 16 23,6	7 11 30,3	4 18	7 42
192	11	Dom.	0 5 1,3	7 20 28,7	7 15 26,9	4 18	7 42
193	12	Lun.	0 5 9,4	7 24 33,3	7 19 23,4	4 19	7 41
194	13	Mart.	0 5 16,9	7 28 37,4	7 23 20,0	4 20	7 40
195	14	Merc.	0 5 24,2	7 32 41,2	7 27 16,5	4 21	7 39
196	15	Giov.	0 5 30,8	8 36 44,4	7 51 15,1	4 22	7 38
197	16	Ven.	0 5 37,1	7 40 47,2	7 35 9,6	4 23	7 37
198	17	Sab.	0 5 42,7	7 44 49,4	7 39 6,2	4 24	7 36
199	18	Dom.	0 5 48,0	7 48 51,2	7 43 2,7	4 25	7 35
200	19	Lun.	0 5 52,6	7 52 52,4	7 46 59,3	4 26	7 34
201	20	Mart.	0 5 56,9	7 56 53,3	7 50 55,8	4 27	7 33
202	21	Merc.	0 6 0,4	8 0 53,4	7 54 52,4	4 28	7 32
203	22	Giov.	0 6 3,6	8 4 53,1	7 58 48,9	4 29	7 31
204	23	Ven.	0 6 6,0	8 8 52,1	8 2 45,5	4 30	7 30
205	24	Sab.	0 6 7,9	8 12 50,5	8 6 42,0	4 31	7 29
206	25	Dom.	0 6 9,1	8 16 48,2	8 10 38,6	4 32	7 28
207	26	Lun.	0 6 9,9	8 20 45,5	8 14 35,1	4 33	7 27
208	27	Mart.	0 6 9,9	8 24 42,1	8 18 31,7	4 34	7 26
209	28	Merc.	0 6 9,3	8 28 38,1	8 22 28,3	4 35	7 25
210	29	Giov.	0 6 8,1	8 32 33,5	8 26 24,9	4 36	7 24
211	30	Ven.	0 6 6,3	8 36 28,3	8 30 21,3	4 37	7 23
212	31	Sab.	0 6 3,9	8 40 22,4	8 34 18,0	4 38	7 22

Giorni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole boreale.	LOGARITMO. della distanza della Terra dal Sole.
1	3° 9' 2" 32,9	99° 50' 31"	23° 9' 56"	0,0072129
2	3° 9 59 43,8	100 52 32	23 5 50	0,0072120
3	3 10 56 54,5	101 54 28	23 1 21	0,0072094
4	3 11 54 5,1	102 56 21	22 56 27	0,0072053
5	3 12 51 15,6	103 58 8	22 51 9	0,0071998
6	3 13 48 26,1	104 59 51	22 45 27	0,0071938
7	3 14 45 36,9	105 1 28	22 39 21	0,0071843
8	3 15 42 48,0	107 3 0	22 32 52	0,0071745
9	3 16 39 59,5	108 4 27	22 26 0	0,0071633
10	3 17 37 11,5	109 5 48	22 18 44	0,0071504
11	3 18 34 23,9	110 7 3	22 11 5	0,0071358
12	3 19 31 36,8	111 8 12	22 3 3	0,0071192
13	3 20 28 50,4	112 9 14	21 54 39	0,0071007
14	3 21 26 45,6	113 10 10	21 45 52	0,0070802
15	3 22 23 19,4	114 10 58	21 36 42	0,0070576
16	3 23 20 35,0	115 11 40	21 27 10	0,0070326
17	3 24 17 51,2	116 12 14	21 17 17	0,0070051
18	3 25 15 8,1	117 12 40	21 7 1	0,0069752
19	3 26 12 25,6	118 12 59	20 56 25	0,0069429
20	3 27 9 43,7	119 13 10	20 45 26	0,0069079
21	3 28 7 24	120 13 12	20 34 7	0,0068703
22	3 29 4 21,6	121 13 7	20 22 27	0,0068503
23	4 0 1 41,3	122 12 52	20 10 27	0,0067876
24	4 0 59 1,5	123 12 29	19 58 6	0,0067427
25	4 1 56 22,2	124 11 56	19 45 26	0,0066955
26	4 2 53 43,3	125 11 15	19 32 26	0,0066459
27	4 3 51 4,9	126 10 24	19 19 6	0,0065949
28	4 4 48 27,0	127 9 24	19 5 27	0,0065403
29	4 5 45 49,6	128 8 15	18 51 29	0,0064851
30	4 6 43 12,8	129 6 57	18 37 13	0,0064281
31	4 7 40 36,6	130 5 29	18 22 59	0,0063696

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della Luna pel meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1 Giov.	7 15° 29' 42"	7 21° 31' 28"	4° 31' 12B	4° 44' 11B	8 37'	
2 Ven.	7 27 36 1	8 3 43 44	5 54 4	5 0 40	9 24	
3 Sab.	8 9 54 50	8 16 9 54	5 5 48	5 3 22	10 13	
4 Dom.	8 22 28 5	8 28 50 20	4 59 14	4 51 20	11 3	
5 Lun.	9 5 16 24	9 11 46 14	4 39 40	4 24 16	11 56	
6 Mart.	9 18 19 42	9 24 56 58	4 5 14	3 42 43	12 48	
7 Merc.	10 1 36 49	10 8 20 4	3 16 56	3 48 12	13 42	
8 Giov.	10 15 6 10	10 21 54 52	2 16 51	1 43 19	14 35	
9 Ven.	10 28 45 59	11 5 39 20	1 8 2	0 31 32	15 27	
10 Sab.	11 12 34 44	11 19 52 3	0 5 59A	0 42 56A	16 18	
11 Dom.	11 26 31 9	0 3 31 57	1 19 46	1 55 33	17 9	
12 Lun.	0 10 34 18	0 17 38 5	2 29 44	3 1 44	18 1	
13 Mart.	0 24 43 8	1 1 49 17	3 31 2	3 57 10	18 53	
14 Merc.	1 8 56 17	1 16 3 50	4 19 39	4 38 10	19 48	
15 Giov.	1 23 11 34	2 0 19 6	4 52 22	5 2 1	20 44	
16 Ven.	2 7 25 58	2 14 31 40	5 7 1	5 7 16	21 41	
17 Sab.	2 21 35 59	2 28 37 22	5 2 50	4 53 51	22 38	
18 Dom.	3 5 36 18	3 12 31 54	4 40 31	4 25 9	23 54	
19 Lun.	3 19 23 43	3 26 11 20	4 2 7	3 37 47	* *	
20 Mart.	4 2 54 25	4 9 32 43	3 10 41	2 41 15	0 28	
21 Merc.	4 16 6 5	4 22 34 31	2 10 0	1 37 24	1 19	
22 Giov.	4 28 58 3	5 5 16 51	1 3 57	0 30 4	2 8	
23 Ven.	5 11 31 11	5 17 41 21	0 3 49B	0 37 10B	2 54	
24 Sab.	5 23 47 48	5 29 50 59	1 10 4	1 41 45	3 39	
25 Dom.	6 5 51 26	6 11 49 42	2 12 6	2 40 49	4 22	
26 Lun.	6 17 46 23	6 23 42 6	3 7 40	3 32 26	5 5	
27 Mart.	6 29 37 29	7 5 33 9	3 54 54	4 14 52	5 47	
28 Merc.	7 11 29 43	7 17 27 49	4 32 8	4 46 32	6 31	
29 Giov.	7 23 28 1	7 29 30 53	4 57 52	5 6 0	7 17	
30 Ven.	8 5 36 54	8 11 46 32	5 10 45	5 11 58	8 4	
31 Sab.	8 18 0 12	8 24 18 14	5 9 33	5 3 24	8 55	

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna		DIAMETRO orizzontale della Luna		Nascer della Luna.	Tramontare della Luna.
			mezzo di medio.	a mezza notte media.	mezzo di medio.	a mezza notte media.		
1	15 15	13° 8'	54' 27"	54' 36"	29' 43"	29' 48"	3 20 S	1 16 M
2	16 5	15 43	54 47	55 0	29 54	30 1	4 21	1 48
3	16 58	17 35	55 14	55 29	30 9	30 17	5 20	2 13
4	17 53	18 54	55 45	56 2	30 26	30 35	6 16	3 4
5	18 49	18 33	56 19	56 36	30 44	30 54	7 10	3 50
6	19 46	17 27	56 52	57 9	31 3	31 12	7 58	4 44
7	20 44	15 19	57 24	57 39	31 20	31 28	8 43	5 42
8	21 41	12 14	57 53	58 6	31 36	31 43	9 20	6 47
9	22 37	8 23	58 18	58 29	31 49	31 55	9 58	7 56
10	23 32	4 1	58 39	58 48	32 1	32 6	10 27	9 4
11	0 27	0 36B	58 56	59 3	32 10	32 14	11 2	10 15
12	1 23	5 14	59 9	59 14	32 17	32 20	11 36	11 24
13	2 20	9 34	59 17	59 19	32 22	32 23	* *	0 36 S
14	3 18	13 19	59 20	59 19	32 23	32 23	0 8 M	1 48
15	4 18	16 13	59 17	59 13	32 22	32 19	0 47	2 59
16	5 19	18 3	59 7	58 59	32 16	32 12	1 26	4 6
17	6 20	18 40	58 50	58 39	32 7	32 1	2 13	5 11
18	7 20	18 7	58 26	58 12	31 54	31 46	3 4	6 10
19	*	*	57 56	57 38	31 37	31 28	4 4	7 2
20	8 19	16 26	57 20	57 1	31 18	31 7	5 5	7 47
21	9 15	13 52	56 41	56 22	30 57	30 46	6 5	8 25
22	10 7	10 38	56 2	55 44	30 35	30 25	7 8	8 58
23	10 58	6 57	55 26	55 10	30 16	30 7	8 12	9 28
24	11 46	3 3	54 55	54 43	29 59	29 52	9 15	9 57
25	12 33	0 55A	54 32	54 24	29 46	29 42	10 13	10 25
26	13 20	4 47	54 18	54 14	29 38	29 36	11 11	10 53
27	14 7	8 26	54 13	54 15	29 36	29 37	0 12 S	1 1 8
28	14 55	11 44	54 18	54 25	29 39	29 42	1 10	1 48
29	15 44	14 33	54 34	54 46	29 47	29 53	2 9	* *
30	16 36	16 45	54 59	55 14	30 0	30 9	3 7	0 21 M
31	17 29	18 9	55 32	55 51	30 19	30 29	4 4	0 59

LUGLIO 1830.

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

Oriente

12^h 0'

Occidente

1		.2	1.	○	.3	4.
2				○	.1.2	364.
3			.1.	○	3.462	
4			2.3.	4.	○	.1
5		3.	4.	.1.2	○	
6		4.	.5		○ 1.	2.
7	•24.			.1 ○		30
8	.4		.2	1.○		.3
9	.4			○ 1.62		3.
10	.4		1.	○	362	
11		.4	2.3.	○	.1	
12		3.	2..1	4.	○	
13		.3		○ 1.	462	
14			1.63	○ 2.		.4
15	•1		.2	○	.5	.4
16				○ .261		.3
17			1.	○	362	4.
18		2.3.		○	.1	4.
19		3.	1.62	○		.4.
20		.3		○ 4.1.	.2	
21			1.6463	○ 2.		
22		4.	2.	○ 1.	.3	
23	01	4.		○		20
24	.4			1.○		362
25	.4			2.○	.1	30
26	.4	3.	.21.	○		
27		.4.3		○	1. .2	
28			.4.3.1	○	2.	
29		2.		○ 1.	.3	40
30				1.62 ○	.4 .3	
31				1.○	2. 3.	.4

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSI DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
4	Plenilunio 1 ^h 34'	2	I. SATELLITE. 6 ^h 57' ^l 25 ^m em.
10	Ultimo quarto 20 45	4	1 26 16
18	Novilunio 0 30	5	19 55 1
26	Primo quarto 2 40	7	14 23 52
	CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE.	9	8 52 39
2	d \Rightarrow 5. ^a 4 10	11	3 21 30
2	p \Rightarrow 5. ^a 6 10	12	21 50 19
6	$\lambda \approx$ 4. ^a 0 56	14	16 19 10
6	$\phi \approx$ 5. ^a 10 26	* 16	10 47 58
8	$\mu \chi$ 5. ^a 22 47	18	5 16 50
9	$\gamma \chi$ 5. ^a 2 50	19	23 45 39
9	ξ Balena 5. ^a 17 7	21	18 14 52
10	μ Balena 4. ^a 6 25	23	12 43 21
11	$\gamma \vartheta$ 3. 4. ^a 22 54	25	7 12 14
12	$\alpha \vartheta$ 1. ^a 5 41	27	1 41 4
15	$\lambda \square$ 4. 5. ^a 1 55	28	20 9 53
18	a Ω 5. ^a 6 31	30	14 33 47
19	τ Ω 4. ^a 23 0		II. SATELLITE.
20	βIII 3. 4. ^a 9 58	* 1	12 13 4 em.
21	ηIII 3. 4. ^a 1 12	5	1 30 38
22	δIII 4. 5. ^a 4 4	8	14 48 11
25	$\gamma \wedge$ 4. 5. ^a 5 17	12	4 5 49
25	$\eta \wedge$ 4. 5. ^a 11 6	15	17 23 29
25	$\delta \wedge$ 4. 5. ^a 16 8	19	6 41 12
26	ϕ Ofiuco 4. 5. ^a 9 40	22	19 58 58
27	d \Rightarrow 5. ^a 5 43	* 26	9 16 48
27	p \Rightarrow 5. ^a 5 25	29	22 34 38
	FENOMENI ED OSSERVAZIONI.		III. SATELLITE.
4	$\zeta \phi$ sup. \odot .	1	14 10 43 imm.
5	$\zeta \phi$ nella mass. latit. elioc. B.	1	17 26 43 em.
8	ζ perigea.	8	18 10 48 imm.
8	$\zeta \phi$ b.	8	21 27 25 em.
11	$\zeta \phi$ $\delta \square$.	15	22 10 56 imm.
13	ζ nel perielio.	16	1 28 12 em.
14	$\zeta \phi$ \odot .	23	2 10 52 imm.
17	Eclisse di \odot invisibile.	23	5 28 47 em.
18	ζ stazionario.	30	6 10 57 imm.
23	ζ apogea.	* 30	9 29 54 em.
23	\odot in III a 5 ^h 26'.	6	IV. SATELLITE.
25	$\zeta \phi$ \odot .	6	18 22 21 imm.
28	$\zeta \phi$ βIII .	23	21 23 18 em.
		23	12 24 53 imm.
		23	15 34 43 em.

Giorni dell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	Tempo medio a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì medio.	Nasere del Sole.	Tramontare del Sole.
213	1	Dom.	0 6' 0,9	8 44' 16,0	8 38' 14,6	4 40	1 1
214	2	Lun.	0 5 57,3	8 48 8,9	8 42 11,1	4 42	7 20
215	3	Mart.	0 5 53,0	8 52 1,2	8 46 7,7	4 43	7 18
216	4	Merc.	0 5 48,2	8 55 52,9	8 50 4,2	4 44	7 16
217	5	Giov.	0 5 42,7	8 59 44,0	8 54 0,8	4 45	7 15
218	6	Ven.	0 5 56,8	9 3 34,9	8 57 57,3	4 46	7 14
219	7	Sab.	0 5 30,1	9 7 24,4	9 1 53,9	4 48	7 12
220	8	Dom.	0 5 22,9	9 11 13,7	9 5 50,4	4 49	7 11
221	9	Lun.	0 5 15,1	9 15 2,9	9 9 47,0	4 50	7 10
222	10	Mart.	0 5 6,9	9 18 50,8	9 13 43,5	4 52	7 8
223	11	Merc.	0 4 58,0	9 22 38,4	9 17 40,1	4 53	7 7
224	12	Giov.	0 4 48,6	9 26 25,6	9 21 36,6	4 55	7 5
225	13	Ven.	0 4 38,6	9 30 12,2	9 25 33,2	4 56	7 4
226	14	Sab.	0 4 28,2	9 33 58,0	9 29 29,7	4 58	7 2
227	15	Dom.	0 4 17,0	9 37 43,6	9 33 26,3	4 59	7 1
228	16	Lun.	0 4 5,6	9 41 28,7	9 37 22,8	5 0	7 0
229	17	Mart.	0 3 53,5	9 45 13,2	9 41 19,4	5 1	6 59
230	18	Merc.	0 3 40,9	9 48 57,2	9 45 16,0	5 3	6 57
231	19	Giov.	0 3 27,8	9 52 40,5	9 49 12,5	5 4	6 56
232	20	Ven.	0 3 14,2	9 56 23,5	9 53 9,1	5 5	6 55
233	21	Sab.	0 3 0,3	10 0 6,1	9 57 5,6	5 7	6 53
234	22	Dom.	0 2 45,7	10 3 48,1	10 1 2,2	5 8	6 52
235	23	Lun.	0 2 30,8	10 7 29,7	10 4 58,7	5 10	6 50
236	24	Mart.	0 2 15,3	10 11 10,8	10 8 55,3	5 11	6 49
237	25	Merc.	0 1 59,5	10 14 51,5	10 12 51,8	5 13	6 47
238	26	Giov.	0 1 53,1	10 18 31,7	10 16 48,4	5 14	6 46
239	27	Ven.	0 1 26,4	10 22 11,7	10 20 45,0	5 16	6 44
240	28	Sab.	0 1 9,3	10 25 50,8	10 24 41,5	5 17	6 43
241	29	Dom.	0 0 51,8	10 29 29,9	10 28 38,1	5 19	6 41
242	30	Lun.	0 0 33,9	10 33 8,5	10 32 34,6	5 21	6 39
243	31	Mart.	0 0 15,7	10 36 46,9	10 36 31,2	5 22	6 38

Giorni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole boreale.	LOGARITMO della distanza della Terra, dal Sole.
1	4 8° 38' "	131° 3' 52"	18° 1' 46"	0,0063098
2	4 9 35 26,4	132 2 6	17 52 36	0,0062485
3	4 10 32 52,5	133 0 11	17 37 8	0,0062360
4	4 11 30 19,6	133 58 6	17 21 23	0,0061223
5	4 12 27 47,7	134 55 53	17 5 21	0,0060575
6	4 13 25 16,9	135 53 31	16 49 2	0,0059914
7	4 14 22 47,4	136 51 0	16 32 28	0,0059242
8	4 15 20 19,2	137 48 20	16 15 36	0,0058557
9	4 16 17 52,3	138 45 32	15 58 30	0,0057859
10	4 17 15 26,9	139 42 36	15 41 7	0,0057148
11	4 18 13 2,9	140 39 31	15 23 30	0,0056421
12	4 19 10 40,4	141 36 18	15 5 38	0,0055678
13	4 20 8 19,4	142 32 57	14 47 31	0,0054917
14	4 21 6 0,0	143 29 28	14 29 9	0,0054138
15	4 22 3 42,1	144 25 50	14 10 34	0,0053341
16	4 23 1 25,7	145 22 6	13 51 45	0,0052522
17	4 23 59 10,8	146 18 13	13 32 43	0,0051683
18	4 24 56 57,4	147 14 13	13 13 28	0,0050833
19	4 25 54 45,3	148 10 5	12 54 0	0,0049943
20	4 26 52 34,7	149 5 50	12 34 20	0,0049042
21	4 27 50 25,5	150 1 28	12 14 28	0,0048120
22	4 28 48 17,5	150 56 59	11 54 25	0,0047179
23	4 29 46 10,8	151 52 22	11 34 10	0,0046221
24	5 0 44 5,4	152 47 39	11 13 44	0,0045246
25	5 1 42 1,2	153 42 49	10 53 8	0,0044555
26	5 2 39 58,3	154 37 53	10 32 21	0,0043248
27	5 3 37 56,7	155 32 51	10 11 24	0,0042228
28	5 4 35 56,4	156 27 42	9 50 18	0,0041197
29	5 5 33 57,4	157 22 28	9 29 2	0,0040157
30	5 6 31 59,9	158 17 8	9 7 37	0,0039107
31	5 7 30 3,8	159 11 43	8 46 4	0,0038050

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della Luna pel meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1 Dom.	9 0 40 52	9 0 40 52	9 0 40 52	4 53 24B	4 39 34B	9 45
2 Lun.	9 13 40 35	9 20 17 46	9 20 17 46	4 21 55	4 0 33	10 38
3 Mart.	9 26 59 43	10 3 46 16	3 35 37	3 7 22	11 32	
4 Mere.	10 10 37 8	10 17 31 58	2 36 6	2 2 12	12 26	
5 Giov.	10 24 30 22	11 1 31 52	1 26 10	0 48 31	13 20	
6 Ven.	11 8 35 59	11 15 42 12	0 9 53	0 29 9A	14 13	
7 Sab.	11 22 50 0	11 29 58 55	1 7 53A	1 45 40	15 5	
8 Dom.	0 7 8 30	0 14 18 16	2 21 52	2 55 51	15 58	
9 Lun.	0 21 27 51	0 28 36 53	3 27 5	3 55 2	16 51	
10 Mart.	1 5 45 2	1 12 52 0	4 19 16	4 39 26	17 44	
11 Merc.	1 19 57 29	1 27 1 14	4 55 15	5 6 31	18 39	
12 Giov.	2 4 5 2	2 11 2 38	5 13 9	5 15 5	19 34	
13 Ven.	2 17 59 49	2 24 54 24	5 12 23	5 5 9	20 30	
14 Sab.	3 1 46 8	3 8 34 54	4 53 35	4 37 56	21 26	
15 Dom.	3 15 20 30	3 22 2 48	4 18 32	3 55 42	22 20	
16 Lun.	3 28 41 37	4 5 16 51	3 29 51	3 1 25	23 11	
17 Mart.	4 11 48 25	4 18 16 17	2 30 51	1 58 35	* *	
18 Merc.	4 24 40 23	5 1 0 46	1 25 7	0 50 53	0 1	
19 Giov.	5 7 47 30	5 13 30 43	0 16 21	0 18 5B	0 48	
20 Ven.	5 19 40 55	5 25 47 18	0 52 1	1 25 4	1 33	
21 Sab.	6 1 51 12	6 7 52 34	1 56 54	2 27 13	2 17	
22 Dom.	6 13 51 47	6 19 49 17	2 55 44	3 22 12	3 0	
23 Lun.	6 25 45 31	7 1 40 57	3 46 24	4 8 6	3 43	
24 Mart.	7 7 36 8	7 13 31 36	4 27 9	4 43 22	4 26	
25 Merc.	7 19 27 55	7 25 25 41	4 56 35	5 6 40	5 10	
26 Giov.	8 1 25 26	8 7 27 47	5 13 28	5 16 53	5 56	
27 Ven.	8 13 33 18	8 19 42 31	5 16 46	5 13 3	6 44	
28 Sab.	8 25 55 58	9 2 14 5	5 5 38	4 54 28	7 34	
29 Dom.	9 8 37 20	9 15 6 2	4 39 31	4 20 49	8 25	
30 Lun.	9 21 40 27	9 28 20 47	3 58 25	3 33 28	9 18	
31 Mart.	10 5 7 4	10 11 59 14	3 3 11	2 30 49	10 12	

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna			DIAMETRO orizzontale della Luna			Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.		
			a			a						
			mezzo di medio.	mezza notte media.	mezzo di medio.	mezzo di medio.	mezza notte media.	mezzo di medio.				
1	18 25'	18° 38A	56' 11"	56' 32"	30' 40"	30' 52"	5' 0"	5' 0"	S	1 40' M		
2	19 22	18 1	56 53	57 15	31 3	31 15	5 51	5 51		2 32		
3	20 20	16 20	57 35	57 56	31 26	31 36	6 38	6 38		3 29		
4	21 18	13 36	58 14	58 32	31 47	31 57	7 18	7 18		4 32		
5	22 16	9 58	58 47	59 0	32 5	32 12	7 58	7 58		5 40		
6	23 13	5 41	59 11	59 20	32 18	32 23	8 31	8 31		6 50		
7	0 10	1 2	59 26	59 31	32 26	32 29	9 3	9 3		8 5		
8	1 6	3 41B	59 33	59 33	32 30	32 30	9 39	9 39		9 15		
9	2 3	8 10	59 31	59 27	32 29	32 27	10 13	10 13		10 27		
10	3 1	12 7	59 22	59 15	32 24	32 20	10 49	10 49		11 39		
11	4 0	15 17	59 7	58 59	32 16	32 11	11 25	11 25		0 49 S		
12	4 59	17 28	58 49	58 38	32 6	32 0	*	*		1 57		
13	5 59	18 30	58 26	58 14	31 54	31 47	0 8 M	0 8 M		3 2		
14	6 59	18 24	58 1	57 48	31 40	31 33	0 58	0 58		4 2		
15	7 57	17 11	57 34	57 20	31 25	31 18	1 54	1 54		4 56		
16	8 52	15 0	57 5	56 50	31 9	31 1	2 52	2 52		5 44		
17	*	*	56 34	56 18	30 55	30 44	3 53	3 53		6 23		
18	9 46	12 3	56 3	55 47	30 56	30 28	4 57	4 57		6 57		
19	10 37	8 33	55 52	55 17	30 19	30 11	5 58	5 58		7 28		
20	11 27	4 44	55 3	54 50	30 3	29 56	7 0	7 0		7 56		
21	12 14	0 47	54 39	54 29	29 50	29 44	8 3	8 3		8 25		
22	13 1	3 9	54 20	54 14	29 40	29 36	9 0	9 0		8 54		
23	13 48	6 55	54 10	54 7	29 34	29 33	9 59	9 59		9 21		
24	14 35	10 21	54 8	54 10	29 33	29 34	10 59	10 59		9 49		
25	15 24	13 22	54 15	54 23	29 37	29 41	11 56	11 56		10 20		
26	16 14	15 49	54 33	54 46	29 47	29 56	0 54 S	0 54 S		10 54		
27	17 6	17 34	55 1	55 18	30 1	30 11	1 52	1 52		11 34		
28	18 0	18 28	55 58	56 0	30 22	30 34	2 47	2 47		*		
29	18 55	18 23	56 23	56 47	30 47	31 0	3 39	3 39		0 21 M		
30	19 52	17 14	57 12	57 38	31 14	31 28	4 27	4 27		1 13		
31	20 51	15 0	58 4	58 29	31 42	31 55	5 11	5 11		2 13		

AGOSTO 1830.

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

Oriente

10^h. 30'

Occidente

1	03	2. ○ .1	.4
2	3. .2 1.	○	.4.
3	3.	○ .2.1	.4.
4	.3 .1	○ 2.	.4.
5	2.	○ 1.3 4.	
6	04	1.○2 ○	.3
7	4.	○1. .2 3.	
8	02 4.	○3.○1	
9	4.	3.○2 1. ○	
10	.4 3.	○ .2.1	
11	.4 .3 1.	○ 2.	
12	.4 2.	○ .3 .1	
13	.4 1.○2 ○		.3
14		.4 ○ 1. .2 3.	
15	01	○ 2. 3..4	
16	2. 3.	1.○	.4
17	3.	○.2 .1	.4
18	.3 1.	○ 2.	.4
19	03	2. ○ .1	.4.
20		○ 1.. .2 4.○3	.4.
21		○ 1.. .2 4.○3	
22		.1○ 2. 4.○3	
23		.2 3. 4. ○	10
24		.3. 4. ○ .1	20
25	4. 3	1. ○ 2.	
26	4.	2. .3 ○ .1	
27	.4 .2 .1	○ .3	
28	.4	○ 1.. 2 .3	
29	.4 .1	○ 2. 3.	
30		.4.○2 3. ○1.	
31		.2○.1	40

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSE DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
2	Plenilunio 11 ^h 15'	*	I. SATELLITE.
9	Ultimo quarto 2 35	1	9 7 41 em.
16	Novilunio. 15 5	3	3 36 31
24	Primo quarto 19 29	4	22 5 25
CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE.			
2	$\lambda \approx 4^{\circ}$ 10 4	6	16 34 16
2	$\phi \approx 5^{\circ}$ 19 17	8	11 3 10
6	μ Balena 4 [°] 12 45	10	5 32 1
8	γ ζ 3. 4 [°] 4 33	12	0 0 55
8	δ ζ 5. 8 11	13	18 29 45
8	α ζ 1. 11 17	15	12 58 40
11	λ \square 4. 5 [°] 7 57	17	7 27 30
13	ξ Ω 5 [°] 20 25	19	1 56 24
14	α Ω 5 [°] 13 7	20	20 25 15
16	τ Ω 4 [°] 6 5	22	14 54 10
16	β III 3. 4 [°] 17 11	24	9 23 0
17	η II 3. 4 [°] 8 26	26	3 51 55
18	θ II 4. 5 [°] 11 25	27	22 20 45
21	γ \wedge 4. 5 [°] 13 55	29	16 49 39
21	π \wedge 4. 5 [°] 18 24		II. SATELLITE.
21	θ \wedge 4. 5 [°] 23 29	2	11 52 34
22	ϕ Ofiuco 4. 5 [°] 17 13	6	1 10 31
23	m III 5 [°] 22 31	9	14 28 50
29	$\lambda \approx 4^{\circ}$ 20 39	13	3 46 34
		16	17 4 37
		20	6 22 48
		23	19 40 54
2	Eclisse di \odot visibile.	*	8 59 13
4	\odot perigea.	27	22 17 23
4	γ stazionario.	30	
7	ζ nell' afelio.		III. SATELLITE.
12	ϕ δ b.	*	6 10 11 37 imm.
14	ζ α Ω .	6	13 30 49 em.
16	Eclisse di Sole invisibile.	13	14 12 10 imm.
17	ζ in massima elongazione orientale.	15	17 31 59 em.
18	ζ i II I .	20	18 13 16 imm.
19	ζ δ \odot .	20	21 33 42 em.
20	\odot apogea.	27	22 13 48 imm.
23	\odot in \wedge a 2 ^h 13'.	28	1 34 47 em.
24	ζ nel perielio.		IV. SATELLITE.
28	ζ in massima latit. eliocentrica A.	9	6 27 39
29	ϕ δ α Ω .	*	10 46 11
30	ζ stazionario.	26	0 31 13
		26	3 57 39

Giorni d'ell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	TEMPO medio a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì medio.	Nascer del Sole.	Tramontare del Sole.
244	1	Merc.	23 59 57,2	10 40 24,9	10 40 27,7	5 23	6 37
245	2	Giov.	23 59 38,3	10 44 2,6	10 44 24,3	5 25	6 35
246	3	Ven.	23 59 19,2	10 47 40,0	10 48 20,8	5 27	6 33
247	4	Sab.	23 58 59,2	10 51 17,2	10 52 17,4	5 29	6 31
248	5	Dom.	23 58 40,2	10 54 54,1	10 56 13,9	5 30	6 30
249	6	Lun.	23 58 20,4	10 58 30,7	11 0 10,4	5 31	6 29
250	7	Mart.	23 58 0,3	11 2 7,2	11 4 7,0	5 33	6 27
251	8	Merc.	23 57 40,1	11 5 43,5	11 8 3,5	5 35	6 25
252	9	Giov.	23 57 1,6	11 9 19,5	11 12 0,1	5 36	6 24
253	10	Ven.	23 56 59,2	11 12 55,6	11 15 56,6	5 38	6 22
254	11	Sab.	23 56 38,5	11 16 31,5	11 19 53,2	5 40	6 20
255	12	Dom.	23 56 17,8	11 20 7,2	11 23 49,7	5 42	6 18
256	13	Lun.	23 55 56,9	11 23 42,9	11 27 46,3	5 44	6 16
257	14	Mart.	23 55 36,0	11 27 18,5	11 31 42,8	5 45	6 15
258	15	Merc.	23 55 14,9	11 30 54,1	11 35 39,4	5 47	6 13
259	16	Giov.	23 54 53,8	11 34 29,5	11 39 36,0	5 48	6 12
260	17	Ven.	23 54 32,8	11 38 5,1	11 45 32,6	5 50	6 10
261	18	Sab.	23 54 11,8	11 41 40,6	11 47 29,1	5 51	6 9
262	19	Dom.	23 53 50,7	11 45 16,0	11 51 25,7	5 53	6 7
263	20	Lun.	23 53 29,8	11 48 51,6	11 55 22,2	5 55	6 5
264	21	Mart.	23 53 8,9	11 52 27,3	11 59 18,8	5 57	6 3
265	22	Merc.	23 52 48,1	11 56 3,0	12 3 15,3	5 58	6 2
266	23	Giov.	23 52 27,3	11 59 38,8	12 7 11,9	5 59	6 1
267	24	Ven.	23 52 6,6	12 3 14,6	12 11 8,4	6 1	5 59
268	25	Sab.	23 51 46,1	12 6 50,6	12 15 5,0	6 2	5 58
269	26	Dom.	23 51 25,7	12 10 26,6	12 19 1,5	6 3	5 57
270	27	Lun.	23 51 5,4	12 14 3,0	12 22 58,1	6 5	5 55
271	28	Mart.	23 50 45,4	12 17 3,3	12 26 54,6	6 6	5 54
272	29	Merc.	23 50 25,5	12 21 16,0	12 30 51,2	6 8	5 52
273	30	Giov.	23 50 5,9	12 24 52,9	12 34 47,7	6 9	5 51

Gior ni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole boreale.	LOGARITMO della distanza dalla Terra dal Sole.
1	5° 8' 28" 9,3	160° 6' 14"	8° 24' 22"	0,0036988
2	5 9 26 16,3	161 0 39	8 2 32	0,0035921
3	5 10 24 25,1	161 55 0	7 40 35	0,0034850
4	5 11 22 35,7	162 49 18	7 18 30	0,0033774
5	5 12 20 48,1	163 43 32	6 56 17	0,0032693
6	5 13 19 2,5	164 37 42	6 33 58	0,0031605
7	5 14 17 18,8	165 31 49	6 11 32	0,0030511
8	5 15 15 37,2	166 25 54	5 49 0	0,0029412
9	5 16 13 57,7	167 19 56	5 26 22	0,0028307
10	5 17 12 20,3	168 13 57	5 3 39	0,0027194
11	5 18 10 45,0	169 7 55	4 40 50	0,0026071
12	5 19 9 12,0	170 1 52	4 17 56	0,0024939
13	5 20 7 41,1	170 55 48	3 54 58	0,0023797
14	5 21 6 12,2	171 49 42	3 31 55	0,0022643
15	5 22 4 45,3	172 43 36	3 8 48	0,0021477
16	5 23 3 20,6	173 37 29	2 45 38	0,0020298
17	5 24 1 57,9	174 31 22	2 22 24	0,0019107
18	5 25 0 37,2	175 25 15	1 59 8	0,0017902
19	5 25 59 18,3	176 19 8	1 35 49	0,0016686
20	5 26 58 1,3	177 13 2	1 12 29	0,0015459
21	5 27 56 46,0	178 6 57	0 49 6	0,0014222
22	5 28 55 32,5	179 0 52	0 25 43	0,0012976
23	5 29 54 20,8	179 54 49	0 2 17	0,0011743
24	6 0 53 10,8	180 48 47	0 21 0	0,0010462
25	6 1 52 2,5	181 42 48	0 44 35	0,0009198
			Allarme	
26	6 2 50 55,9	182 36 50	1 8 1	0,0007932
27	6 3 49 51,0	183 30 54	1 31 27	0,0006664
28	6 4 48 47,9	184 25 2	1 54 51	0,0005306
29	6 5 47 46,7	185 19 12	2 18 15	0,0004129
30	6 6 46 47,3	186 13 26	2 41 37	0,0002866

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della Luna per meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1 Merc.	10 18° 57' 7"	10 26° 0 24'	10 55 47	1 19 51B	11 7	
2 Giov.	11 3 8 38	11 10 21 14	0 39 36	0 0 21A	12 1	
3 Ven.	11 17 37 33	11 24 56 47	0 40 38A	1 20 31	12 55	
4 Sab.	0 2 18 6	0 9 40 39	1 59 15	2 36 5	13 49	
5 Dom.	0 17 3 34	0 24 25 58	3 10 20	3 41 22	14 44	
6 Lun.	1 1 47 3	1 9 6 5	4 8 39	4 31 43	15 39	
7 Mart.	1 16 22 26	1 23 35 32	4 50 16	5 4 4	16 34	
8 Merc.	2 0 44 58	2 7 50 21	5 13 0	5 17 4	17 30	
9 Giov.	2 14 51 30	2 21 48 14	5 16 21	5 11 0	18 26	
10 Vcn.	2 28 40 32	3 5 28 24	5 1 13	4 47 18	19 21	
11 Sab.	3 12 11 55	3 18 51 13	4 29 34	4 8 23	20 15	
12 Dom.	3 25 26 26	4 1 57 43	3 44 5	3 17 7	21 7	
13 Lun.	4 8 25 17	4 14 49 17	2 47 53	2 16 47	21 56	
14 Mart.	4 21 9 57	4 27 27 24	1 44 17	1 10 46	22 44	
15 Merc.	5 3 41 52	5 9 55 30	0 36 41	0 2 26	23 29	
16 Giov.	5 16 2 28	5 22 8 58	6 31 36B	1 5 1B	* *	
17 Ven.	5 28 13 12	6 4 15 22	1 37 27	2 8 37	0 13	
18 Sab.	6 10 15 40	6 16 14 22	2 38 8	3 5 47	0 56	
19 Dom.	6 22 11 41	6 28 7 56	3 31 17	3 54 24	1 39	
20 Lun.	7 4 3 23	7 9 58 24	4 14 56	4 32 42	2 22	
21 Mart.	7 15 53 20	7 21 48 35	4 47 52	4 59 19	3 6	
22 Merc.	7 27 44 36	8 3 41 52	5 7 55	5 13 14	3 51	
23 Giov.	8 9 40 52	8 15 42 8	5 15 11	5 13 41	4 37	
24 Ven.	8 21 46 12	8 27 53 39	5 8 42	5 0 9	5 25	
25 Sab.	9 4 5 1	9 10 20 52	4 48 3	4 32 23	6 15	
26 Dom.	9 16 41 43	9 23 8 4	4 13 13	3 50 35	7 6	
27 Lun.	9 29 40 21	10 6 18 56	3 24 37	2 55 31	7 58	
28 Mart.	10 13 4 8	10 19 56 5	2 23 30	1 48 55	8 51	
29 Merc.	10 26 54 52	11 4 0 22	1 12 9	0 33 43	9 45	
30 Giov.	11 11 12 15	11 18 30 6	0 5 49A	0 45 45A	10 39	

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna			DIAMETRO orizzontale della Luna			Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte media.		a mezzo di medio.	a mezza notte media.			
1	21 49	11 0 46A	58' 52"	59' 14"		32' 8"	32' 20"		5 51' S	3 19' M
2	22 48	7 42	59 34	59 50		32 31	32 40		6 28	4 29
3	23 46	3 4	60 4	60 13		32 47	32 52		7 1	5 42
4	0 44	1 48B	60 20	60 22		32 56	32 58		7 38	6 57
5	1 42	6 33	60 22	60 18		32 57	32 55		8 13	8 10
6	2 41	10 50	60 11	60 1		32 51	32 45		8 40	9 25
7	3 41	14 21	59 48	59 34		32 39	32 31		9 25	10 39
8	4 41	16 53	59 18	59 1		32 22	32 13		10 7	11 47
9	5 41	18 17	58 43	58 25		32 3	31 53		10 55	0 55 S
10	6 40	18 31	58 6	57 48		31 43	31 33		11 48	1 57
11	7 38	17 39	57 29	57 12		31 24	31 13		*	2 52
12	8 34	15 48	56 55	56 37		31 4	30 55		0 45 M	3 41
13	9 28	13 8	55 22	56 6		30 46	30 38		1 46	4 22
14	10 19	9 51	55 51	55 37		30 30	30 22		2 48	4 58
15	11 8	6 10	55 24	55 11		30 14	30 7		3 49	5 31
16	* *	* *	54 59	54 47		30 1	29 54		4 51	5 59
17	11 57	2 15	54 37	54 27		29 49	29 43		5 52	6 28
18	13 44	1 42A	54 19	54 11		29 39	29 35		6 49	6 55
19	13 31	5 33	54 6	54 2		29 32	29 29		7 48	7 24
20	14 18	9 8	53 59	53 58		29 28	29 28		8 48	7 50
21	15 5	12 19	54 0	54 3		29 28	29 30		9 47	8 21
22	15 54	14 59	54 9	54 17		29 33	29 38		10 45	8 53
23	16 45	17 0	54 27	54 40		29 43	29 50		11 42	9 30
24	17 37	18 15	54 55	55 12		29 59	30 9		0 37 S	10 13
25	18 31	18 35	55 32	55 55		30 19	30 31		1 30	11 2
26	19 26	17 56	56 18	56 44		30 44	30 58		2 10	11 57
27	20 23	16 15	57 11	57 40		31 13	31 29		3 5	*
28	21 20	13 32	58 8	58 37		31 44	32 0		3 43	0 59 M
29	22 18	9 54	59 5	59 31		32 15	32 30		4 24	3 5
30	23 16	5 31	59 54	60 17		32 43	32 55		4 57	3 16

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

	Oriente	9 ^h 0'	Occidente
1	.5	1. ○	.4 .2
2		.3 2. ○	.1 .4
3	.2 1.	○	.3 .4
4		○	.2 .1 .3 .4
5	.1	○	2. 3. 4.
6	.2	3. ○ 1.	4.
7	3.	.2 .1 ○	4.
8	.3	1. ○	4. .2
9	.2	.3 4. ○ .1	
10	4. .2 1.	○	.3
11	4.	○ .2 .1	.3
12	4.	1. ○	2. 3.
13	.4	.2. ○ 1.	3.
14	.4	3. .2 .1 ○	
15	.4 .3	○ 1.	.2
16		3 3 4. ○ 2 3 1	
17		2. 1. ○	.3 40.
18		○ .1	.4 .3 20.
19		1. ○	2. 3. .4
20		2. ○ 3. .1	.4
21		3. .2 .1 ○	.4
22	.5	○ 1. .2	4.
23	01	.3 ○ 2.	.4
24		2. 1. ○ .3	.4
25		.2 ○ 4.1	.3
26		4.1. ○	2. 3.
27	4.	.2. ○	.3 .1
28	4.	3 3 4.1 ○	
29	4.	3. ○ 1. .2	
30	.4	.3 ○ .1	2.

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna				DIAMETRO orizzontale della Luna				Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte	a mezzo di medio.	a mezza notte media.	a mezzo di medio.	a mezza notte	a mezzo di medio.	a mezza notte		
1	21 49 ^h	11 ° 46A	58' 52'	59' 14"	32' 8"	32' 20"	5 51'	S	3 19	M		
2	22 48	7 42	59 34	59 50	32 31	32 40	6 28		4 29			
3	23 46	3 4.	60 4	60 13	32 47	32 52	7 1		5 42			
4	o 44	1 48B	60 20	60 22	32 56	32 58	7 38		6 57			
5	1 42	6 33	60 22	60 18	32 57	32 55	8 13		8 10			
6	2 41	10 50	60 11	60 1	32 51	32 45	8 49		9 25			
7	3 41	14 21	59 48	59 34	32 39	32 31	9 25		10 39			
8	4 41	16 53	59 18	59 1	32 22	32 13	10 7		11 47			
9	5 41	18 17	58 43	58 25	32 3	31 53	10 55		o 55 S			
10	6 40	18 31	58 6	57 48	31 43	31 53	11 48		1 57			
11	7 38	12 59	57 29	57 12	31 24	31 15	*	*	2 52			
12	8 34	15 48	56 55	56 37	31 4	30 55	o 45	M	3 41			
13	9 28	13 8	55 22	56 6	30 46	30 38	1 46		4 22			
14	10 19	9 51	55 51	55 37	30 30	30 22	2 48		4 58			
15	11 8	6 10	55 24	55 11	30 14	30 7	3 49		5 31			
16	* *	* *	54 59	54 47	30 1	29 54	4 51		5 59			
17	11 57	2 15	54 37	54 27	29 49	29 43	5 52		6 28			
18	12 44	1 42A	54 19	54 11	29 39	29 35	6 49		6 55			
19	13 31	5 33	54 6	54 2	29 32	29 29	7 48		7 24			
20	14 18	9 8	53 59	53 58	29 28	29 28	8 48		7 50			
21	15 5	12 19	54 0	54 3	29 28	29 30	9 47		8 21			
22	15 54	14 59	54 9	54 17	29 33	29 38	10 45		8 53			
23	16 45	17 0	54 27	54 40	29 43	29 50	11 42		9 30			
24	17 37	18 15	54 55	55 12	29 59	30 9	o 37	S	10 13			
25	18 31	18 35	55 32	55 55	30 19	30 31	1 30		11 2			
26	19 26	17 56	56 18	56 44	30 44	30 58	2 19		11 57			
27	20 23	16 15	57 11	57 40	31 13	31 29	3 3		*	*		
28	21 20	13 32	58 8	58 37	31 44	32 0	3 43		o 59 M			
29	22 18	9 54	59 5	59 31	32 15	32 30	4 24		2 5			
30	23 16	5 31	59 54	60 17	32 43	32 55	4 57		3 16			

		Giorni dell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	Tempo medio a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì vero.	Tempo sidereo a mezzodì medio.	Nascere del Sole.	Tramontare del Sole.
274	1	Ven.	23 49 46,5	12 28 30,0	12 38 44,3	6 11	5 49		
275	2	Sab.	23 49 27,6	12 32 7,6	12 42 40,8	6 13	5 47		
276	3	Dom.	23 49 8,7	12 35 45,2	12 46 57,4	6 15	5 45		
277	4	Lun.	23 48 50,3	12 39 23,3	12 50 33,9	6 16	5 44		
278	5	Mart.	23 48 32,2	12 43 1,8	12 54 30,5	6 17	5 43		
279	6	Merc.	23 48 14,6	12 46 40,6	12 58 27,0	6 18	5 42		
280	7	Giov.	23 47 57,2	12 50 19,8	13 2 23,6	6 20	5 40		
281	8	Ven.	23 47 40,4	12 53 59,5	13 6 20,1	6 21	5 39		
282	9	Sab.	23 47 23,9	12 57 39,5	13 10 16,7	6 23	5 37		
283	10	Dom.	23 47 7,9	13 1 20,1	13 14 13,3	6 24	5 36		
284	11	Lun.	23 46 52,4	13 5 1,1	13 18 9,8	6 25	5 34		
285	12	Mart.	23 46 37,4	13 8 42,7	13 22 6,4	6 27	5 33		
286	13	Merc.	23 46 22,9	13 12 24,7	13 26 2,9	6 28	5 32		
287	14	Giov.	23 46 8,9	13 16 7,2	13 29 59,5	6 30	5 30		
288	15	Ven.	23 45 55,6	13 19 50,4	13 33 56,0	6 31	5 29		
289	16	Sab.	23 45 42,8	13 23 34,1	13 37 52,6	6 33	5 27		
290	17	Dom.	23 45 30,5	13 26 18,4	13 41 49,1	6 35	5 25		
291	18	Lun.	23 45 18,7	13 31 3,1	13 45 45,7	6 37	5 23		
292	19	Mart.	23 45 7,6	13 34 48,6	13 49 42,3	6 38	5 22		
293	20	Merc.	23 44 57,2	13 38 35,7	13 53 38,8	6 40	5 20		
294	21	Giov.	23 44 47,4	13 42 21,4	13 57 35,4	6 42	5 18		
295	22	Ven.	23 44 38,3	13 46 8,8	14 1 31,9	6 43	5 17		
296	23	Sab.	23 44 29,7	13 49 56,7	14 5 28,5	6 45	5 15		
297	24	Dom.	23 44 21,9	13 53 45,4	14 9 25,0	6 47	5 13		
298	25	Lun.	23 44 14,7	13 57 34,7	14 13 21,6	6 48	5 12		
299	26	Mart.	23 44 8,3	14 1 24,9	14 17 18,1	6 49	5 11		
300	27	Merc.	23 44 2,5	14 5 15,5	14 21 14,6	6 51	5 9		
301	28	Giov.	23 43 57,5	14 9 7,2	14 25 11,2	6 52	5 8		
302	29	Ven.	23 43 53,2	14 12 59,4	14 29 7,7	6 54	5 6		
303	30	Sab.	23 43 49,6	14 16 52,3	14 33 4,3	6 56	5 4		
304	31	Dom.	23 43 46,9	14 20 46,1	14 37 0,8	6 57	5 3		

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSE DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
2	Plenilunio 20 ^h 33'	1	I. SATELLITE.
8	Ultimo quarto 11 10	1	11 18 19 em.
16	Novilunio 8 9	3	5 47 24
24	Primo quarto 10 57	5	0 16 14
31	Plenilunio 5 55	6	18 45 7
	CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE	8	13 13 57
1	29 χ 5. ^a 1 32	* 10	7 43 50
3	μ Balena 4. ^a 21 29	12	2 11 40
5	γ ζ 3. 4 ^a 11 56	13	20 40 43
5	θ^1 ζ 5. ^a 15 27	15	15 9 22
5	α ζ 1. ^a 18 29	17	9 58 15
8	λ \square 4. 5. ^a 13 6	19	4 7 3
11	ξ ζ 5. ^a 2 1	20	22 35 56
11	a ζ 5. ^a 18 52	22	17 4 44
13	τ ζ 4. ^a 12 10	24	11 33 36
13	β Π 3. 4 ^a 23 22	26	6 2 24
14	η Π 3. 4 ^a 2 43	28	0 31 16
14	φ 17 33	29	19 0 4
15	θ Π 4. 5. ^a 17 38	31	15 28 55
18	γ Δ 4. 5. ^a 20 17		II. SATELLITE.
19	η Δ 4. 5. ^a 0 49	4	11 35 47
19	θ Δ 4. 5. ^a 5 55	8	0 54 4
19	ϕ Ofiuco 4. 5. ^a 23 39	11	14 12 30
20	m Π 5. ^a 4 58	15	3 30 49
27	λ \approx 4. ^a 6 58	18	16 49 25
28	29 χ 5. ^a 12 29	22	6 7 44
	FENOMENI ED OSSERVAZIONI.	25	19 26 28
2	\oplus perigea.	29	8 44 47
8	\oplus \odot \odot .		III. SATELLITE.
10	\odot α Π .	5	2 14 12 imm.
10	\odot β γ \gg .	5	5 55 49 em.
12	\odot inf. \odot .	12	6 14 24 imm.
12	\odot nella mass. latit. elioc. B.	12	9 36 34 em.
16	\oplus stazionario.	19	10 14 40 imm.
16	\oplus apogea.	19	13 37 23 em.
17	\oplus stazionario.	26	14 15 26 imm.
19	\odot \oplus .	26	17 58 42 em.
20	\odot nel perielio.		IV. SATELLITE.
21	\odot stazionario.	12	18 35 54 imm.
23	\odot in Π , a 10 ^h 15'.	12	22 9 47 em.
28	\odot in massima elongazione occiden.	29	12 40 20 imm.
		29	16 21 21 em.

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA.		LATITUDINE DELLA LUNA.		Passaggio della Luna per meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1 Ven.	11 25° 55' 15"	0° 3° 26' 53"	1 25 29A	2° 3' 54A	11 34'	
2 Sab.	0 10 51 59	0 18 35 28	2 40 38	3 14 32	12 26	
3 Dom.	0 26 6 7	1 3 34 42	3 45 18	4 11 48	13 26	
4 Lun.	1 11 2 58	1 18 38 45	4 33 58	4 51 13	14 23	
5 Mart.	1 26 3 59	2 3 38 45	5 3 24	5 10 24	15 21	
6 Merc.	2 10 46 19	2 17 58 7	5 14 18	5 9 13	16 19	
7 Giov.	2 25 5 43	3 2 3 5	5 1 24	4 49 12	17 10	
8 Ven.	3 8 56 6	3 15 42 42	4 33 0	4 13 11	18 11	
9 Sab.	3 22 23 24	3 28 58 25	3 50 11	3 24 27	19 4	
10 Dom.	4 5 28 7	4 11 51 57	3 58 24	2 26 29	19 54	
11 Lun.	4 18 13 21	4 24 29 44	1 55 5	1 22 59	20 42	
12 Mart.	5 0 42 33	5 6 52 13	0 49 38	0 16 10	21 27	
13 Merc.	5 12 59 7	5 19 3 35	0 17 7B	0 49 56B	22 11	
14 Giov.	5 25 6 1	6 1 6 41	1 21 59	1 52 55	22 54	
15 Ven.	6 7 5 33	6 13 3 54	2 22 25	2 50 13	23 37	
16 Sab.	6 19 0 56	6 24 57 14	3 16 3	3 39 39	* *	
17 Dom.	7 0 53 0	7 0 48 25	4 0 48	4 19 19	0 10	
18 Lun.	7 12 43 43	7 18 39 4	4 35 0	4 47 42	1 3	
19 Mart.	7 24 34 43	8 0 30 56	4 57 19	5 3 43	1 47	
20 Merc.	8 0 27 58	8 12 26 7	5 6 50	5 6 38	2 32	
21 Giov.	8 18 25 46	8 24 27 20	5 3 3	4 56 6	3 20	
22 Ven.	9 0 31 13	9 6 37 54	4 45 47	4 32 9	4 9	
23 Sab.	9 12 47 52	9 19 1 38	4 15 13	3 55 6	4 58	
24 Dom.	9 25 19 44	10 1 42 41	3 31 54	3 5 47	5 49	
25 Lun.	10 8 11 2	10 14 45 15	2 36 55	2 5 34	6 40	
26 Mart.	10 21 25 46	10 28 13 1	1 32 1	0 56 37	7 33	
27 Merc.	11 5 7 14	11 12 8 34	0 19 56	0 17 52A	8 24	
28 Giov.	11 19 17 1	11 26 32 23	0 55 53A	1 33 35	9 17	
29 Ven.	0 2 54 16	0 11 22 0	2 10 13	2 45 5	10 11	
30 Sab.	0 18 54 43	0 26 31 21	3 17 23	3 46 26	11 7	
31 Dom.	1 4 16 38	1 11 51 22	4 11 33	4 32 11	12 5	

Giorni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole australe.	LOGARITMO della distanza della Terra dal Sole.
1	6° 7' 45" 49,8	187° 7' 44"	3° 4' 58"	0,0001608
2	6 8 44 54,3	188 2 7	3 28 17	0,0000355
3	6 9 44 1,0	188 56 33	3 51 33	9,9999107
4	6 10 43 9,7	189 51 5	4 14 47	9,9997864
5	6 11 42 20,7	190 45 42	4 37 58	9,9996627
6	6 12 41 33,8	191 40 25	5 1 5	9,9995594
7	6 13 40 49,2	192 35 14	5 24 9	9,9994165
8	6 14 40 6,9	193 30 9	5 47 9	9,9992940
9	6 15 39 27,0	194 25 10	6 10 4	9,9991717
10	6 16 38 49,3	195 20 19	6 32 55	9,9990497
11	6 17 38 14,6	196 15 35	6 55 40	9,9989278
12	6 18 37 41,0	197 10 58	7 18 20	9,9988060
13	6 19 37 10,4	198 6 29	7 40 54	9,9986842
14	6 20 36 42,0	199 2 8	8 3 22	9,9985621
15	6 21 36 15,7	199 57 55	8 25 43	9,9984308
16	6 22 35 51,6	200 53 51	8 47 57	9,9983174
17	6 23 35 29,6	201 49 55	9 10 3	9,9981948
18	6 24 35 9,5	202 46 8	9 32 2	9,9980722
19	6 25 34 51,4	203 42 30	9 53 52	9,9979494
20	6 26 34 35,1	204 39 1	10 15 34	9,9978265
21	6 27 34 20,7	205 35 42	10 37 6	9,9977039
22	6 28 34 8,0	206 32 33	10 58 29	9,9975817
23	6 29 33 57,1	207 29 33	11 19 42	9,9974568
24	7 0 33 47,8	208 26 44	11 40 47	9,9973383
25	7 1 33 40,1	209 24 5	12 1 36	9,9972176
26	7 2 33 34,0	210 21 36	12 22 16	9,9970979
27	7 3 33 29,8	211 19 17	12 42 45	9,9969793
28	7 4 33 27,2	212 17 10	13 3 2	9,9968619
29	7 5 33 26,2	213 15 13	13 23 7	9,9967458
30	7 6 33 27,0	214 13 28	13 42 59	9,9966311
31	7 7 33 29,6	215 11 55	14 2 38	9,9965180

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA.		LATITUDINE DELLA LUNA.		Passaggio della Luna per meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1 Ven.	11 25° 53' 15"	0° 3° 26' 53"	1 25 22A	2° 3' 54A	11 34	
2 Sab.	0 10 51 59	0 18 25 28	2 49 36	3 14 32	12 26	
3 Dom.	0 26 6 7	1 3 34 42	3 45 16	4 11 48	13 26	
4 Lun.	1 11 7 58	1 18 38 45	4 33 56	4 51 13	14 23	
5 Mart.	1 26 5 59	2 3 28 45	5 3 24	5 10 24	15 21	
6 Merc.	2 10 46 16	2 17 38 7	5 12 18	5 9 13	16 19	
7 Giov.	2 25 3 48	3 2 3 3	5 1 24	4 49 12	17 16	
8 Ven.	3 8 56 9	3 15 42 42	4 33 0	4 13 11	18 11	
9 Sab.	3 22 23 24	3 28 58 25	3 50 18	3 24 27	19 4	
10 Dom.	4 5 28 7	4 11 51 57	2 58 24	2 26 29	19 54	
11 Lun.	4 18 13 21	4 24 29 44	1 55 5	1 22 39	20 42	
12 Mart.	5 0 42 33	5 6 52 13	0 49 36	0 16 10	21 27	
13 Merc.	5 12 59 7	5 19 3 35	0 17 7B	0 49 56B	22 11	
14 Giov.	5 25 6 1	6 1 6 41	1 21 59	1 52 55	22 54	
15 Ven.	6 7 5 33	6 13 3 54	2 22 25	2 50 13	23 37	
16 Sab.	6 19 0 56	6 24 57 14	3 16 3	3 39 39	* *	
17 Dom.	7 0 53 0	7 6 48 25	4 0 48	4 19 19	0 19	
18 Lun.	7 12 43 43	7 18 39 4	4 35 0	4 47 42	1 3	
19 Mart.	7 24 34 43	8 0 30 56	4 57 19	5 3 43	1 47	
20 Merc.	8 6 27 58	8 12 26 7	5 6 50	5 6 38	2 33	
21 Giov.	8 18 25 46	8 24 27 20	5 3 3	4 56 6	3 20	
22 Ven.	9 0 31 13	9 6 37 54	4 45 47	4 32 9	4 9	
23 Sab.	9 12 47 52	9 19 1 38	4 15 13	3 55 6	4 58	
24 Dom.	9 25 19 44	10 1 42 41	3 31 54	3 5 47	5 49	
25 Lun.	10 8 11 3	10 14 45 15	2 36 55	2 5 34	6 40	
26 Mart.	10 21 25 46	10 28 13 1	1 32 1	0 56 37	7 33	
27 Merc.	11 5 7 14	11 12 8 34	0 19 50	0 17 52A	8 24	
28 Giov.	11 19 17 1	11 26 32 23	0 55 53A	1 33 35	9 17	
29 Ven.	0 3 54 16	0 11 22 0	2 10 13	2 45 5	10 11	
30 Sab.	0 18 54 43	0 26 31 21	3 17 23	3 46 26	11 7	
31 Dom.	1 4 16 38	1 11 51 12	4 11 33	4 32 11	12 5	

OTTOBRE 1830.

59

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna		DIAMETRO orizzontale della Luna		Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte media.	a mezzo di medio.	a mezza notte media.		
1	0 15	0 39A	60° 36'	60° 50"	33° 5'	33° 12"	5 31 S	4 31 M
2	1 14	4 20B	61° 0'	61° 6'	33° 18'	33° 21'	6 8	5 45
3	2 15	9 2	61° 7'	61° 3'	33° 22'	33° 20'	6 44	7 0
4	3 16	13 4	60° 55'	60° 43'	33° 15'	33° 8'	7 21	8 18
5	4 18	16 8	60° 27'	60° 8'	33° 0'	32° 50'	8 3	9 31
6	5 20	18 1	59° 47'	59° 24'	32° 38'	32° 26'	8 51	10 43
7	6 21	18 39	58° 59'	58° 35'	32° 12'	31° 58'	9 42	11 49
8	7 21	18 8	58° 9'	57° 45'	31° 45'	31° 31'	10 40	0 48 S
9	8 17	16 32	57° 21'	56° 58'	31° 18'	31° 6'	11 39	1 38
10	9 12	14 6	56° 36'	56° 16'	30° 54'	30° 43'	* *	2 25
11	10 5	11 0	55° 56'	55° 59'	30° 32'	30° 23'	6 41 M	5 1
12	10 53	7 26	55° 23'	55° 8'	30° 14'	30° 6'	1 42	3 34
13	11 41	5 35	54° 55'	54° 43'	29° 59'	29° 53'	2 43	4 8
14	12 28	0 22A	54° 32'	54° 23'	29° 46'	29° 41'	3 45	4 31
15	13 14	4 17	54° 15'	54° 8'	29° 37'	29° 33'	4 43	4 59
16	* *	* *	54° 2'	53° 58'	29° 30'	29° 28'	5 42	5 26
17	14 1	7 59	53° 55'	53° 53'	29° 26'	29° 25'	6 41	5 51
18	14 49	11 22	53° 52'	53° 53'	29° 24'	29° 25'	7 39	6 21
19	15 37	14 15	53° 56'	54° 1'	29° 22'	29° 29'	8 38	6 52
20	16 27	16 31	54° 7'	54° 15'	29° 33'	29° 37'	9 34	7 28
21	17 19	18 3	54° 25'	54° 37'	29° 42'	29° 49'	10 30	8 8
22	18 11	18 44	54° 51'	55° 7'	29° 56'	30° 5'	11 23	8 55
23	19 5	18 29	55° 25'	55° 45'	30° 15'	30° 26'	0 12 S	9 46
24	19 59	17 14	56° 8'	56° 32'	30° 38'	30° 52'	0 58	10 44
25	20 55	15 3	56° 57'	57° 25'	31° 5'	31° 20'	1 39	11 47
26	21 58	11 53	57° 53'	58° 22'	31° 36'	31° 52'	2 19	* *
27	22 16	7 55	58° 51'	59° 20'	32° 8'	32° 23'	2 54	9 55 M
28	22 44	3 20	59° 47'	60° 12'	32° 38'	32° 52'	3 26	2 4
29	0 42	1 36B	60° 35'	60° 54'	33° 4'	33° 15'	4 6	3 18
30	1 42	6 33	61° 9'	61° 20'	33° 23'	33° 29'	4 36	4 52
31	2 44	11 6	61° 26'	61° 26'	33° 32'	33° 32'	5 13	5 48

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

	Oriente	8 ^h o ^d	Occidente
1	• 1 .4	2.	○ .5
2	• .4 .2	○ .1 .3	—
3	• .41 .2	○ .2 .3	—
4	• 2 .4	○ 4 36 ^r	—
5	• .2 36 ^r	○ .4	—
6	• 3.	○ .26 ^r .4	—
7	• .3 .1	○ .2 .4	—
8	• .2 .3 ○ 1.	—	.4.
9	• 61 .2	○ .3 .4	—
10	• .2 .1	○ .2 .34	—
11	• .2 .46 ^r	—	—
12	• 64 .2 .1 .3.	○	—
13	• 3. 46 ^r	○ .2 .1	—
14	• 4. .3 .1	○ .2 .2	—
15	• 4. .26 ^r .1.	○ .1.	—
16	• .4 .2 .1	○ .3	—
17	• .4 .1	○ .2 .3	—
18	• .4 .26 ^r .3.	—	—
19	• .4 .2 .1. 3○	—	—
20	• .3. .4 ○ .1.	—	.20
21	• .3. .4 — ○ .42.	—	—
22	• .3 .2 .1.	○ .1. .4	—
23	• .2 .1. 0 .3	—	.4
24	• .2 .1. 0 .3 .2 .3	—	.4
25	• 61 .2 .3	—	.4.
26	• 2. .1. ○ 3.	—	.4.
27	• 3. .2 ○ .1 .4	—	—
28	• 3. .1. ○ .4 .2.	—	—
29	• .3. 46 ^r ○ .1.	—	—
30	• 4. .2 .1. ○ .3	—	—
31	• 4. ○ 1. .2 .3	—	—

Giorni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole. australe.	LOGARITMO della distanza della Terra dal Sole.
3	7 8 33 34,1	216 10 33	14° 22' 4"	9,9964065
4	7 9 33 40,5	217 9 24	14 44 15	9,9962967
5	7 10 33 48,8	218 8 27	15 0 12	9,9961884
6	7 11 33 59,1	219 7 42	15 18 55	9,9960817
7	7 12 34 11,4	220 7 9	15 37 25	9,9959765
8	7 13 34 26,7	221 6 49	15 55 38	9,9958728
9	7 14 34 42,0	222 6 42	16 13 31	9,9957705
10	7 15 35 0,3	223 6 48	16 31 11	9,9956694
11	7 16 35 20,6	224 7 7	16 48 35	9,9955696
12	7 17 35 42,9	225 7 39	17 5 41	9,9954712
13	7 18 36 7,2	226 8 23	17 22 30	9,9953736
14	7 19 36 35,5	227 9 21	17 39 1	9,9952771
15	7 20 37 1,5	228 10 32	17 55 14	9,9951816
16	7 21 37 31,3	229 11 56	18 11 7	9,9950869
17	7 22 38 2,6	230 13 31	18 26 42	9,9949932
18	7 23 38 35,5	231 15 20	18 41 57	9,9949003
19	7 24 39 10,0	232 17 22	18 56 52	9,9948082
20	7 25 39 45,9	233 19 56	19 17 27	9,9947171
21	7 26 40 23,0	234 22 2	19 25 42	9,9946271
22	7 27 41 1,4	235 24 40	19 39 35	9,9945382
23	7 28 41 41,0	236 27 30	19 53 6	9,9944507
24	7 29 42 21,8	237 30 52	20 6 16	9,9943649
25	8 0 43 5,6	238 33 46	20 19 4	9,9942807
26	8 1 43 46,4	239 37 11	20 31 28	9,9941980
27	8 2 44 30,2	240 40 47	20 43 30	9,9941174
28	8 3 45 15,1	241 44 35	20 55 9	9,9940388
29	8 4 46 1,1	242 48 33	21 6 24	9,9939623
30	8 5 46 48,5	243 52 42	21 17 15	9,9938881
	8 6 47 36,5	244 57 1	21 27 43	9,9938165
	8 7 48 25,8	245 1 31	21 37 45	9,9937473

	Giorni dell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	Tempo medio mezzodi vero.	Tempo sidereo mezzodi vero.	Tempo sidereo mezzodi medio.	Nasere del Sole.	Tramontare del Sole.
305	1	Lun.	23 43 44,8	14 24 40,7	14 40 57,4	6 58	5 2	
306	2	Mart.	23 43 43,7	14 28 36,1	14 44 53,9	7 0	5 0	
307	3	Merc.	23 43 43,3	14 32 32,3	14 48 50,5	7 1	4 59	
308	4	Giov.	23 43 43,8	14 36 29,3	14 52 47,0	7 2	4 58	
309	5	Ven.	23 43 45,0	14 40 27,1	14 56 43,6	7 4	4 56	
310	6	Sab.	23 43 47,1	14 44 25,8	15 0 40,2	7 5	4 55	
311	7	Dom.	23 43 50,1	14 48 23,3	15 4 36,7	7 6	4 54	
312	8	Lun.	23 43 53,9	14 52 25,7	15 8 33,5	7 8	4 52	
313	9	Mart.	23 43 58,7	14 56 27,0	15 12 29,8	7 9	4 51	
314	10	Merc.	23 44 4,2	15 0 29,1	15 16 26,4	7 10	4 50	
315	11	Giov.	23 44 10,6	15 4 31,9	15 20 22,0	7 12	4 48	
316	12	Ven.	23 44 17,9	15 8 35,8	15 24 19,5	7 13	4 47	
317	13	Sab.	23 44 26,1	15 12 40,6	15 28 16,0	7 14	4 46	
318	14	Dom.	23 44 35,2	15 16 46,2	15 32 12,6	7 15	4 45	
319	15	Lun.	23 44 45,1	15 20 52,6	15 36 95,1	7 16	4 44	
320	16	Mart.	23 44 55,7	15 24 59,7	15 40 57,7	7 17	4 43	
321	17	Merc.	23 45 2,3	15 29 8,0	15 44 2,0	7 19	4 41	
322	18	Giov.	23 45 19,7	15 33 16,9	15 47 58,8	7 20	4 40	
323	19	Ven.	23 45 38,8	15 37 26,7	15 51 55,4	7 21	4 39	
324	20	Sab.	23 45 46,9	15 41 37,3	15 55 51,9	7 22	4 38	
325	21	Dom.	23 46 1,4	15 45 48,6	15 59 48,5	7 23	4 37	
326	22	Lun.	23 46 17,2	15 50 0,7	16 3 45,0	7 24	4 36	
327	23	Mart.	23 46 33,6	15 54 13,8	16 7 41,6	7 25	4 35	
328	24	Merc.	23 46 50,7	15 58 27,4	16 11 38,1	7 26	4 34	
329	25	Giov.	23 47 8,5	16 2 41,8	16 45 34,7	7 27	4 33	
330	26	Ven.	23 47 28,1	16 6 57,0	16 19 31,3	7 28	4 32	
331	27	Sab.	23 47 46,5	16 11 13,0	16 23 27,8	7 29	4 31	
332	28	Dom.	23 48 6,5	16 15 29,6	16 27 24,4	7 30	4 30	
333	29	Lun.	23 48 27,3	16 19 46,9	16 31 20,9	7 31	4 29	
334	30	Mart.	23 48 48,7	16 24 5,0	16 35 12,5	7 32	4 28	

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna			DIAMETRO orizzontale della Luna			Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte media.	a mezzo di medio.	a mezzo di medio.	a mezza notte media.			
1	3 47 ^b	14° 50B	61' 22"	61' 12"	33' 30"	33' 25"	5 53'	S	7 5'	M
2	4 52	17 26	60 58	60 40	33 17	33 7	6 38		8 21	
3	5 55	18 43	60 18	59 53	32 55	32 41	7 31		9 52	
4	6 58	18 40	59 26	58 58	32 27	32 11	8 28		10 57	
5	7 57	17 26	58 29	58 1	31 56	31 40	9 29		11 34	
6	8 54	15 13	57 32	57 5	31 24	31 9	10 32		0 13	S
7	9 47	12 15	56 38	56 14	30 55	30 42	11 55		1 2	
8	10 38	8 46	55 52	55 31	30 30	30 18	*	*	1 37	
9	11 26	4 57	55 13	54 56	30 8	29 59	0 35	M	2 7	
10	12 13	1 0	54 42	54 30	29 52	29 45	1 56		2 34	
11	12 59	2 57A	54 19	54 11	29 39	29 34	2 56		3 2	
12	13 46	6 47	54 4	53 58	29 31	29 28	3 54		3 30	
13	14 33	10 19	53 55	53 53	29 26	29 25	4 51		3 55	
14	15 21	13 26	53 53	53 53	29 25	29 25	5 53		4 25	
15	*	*	53 56	53 59	29 26	29 28	6 50		4 54	
16	16 11	15 58	54 4	54 10	29 31	29 34	7 50		5 28	
17	17 2	17 48	54 17	54 26	29 38	29 45	8 26		6 8	
18	17 54	18 48	54 56	54 47	29 48	29 54	9 20		6 52	
19	18 48	18 53	55 0	55 14	30 1	30 9	10 11		7 41	
20	19 42	18 0	55 50	55 47	30 18	30 27	10 58		8 36	
21	20 36	16 9	56 6	56 26	30 37	30 48	11 38		9 36	
22	21 30	13 24	56 48	57 11	31 0	31 13	0 16	S	10 40	
23	22 24	9 51	57 55	58 1	31 26	31 40	0 52		11 46	
24	23 18	5 58	58 27	58 52	31 54	32 8	1 23	*	*	
25	0 14	0 58	59 18	59 42	32 22	32 36	1 55		0 57	M
26	1 11	3 54B	60 5	60 25	32 48	32 59	2 30		2 7	
27	2 10	8 59	60 43	60 58	33 9	33 16	3 5		3 20	
28	3 12	12 54	61 7	61 12	33 21	33 24	3 41		4 35	
29	4 16	16 14	61 12	61 9	33 25	33 23	4 25		5 51	
30	5 21	18 20	60 59	60 46	33 17	33 10	5 15		7 5	

	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della luna pel meridiano.
			a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio.	a mezza notte media.	
1	Lun.	1 19 31 36	1 27 10 20	4 47 52A	4 58 21A	13 4	
2	Mart.	2 4 46 3	2 12 17 27	5 3 28	5 3 14	14 4	
3	Merc.	2 19 43 25	2 27 3 5	4 57 52	4 47 59	15 4	
4	Giov.	3 4 15 48	3 11 21 7	4 32 59	4 14 19	16 2	
5	Ven.	3 18 18 55	3 25 9 11	3 52 9	3 27 2	16 58	
6	Sab.	4 1 52 9	4 8 28 8	2 59 27	2 29 55	17 50	
7	Dom.	4 14 57 40	4 21 21 16	1 56 53	1 26 49	18 40	
8	Lun.	4 27 39 39	5 3 55 1	0 54 8	0 21 15	19 26	
9	Mart.	5 10 2 24	5 16 8 13	0 11 34B	0 43 53B	20 10	
10	Merc.	5 22 11 5	5 28 11 32	1 15 23	1 45 49	20 53	
11	Giov.	6 4 10 3	6 10 7 8	2 14 53	2 42 18	21 36	
12	Ven.	6 16 3 11	6 21 58 35	3 7 50	3 31 15	22 18	
13	Sab.	6 27 53 42	7 3 48 47	3 52 19	4 10 50	23 1	
14	Dom.	7 9 44 5	7 15 39 49	4 26 38	4 39 32	23 45	
15	Lun.	7 21 36 10	7 27 33 17	4 49 24	4 56 6	* *	
16	Mart.	8 3 31 17	8 9 30 19	4 59 35	4 59 45	0 31	
17	Merc.	8 15 30 33	8 21 32 9	4 56 36	4 50 7	1 18	
18	Giov.	8 27 35 18	9 3 40 13	4 40 19	4 27 17	2 6	
19	Ven.	9 9 47 12	9 15 56 30	4 11 5	3 51 51	2 55	
20	Sab.	9 22 8 29	9 28 23 30	3 29 43	3 4 52	3 45	
21	Dom.	10 4 41 58	10 11 4 17	2 37 30	2 7 53	4 35	
22	Lun.	10 17 30 57	10 24 2 24	1 36 17	1 3 1	5 25	
23	Mart.	11 0 39 5	11 7 21 26	0 28 27	0 6 59A	6 15	
24	Merc.	11 14 9 49	11 21 4 32	0 42 51A	1 18 37	7 6	
25	Giov.	11 28 5 48	0 5 13 38	1 53 45	2 27 37	7 57	
26	Ven.	0 12 27 52	0 19 48 11	2 59 37	3 29 3	8 50	
27	Sab.	0 27 14 1	1 4 44 32	3 55 18	4 17 45	9 45	
28	Dom.	1 12 18 45	1 19 55 29	4 35 50	4 49 7	10 43	
29	Lun.	1 27 33 25	2 5 11 8	4 57 17	5 0 8	11 43	
30	Mart.	2 12 47 12	2 20 20 14	4 57 39	4 49 56	12 44	

GIORNI.	FASI DELLA LUNA.	GIORNI.	ECLISSE DE' SATELL. DI GIOVE Tempo medio.
6	Ultimo quarto 15 ^h 53'	2	I. SATELLITE.
14	Novilunio 29 57	4	10 6 47 "
22	Primo quarto 11 19	5	4 35 29
29	Plenilunio 3 39	7	28 4 14
	CONGIUNZIONE DELLA LUNA COLLE STELLE	9	17 32 55
4	$\xi \Omega$ 5. ^a 15 30	11	12 1 38
5	$\alpha \Omega$ 5. ^a 8 16	13	6 59 18
7	$\tau \Omega$ 4. ^a 0 40	14	0 59 1
7	βIII 3. 4. ^a 11 44	15	18 27 40
8	ηIII 3. 4. ^a 2 58	16	13 55 22
8	$\gamma^1 \text{II}$ 4. ^a 13 43	18	8 25 1
8	$\gamma^2 \text{II}$ 4. ^a 13 43	20	2 53 42
9	δII 4. 5. ^a 5 57	21	21 22 21
12	$\gamma \Delta$ 4. 5. ^a 8 44	23	15 51 1
12	$\pi \Delta$ 4. 5. ^a 13 14		
13	$\theta \Delta$ 4. 5. ^a 18 16		
13	ϕ Osiuco 4. 5. ^a 5 53		
13	$m \text{II}$ 5. ^a 17 10		
18	$\gamma^2 \Delta$ 5. ^a 23 34	3	II. SATELLITE.
20	$\lambda \Delta$ 4. ^a 21 14	7	21 51 56
22	$\gamma^1 X$ 5. ^a 2 48	11	11 11 11
22	$\gamma^2 X$ 5. ^a 4 37	11	0 29 38
23	μX 5. ^a 21 40	14	13 48 57
24	γX 5. ^a 1 20	18	3 7 22
24	ξ^1 Balena 5. ^a 16 14	21	16 26 42
24	ξ^2 Balena 5. ^a 21 37		
25	μ Balena 4. ^a 4 58		
26	γV 3. 4. ^a 19 41	1	III. SATELLITE.
26	$\xi^1 \text{V}$ 5. ^a 21 32	1	10 17 28 imm.
27	$\xi^2 \text{V}$ 1. ^a 2 6	8	13 43 17 em.
	FENOMENI ED OSSERVAZIONI.	8	14 17 26 imm.
3	$\xi \phi$ sup. \odot .	15	17 43 40 em.
4	ξ nell' afelio.	15	21 44 34 em.
9	$\xi \phi$ θ Osiuco.	22	22 18 0 imm.
11	D apogea.	23	1 45 9 em.
12	D stazionario.		
20	$\xi \phi$ sup. \odot .	2	IV. SATELLITE.
22	\odot in D a 19 ^h 44'.	2	0 50 30 imm.
25	ξ nella mass. latit. elioc. A.	18	4 44 21 em.
27	D perigea.	18	18 55 24 imm.
		18	22 55 7 em.

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

Oriente

6^h 30'

Occidente

1	4.		1.	5.	3.
2	4.	2.	1.	3.	
3	4.	3.	2.	1.	
4	4.	3.	1.	0.	2.
5	02	463	0.	1.	
6		2.	1.	0.	30
7			0.	21.	4.
8			1.	0.	364
9	01	2.	0.	3.	4.
10		362	0.	1.	4.
11		3.	1.	0.	4.
12		3.	0.	2.	4.
13		2.	1.	50	
14			0.	14.	3.
15		461	0.	2.	3.
16		4.	2.	0.	3.
17	4.	2.	3.	0.	10
18	4.	3.	1.	0.	3.
19	4.	3.	0.	261	
20	4.	2.	1.	3.	
21	4.		0.	1.	3.
22	4.	1.	0.	2.	3.
23		2.	0.	1.	3.
24		2.	361	0.	4.
25		3.	1.	0.	4.
26		3.	0.	12.	4.
27		2.	31.	0.	4.
28			2.	0.	163
29			1.	0.	2.
30			2.	1.	364

Giorni del mese.	LONGITUDINE del Sole.	ASCENSIONE retta del Sole.	DECLINAZIONE del Sole australe.	LOGARITMO della distanza della Terra dal Sole.
1	8° 8' 49" 16,3	247° 6' 10"	21° 47' 23"	9,9936806
2	8 9 50 7,9	248 11 0	21 56 36	9,9936165
3	8 10 51 0,7	249 15 58	22 5 24	9,9935548
4	8 11 51 54,8	250 21 6	22 13 46	9,9934955
5	8 12 52 50,0	251 26 23	22 21 42	9,9934386
6	8 13 53 46,5	252 31 49	22 29 13	9,9933838
7	8 14 54 44,3	253 37 23	22 36 16	9,9933313
8	8 15 55 43,2	254 43 4	22 42 54	9,9932808
9	8 16 56 43,2	255 48 53	22 49 4	9,9932323
10	8 17 57 44,5	256 54 49	22 54 48	9,9931857
11	8 18 58 46,9	258 0 52	23 0 4	9,9931409
12	8 19 59 50,2	259 7 0	23 4 53	9,9930979
13	8 21 0 54,3	260 13 14	23 9 15	9,9930564
14	8 22 1 59,1	261 19 33	23 13 9	9,9930165
15	8 23 3 4,7	262 25 56	23 16 35	9,9929781
16	8 24 4 11,0	263 32 23	23 19 33	9,9929412
17	8 25 5 17,9	264 38 54	23 22 4	9,9929058
18	8 26 6 25,3	265 45 27	23 24 6	9,9928720
19	8 27 7 33,0	266 52 2	23 25 59	9,9928402
20	8 28 8 40,9	267 58 40	23 26 45	9,9928103
21	8 29 9 49,0	269 5 18	23 27 22	9,9927824
22	9 0 10 57,2	270 11 56	23 27 32	9,9927564
23	9 1 12 5,4	271 18 35	23 27 12	9,9927328
24	9 2 13 13,6	272 25 13	23 26 25	9,9927115
25	9 3 14 21,9	273 31 50	23 25 9	9,9926927
26	9 4 15 30,2	274 38 26	23 23 25	9,9926764
27	9 5 16 38,5	275 44 59	23 21 14	9,9926627
28	9 6 17 46,9	276 51 31	23 18 33	9,9926519
29	9 7 18 55,4	277 57 59	23 15 24	9,9926443
30	9 8 20 3,9	279 4 24	23 11 48	9,9926391
31	9 9 21 12,3	280 10 46	23 7 43	9,9926371

		Giorni dell'anno.	Giorni del mese.	Giorni della settimana.	TEMPO medio a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì vero.	TEMPO sidereo a mezzodì medio.	Nascere del Sole.	Tramontare del Sole.
335	1	Merc.	23 49 10,8	16 28 23,7	16 39 14,0	7 33	h 1	4 27	
336	2	Giov.	23 49 35,5	16 32 43,0	16 43 10,6	7 33	4 27	4 27	
337	3	Ven.	23 49 56,9	16 37 2,9	16 47 7,1	7 34	4 26		
338	4	Sab.	23 50 20,8	16 41 23,5	16 51 3,7	7 35	4 25		
339	5	Dom.	23 50 45,3	16 45 44,6	16 55 0,3	7 36	4 24		
340	6	Lun.	23 51 10,5	16 50 6,4	16 58 56,9	7 36	4 24		
341	7	Mart.	23 51 36,2	16 54 28,7	17 2 53,4	7 37	4 23		
342	8	Merc.	23 52 2,4	16 58 51,5	17 6 50,0	7 37	4 23		
343	9	Giov.	23 52 20,9	17 3 14,7	17 10 46,5	7 38	4 22		
344	10	Ven.	23 52 56,3	17 7 38,6	17 14 43,1	7 38	4 22		
345	11	Sab.	23 53 24,0	17 12 2,8	17 18 39,6	7 39	4 21		
346	12	Dom.	23 53 51,9	17 16 27,4	17 22 36,2	7 39	4 21		
347	13	Lun.	23 54 20,3	17 20 52,3	17 26 34,7	7 40	4 20		
348	14	Mart.	23 54 49,0	17 25 17,6	17 30 29,3	7 40	4 20		
349	15	Merc.	23 55 18,0	17 29 43,3	17 34 25,8	7 40	4 20		
350	16	Giov.	23 55 47,2	17 34 9,1	17 38 22,4	7 41	4 19		
351	17	Ven.	23 56 16,8	17 38 35,2	17 42 18,9	7 41	4 19		
352	18	Sab.	23 56 46,4	17 43 1,5	17 46 15,5	7 41	4 19		
353	19	Dom.	23 57 16,1	17 47 27,8	17 50 12,0	7 42	4 18		
354	20	Lun.	23 57 46,1	17 51 54,5	17 54 8,6	7 42	4 18		
355	21	Mart.	23 58 16,1	17 56 21,0	17 58 5,1	7 42	4 18		
356	22	Merc.	23 58 46,0	18 0 47,6	18 2 1,7	7 42	4 18		
357	23	Giov.	23 59 16,1	18 5 14,2	18 5 58,2	7 42	4 18		
358	24	Ven.	23 59 46,1	18 9 40,9	18 9 54,8	7 42	4 18		
359	25	Sab.	0 0 15,9	18 14 7,3	18 13 51,4	7 41	4 19		
360	26	Dom.	0 0 45,7	18 18 33,8	18 17 48,0	7 41	4 19		
361	27	Lun.	0 1 15,4	18 23 0,0	18 21 44,5	7 41	4 19		
362	28	Mart.	0 1 45,0	18 27 26,3	18 25 41,1	7 40	4 20		
363	29	Merc.	0 2 14,3	18 31 52,1	18 29 37,6	7 40	4 20		
364	30	Giov.	0 2 43,4	18 36 17,9	18 33 34,2	7 39	4 21		
365	31	Ven.	0 3 12,3	18 40 43,4	18 37 30,8	7 39	4 21		

Giorni	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna		DIAMETRO orizzontale della Luna		Nascere della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte media.	a mezzo di medio.	a mezza notte media.		
1	6 27	19 2B	60 28	60 7	33 0	32 49	6 10 S	8 17 M
2	7 30	18 23	59 42	59 16	32 35	32 21	7 11	9 18
3	8 30	16 32	58 47	58 18	32 5	31 49	8 15	10 12
4	9 26	15 47	57 49	57 20	31 33	31 18	9 23	10 59
5	10 20	10 25	56 52	56 25	31 2	30 48	10 25	11 59
6	11 9	6 36	56 1	55 58	30 34	30 22	11 26	0 11 S
7	11 57	2 36	55 17	54 59	30 11	30 1	* *	0 40
8	12 44	1 25A	54 44	54 30	29 52	29 45	0 29 M	1 7
9	13 30	5 20	54 19	54 11	29 59	29 34	1 25	1 55
10	14 17	9 1	54 4	54 0	29 31	29 28	2 24	2 9
11	15 5	12 20	53 57	53 57	29 27	29 27	3 25	2 27
12	15 54	15 8	53 59	54 2	29 28	29 30	4 23	2 57
13	16 45	17 17	54 7	54 14	29 32	29 35	5 22	3 50
14	* * -	* *	54 21	54 30	29 40	29 45	6 22	4 6
15	17 37	18 39	54 40	54 51	29 50	29 56	7 17	4 49
16	18 31	19 5	55 2	55 14	30 3	30 9	8 8	5 56
17	19 25	18 32	55 27	55 41	30 16	30 24	8 58	6 30
18	20 19	17 1	55 55	56 10	30 32	30 40	9 41	7 29
19	21 14	14 33	56 26	56 42	30 48	30 57	10 20	8 32
20	22 7	11 17	56 59	57 17	31 6	31 16	10 56	9 38
21	23 1	7 20	57 35	57 54	31 25	31 36	11 28	10 44
22	23 54	2 55	58 13	58 32	31 47	31 57	11 58	11 52
23	0 49	1 46B	58 51	59 10	32 8	32 18	0 33 S	* *
24	1 45	6 27	59 27	59 44	32 27	32 36	1 4	1 1 M
25	2 43	10 51	59 58	60 10	32 44	32 51	1 38	2 14
26	3 44	14 36	60 20	60 26	32 56	33 0	2 15	3 28
27	4 47	17 22	60 29	60 29	33 1	33 1	2 58	4 41
28	5 52	18 52	60 24	60 15	32 58	32 54	3 50	5 52
29	6 56	18 59	60 3	59 47	32 47	32 58	4 50	6 58
30	7 59	17 46	59 29	59 7	32 28	32 16	5 54	7 58
31	8 59	15 26	58 44	58 18	32 3	31 49	6 59	8 49

Giorni del mese.	Giorni della settimana.	LONGITUDINE DELLA LUNA		LATITUDINE DELLA LUNA		Passaggio della Luna pel meridiano.
		a mezzodì medio.	a mezzanotte media.	a mezzodì medio	a mezza notte media.	
1 Merc.	2 27 48 58	3 5 12 17	4 37 19 A	4 20 8 A	13 45	
2 Giov.	3 12 29 17	3 19 39 18	3 58 55	3 34 12	14 44	
3 Ven.	3 26 41 52	4 3 36 51	3 6 55	2 36 39	15 40	
4 Sab.	4 10 24 10	4 17 4 4	2 5 0	1 32 9	16 34	
5 Dom.	4 23 36 54	5 0 3 10	0 58 37	0 24 52	17 22	
6 Lun.	5 6 23 22	5 12 38 20	0 8 40 B	0 41 39 B	18 7	
7 Mart.	5 18 48 10	5 24 54 8	1 13 43	1 44 33	18 51	
8 Merc.	6 0 56 40	6 6 56 25	2 13 56	2 41 35	19 54	
9 Giov.	6 12 54 5	6 18 50 8	3 7 16	3 30 48	20 16	
10 Ven.	6 24 45 17	7 0 59 57	3 51 57	4 10 34	20 59	
11 Sab.	7 6 54 39	7 12 29 47	4 26 29	4 39 31	21 45	
12 Dom.	7 18 05 43	7 24 22 43	4 49 33	4 56 27	22 28	
13 Lun.	8 0 01 4	8 6 20 57	5 0 7	5 0 29	23 15	
14 Mart.	8 12 22 50	8 18 25 53	4 57 29	4 51 7	24 *	
15 Merc.	8 24 31 18	9 0 38 31	4 41 22	4 28 19	25 5	
16 Giov.	9 6 47 57	9 12 59 32	4 12 3	3 52 41	26 52	
17 Ven.	9 19 13 23	9 25 29 36	3 30 23	3 5 22	27 42	
18 Sab.	10 1 48 19	10 8 9 41	2 37 51	2 8 9	28 33	
19 Dom.	10 14 33 54	10 21 1 11	1 36 54	1 3 27	29 23	
20 Lun.	10 27 31 44	11 4 5 53	0 29 12	0 5 47 A	30 15	
21 Mart.	11 10 43 54	11 17 06 3	0 41 5 A	1 18 10	31 2	
22 Merc.	11 24 12 38	0 1 3 61	1 50 57	2 26 50	32 51	
23 Giov.	0 7 59 57	0 15 0 69	2 55 20	3 24 34	33 42	
24 Ven.	0 22 6 56	0 29 17 40	3 50 59	4 14 5	34 34	
25 Sab.	1 6 32 52	1 13 52 3	4 33 19	4 48 17	35 28	
26 Dom.	1 21 14 34	1 28 39 38	4 58 35	5 3 55	36 25	
27 Lun.	2 6 6 18	2 13 53 30	5 4 0	4 59 16	37 24	
28 Mart.	2 21 0 9	2 28 25 7	4 49 13	4 34 21	38 24	
29 Merc.	3 5 47 17	3 15 5 38	4 15 0	3 51 35	39 25	
30 Giov.	3 20 19 14	3 27 27 21	3 24 59	2 54 47	40 23	
31 Ven.	4 4 29 23	4 11 24 57	2 22 36	1 48 46	41 19	

Giorni del mese.	AR. della Luna nel merid.	Declin. della Luna nel merid.	PARALLASSE equatoriale della Luna			DIAMETRO orizzontale della Luna			Nascer. della Luna.	Tramontare della Luna.
			a mezzo di medio.	a mezza notte media.	a mezzo di medio.	a mezzo di medio.	a mezza notte media.			
1	6 27	19 28	60 28	60 7	53 0	52 49	6 10 S	8 17 M		
2	7 30	18 23	59 42	59 16	53 35	52 21	7 11	9 18		
3	8 30	16 32	58 47	58 18	52 5	51 49	8 15	10 12		
4	9 26	15 47	57 49	57 20	51 33	51 18	9 23	10 59		
5	10 20	10 25	56 52	56 25	51 2	50 48	10 25	11 39		
6	11 9	6 36	56 1	55 38	50 34	50 22	11 26	0 11 S		
7	11 57	2 36	55 17	54 59	50 11	50 1	* *	0 40		
8	12 44	1 25 A	54 44	54 30	29 52	29 45	0 29 M	1 7		
9	13 30	5 20	54 19	54 11	29 39	29 34	1 25	1 35		
10	14 17	9 1	54 4	54 0	29 31	29 28	2 24	2 0		
11	15 5	12 20	53 57	53 57	29 27	29 27	3 25	2 27		
12	15 54	15 8	53 59	54 2	29 28	29 30	4 23	2 57		
13	16 45	17 17	54 7	54 14	29 32	29 35	5 22	3 30		
14	* * -	* * -	54 21	54 30	29 40	29 45	6 22	4 6		
15	17 37	18 39	54 40	54 51	29 50	29 56	7 17	4 49		
16	18 51	19 5	55 2	55 14	30 3	30 9	8 8	5 56		
17	19 25	18 32	55 27	55 41	30 16	30 24	8 58	6 50		
18	20 19	17 1	55 55	56 10	30 32	30 40	9 41	7 29		
19	21 14	14 33	56 26	56 42	30 48	30 57	10 20	8 32		
20	22 7	11 17	56 59	57 17	31 6	31 16	10 56	9 38		
21	23 1	7 20	57 35	57 54	31 26	31 36	11 28	10 44		
22	23 54	2 55	58 13	58 32	31 42	31 57	11 58	11 52		
23	0 49	1 46 B	58 51	59 10	32 8	32 18	0 33 S	* *		
24	1 45	6 27	59 27	59 44	32 27	32 36	1 4	1 1 M		
25	2 43	10 51	59 58	60 10	32 44	32 51	1 38	2 14		
26	3 44	14 36	60 20	60 26	32 56	33 0	2 15	3 28		
27	4 47	17 22	60 29	60 29	33 1	33 1	2 58	4 41		
28	5 52	18 52	60 24	60 15	32 58	32 54	3 50	5 52		
29	6 56	18 59	60 3	59 47	32 47	32 38	4 50	6 58		
30	7 59	17 46	59 29	59 7	32 28	32 16	5 54	7 58		
31	8 59	15 26	58 44	58 18	32 3	31 49	6 59	8 49		

DICEMBRE 1830.

POSIZIONE DEI SATELLITI DI GIOVE.

	Oriente	5 ^h 30'	Occidente
1	.2	.1	○ 3.
2	3.	4. ○ 1	6. 2.
3	.5	4.	○ 2.
4	4.	.32.	1. ○
5	4.	.2	○ .3. 1
6	4.	.1.	○ .2. .3
7	.4	○ 2.	1. 3.
8	.4	2.	.1. ○ 3.
9	.4	3.	○ .21.
10	3.	.4. 1	○ 2.
11	.3	2.	1. ○ .4
12	.2	○ 3. 1	4.
13	1.	○	.2 .3 .4
14		○ 2.	.1 .3 .4
15	2.	.1	○ 3. 4.
16	02	3.	○ 1. 4.
17	3.	.1	○ 2. 4.
18	01	.3	2. ○ 4.
19		.2 4.	○ 1. 50
20	4.	1.	○ .2 .3
21	4.		○ 2. 6. 1. 3.
22	4.	2. 1.	○ 3.
23	4.	3. .2	○ 1.
24	.4	3.	.1 ○ .2
25	.4	.3	2. ○ 1.
26	01	2. 6. 4	.3 ○ .40
27		1.	○ .2 .3
28		○	.12. 4. 5.
29		2. 1.	○ 3. .4
30		3. 6. 2	○ 1. .4
31	3.	.1	○ .2 .4

SEMDIAMETRO DEL SOLE,
TEMPO IMPIEGATO DAL SOLE A PASSARE PEL MERIDIANO,
E LONGITUDINE DEL NODO DELLA LUNA.

	Semidiam. del Sole.	Tempo impieg. dal Sole a passare pel mer.	Longitud. del nodo della Luna.		Semidiam. del Sole.	Tempo impieg. dal Sole a passare pel mer.	Longitud. del nodo della Luna.
1	16' 17,8	2 21,7	5 23° 0'	Luglio	6	15' 45,5	2 16,6
7	16 17,7	2 20,8	5 22 41		12	15 46,6	5 12 50
13	16 17,4	2 19,7	5 22 22		18	15 46,6	5 12 31
19	16 16,9	2 18,4	5 22 3		24	15 46,6	5 12 12
25	16 16,2	2 17,0	5 21 44		30	15 47,2	5 11 53
Gennajo	31	16 15,4	2 15,6	Agosto	5	15 48,0	2 11,8
	6	16 14,5	2 14,3		11	15 49,0	2 10,8
	12	16 13,4	2 13,1		17	15 50,0	2 10,0
	18	16 12,2	2 12,0		23	15 51,3	2 9,2
	24	16 10,8	2 11,0		29	15 52,6	2 8,5
Febrero	2	16 9,4	2 10,1	Settembre	4	15 53,9	2 8,2
	8	16 7,9	2 9,4		10	15 55,4	2 7,9
	14	16 6,3	2 8,9		16	15 56,9	2 7,8
	20	16 4,6	2 8,6		22	15 58,5	2 7,8
	26	16 2,9	2 8,5		28	16 0,1	2 8,1
Marzo	1	16 1,2	2 8,6	Ottobre	4	16 1,7	2 8,4
	7	15 59,6	2 8,7		10	16 3,5	2 9,1
	13	15 58,1	2 9,2		16	16 5,1	2 10,0
	19	15 56,5	2 9,7		22	16 6,7	2 10,9
	25	15 54,9	2 10,4		28	16 8,3	2 12,1
Aprile	1	15 53,4	2 11,2	Novembre	3	16 9,8	2 13,3
	7	15 52,1	2 12,1		9	16 11,2	2 14,7
	13	15 50,8	2 13,0		15	16 12,5	2 16,1
	19	15 49,7	2 14,1		21	16 13,7	2 17,6
	25	15 48,7	2 15,1		27	16 14,8	2 18,9
Maggio	31	15 47,8	2 15,9	Dicembre	3	16 15,7	2 20,2
	6	15 47,0	2 16,7		9	16 16,5	2 21,1
	12	15 46,4	2 17,2		15	16 17,1	2 21,8
	18	15 45,9	2 17,4		21	16 17,4	2 22,1
	24	15 45,6	2 17,4		27	16 17,8	2 22,0
	30	15 45,5	2 17,1				
Giugno							

POSIZIONI DI MERcurio DEI SEI IN SEI GIORNI.

		Longitu- dine.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Musere.	Passeggi- o per merid.	Tramont- tare.
Ottobre	0	9° 13' 28"	2° 0A	18° 59'	25° 46A	20° 8'	0° 21'	4 44'
	6	9° 23' 20"	2° 6'	19° 42'	23° 32'	20° 22'	0° 40'	4 58'
	12	10° 3' 21"	1° 59'	20° 24'	21° 23'	20° 29'	0° 59'	5 29'
	18	10° 13' 10"	1° 28'	21° 4'	18° 19'	20° 36'	1° 15'	6 0
	24	10° 21' 57"	0° 50'	21° 38'	14° 41'	20° 26'	1° 25'	6 27'
Febbrajo	5	10° 27' 52"	0° 55B	21° 59'	11° 18'	20° 2'	1° 23'	6 39'
	11	10° 28' 24"	2° 56'	21° 59'	9° 31'	19° 35'	0° 59'	6 23'
	17	10° 25' 31"	3° 58'	21° 58'	10° 16'	18° 54'	0° 14'	5 34'
	23	10° 17' 3"	3° 23'	21° 13'	12° 30'	18° 15'	23° 26'	4 37'
Marzo	1	10° 15' 4"	0° 57'	21° 9'	15° 25'	17° 35'	22° 34'	3 38'
	7	10° 19' 8"	0° 14A	21° 26'	15° 19'	17° 29'	22° 28'	3 27'
	13	10° 25' 11"	1° 10'	21° 51'	14° 15'	17° 26'	22° 29'	3 32'
	19	11° 2' 35"	1° 51'	22° 20'	12° 18'	17° 23'	22° 35'	3 47'
	25	11° 11' 2"	2° 18'	22° 58'	9° 33'	17° 20'	22° 44'	4 8
Aprile	1	11° 26' 22"	2° 23'	23° 28'	6° 3'	17° 16'	22° 55'	4 34'
	6	11° 0' 35"	2° 14'	0° 5'	1° 52'	17° 13'	23° 8'	5 3
	12	11° 11' 40"	1° 47'	0° 45'	2° 56B	17° 10'	23° 25'	5 40'
	18	11° 23' 40"	1° 2'	1° 29'	8° 11'	17° 7'	23° 44'	6 21'
	24	11° 6' 20"	0° 3'	2° 15'	13° 34'	17° 7'	0° 8'	7 9
Maggio	30	1° 19' 5"	1° 1B	3° 5'	18° 27'	17° 11'	0° 54'	7 57'
	6	2° 0' 56"	1° 52'	3° 53'	22° 12'	17° 17'	0° 58'	8 39'
	12	2° 11' 3"	2° 26'	4° 36'	24° 27'	17° 24'	1° 18'	9 12'
	18	2° 19' 5"	2° 19'	5° 12'	25° 20'	17° 30'	1° 29'	9 28'
	24	2° 24' 49"	1° 44'	5° 37'	25° 7'	17° 34'	1° 31'	9 28'
Giugno	30	4° 27' 58"	0° 38'	5° 51'	24° 6'	17° 30'	1° 21'	9 12'
	5	4° 28' 16"	0° 53A	5° 53'	22° 35'	17° 16'	1° 0'	8 44'
	11	4° 26' 31"	2° 34'	5° 44'	20° 51'	16° 53'	0° 28'	8 3
	17	4° 23' 7"	3° 56'	5° 31'	19° 21'	16° 23'	23° 50'	7 17'
	23	4° 20' 30"	4° 32'	5° 20'	18° 34'	15° 52'	23° 15'	6 38'
	29	4° 20' 4"	4° 20'	5° 18'	18° 45'	15° 26'	22° 50'	6 14'

POSIZIONI DI MERCURIO DI SEI IN SEI GIORNI.

		Longitu- dine.	L'altitudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Nascere.	Passaggio per merid.	Tramon- tare.
Luglio	5	2° 22' 57"	5° 29A	5° 28'	19° 45B	15° 8'	22° 37'	5° 7'
	11	2° 28' 2	2° 17'	5° 51'	21° 9'	15° 1'	22° 36'	6° 11'
	17	3° 6' 10'	0° 56'	6° 26'	22° 24'	15° 5'	22° 47'	6° 29'
	23	3° 16' 58'	0° 29B	7° 12'	22° 46'	15° 28'	23° 9'	6° 55'
	29	3° 28' 40'	1° 15'	8° 4'	21° 42'	15° 59'	23° 58'	7° 17'
Agosto	4	4° 11' 11'	1° 43'	8° 56'	19° 6'	16° 41'	0° 6'	7° 31'
	10	4° 23' 16'	1° 43'	9° 44'	15° 26'	17° 23'	0° 31'	7° 39'
	16	5° 4' 42'	1° 23'	10° 27'	11° 11'	18° 0'	0° 50'	7° 40'
	22	5° 14' 58'	0° 42'	11° 5'	6° 43'	18° 35'	1° 5'	7° 35'
	28	5° 24' 34'	0° 5'	11° 40'	2° 16'	19° 2'	1° 15'	7° 28'
Settem.	3	6° 3' 21'	0° 44A	12° 11'	1° 59A	19° 28'	1° 23'	7° 18'
	9	6° 11' 21'	1° 34'	12° 59'	5° 55'	19° 48'	1° 27'	7° 6'
	15	6° 18' 19'	2° 22'	13° 4'	9° 25'	20° 5'	1° 28'	6° 53'
	21	6° 25' 55'	3° 5'	13° 24'	12° 10'	20° 13'	1° 25'	6° 38'
	27	6° 27' 19'	3° 33'	13° 56'	13° 54'	20° 9'	1° 14'	6° 19'
Ottobre	3	6° 27' 50'	3° 31'	13° 57'	13° 57'	19° 46'	0° 51'	5° 56'
	9	6° 20' 12'	2° 36'	13° 23'	11° 38'	18° 57'	0° 12'	5° 27'
	15	6° 16' 24'	0° 46'	12° 59'	7° 5'	17° 51'	2° 25'	4° 59'
	21	6° 12' 46'	1° 5B	12° 48'	3° 59'	17° 5'	22° 50'	4° 37'
	27	6° 15' 22'	2° 0'	12° 59'	4° 6'	16° 51'	22° 38'	4° 25'
Novem.	2	6° 22' 9	2° 8'	13° 25'	6° 37'	17° 4'	22° 40'	4° 16'
	8	7° 6' 58'	1° 47'	13° 58'	10° 7'	17° 27'	22° 49'	4° 11'
	14	7° 10' 26'	1° 12'	14° 33'	13° 48'	17° 55'	23° 1'	4° 7'
	20	7° 19' 59'	0° 32'	15° 11'	17° 14'	18° 26'	23° 15'	4° 4'
	26	7° 29' 30'	0° 9A	15° 49'	20° 12'	18° 53'	23° 29'	4° 5'
Dicembre	2	8° 8' 56'	0° 48'	16° 28'	22° 35'	19° 22'	23° 45'	4° 8'
	8	8° 18' 22'	1° 22'	17° 9'	24° 18'	19° 48'	0° 2'	4° 16'
	14	8° 27' 50'	1° 49'	17° 50'	25° 15'	20° 14'	0° 20'	4° 29'
	20	9° 7' 23'	2° 6'	18° 32'	25° 22'	20° 29'	0° 38'	4° 47'
	26	9° 16' 56'	2° 10'	19° 14'	24° 34'	20° 44'	0° 57'	5° 10'

POSIZIONI DI VENERE DI SEI IN SEI GIORNI.

	Longitu-dine.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declina-zione.	Nascere.	Passaggio pel merid.	Tramon-tare.
Gennajo	0 10° 26' 43"	0° 45A	21 57'	13° 36A	22 13'	3 19'	8 25'
	6 11 2 28	0 14	22 18	11 1	21 58	3 16	8 34
	12 11 7 49	0 21B	22 38	8 23	21 43	3 12	8 41
	18 11 13 42	1 7	22 54	5 47	21 25	3 5	8 45
	24 11 17 0	2 4	23 9	3 15	21 7	2 56	8 45
Febbrajo	30 11 20 32	3 11	23 20	0 53	20 45	2 44	8 43
	5 11 23 8	4 20	23 28	1 12B	20 20	2 28	8 36
	11 11 24 33	5 31	23 31	2 54	19 52	2 7	8 22
	17 11 24 34	6 40	23 30	4 2	19 23	1 42	8 1
	23 11 22 59	7 44	23 23	4 28	18 50	1 11	7 32
Marzo	1 11 20 23	8 32	23 11	4 4	18 17	0 36	6 55
	7 11 16 43	8 48	22 58	2 54	17 44	23 59	6 14
	13 11 13 5	8 28	22 45	1 12	17 15	23 23	5 31
	19 11 10 17	7 39	22 36	0 36A	16 50	22 50	4 50
	25 11 8 50	6 31	22 32	2 12	16 29	22 23	4 17
Aprile	31 11 8 55	5 17	22 34	3 21	16 13	22 1	3 50
	6 11 10 10	4 3	22 41	4 0	15 57	21 44	3 31
	12 11 12 36	2 54	22 51	4 8	15 44	21 31	3 18
	18 11 15 58	1 52	23 6	3 48	15 33	21 21	3 9
	24 11 20 4	0 58	23 22	3 3	15 23	21 14	3 5
Maggio	30 11 24 44	0 12	23 40	1 57	15 14	21 9	3 4
	6 11 29 50	0 31A	0 0	0 33	15 5	21 5	3 5
	12 0 5 17	1 4	0 21	1 6B	14 55	21 2	3 9
	18 0 11 1	1 32	0 43	2 56	14 45	21 0	3 15
	24 0 17 0	1 54	1 5	4 55	14 35	20 59	3 23
Giugno	30 0 23 9	2 10	1 29	6 58	14 27	20 59	3 31
	5 0 29 26	2 21	1 53	9 4	14 19	20 59	3 39
	11 1 5 53	2 27	2 18	11 9	14 11	21 0	3 49
	17 1 12 26	2 29	2 43	13 11	14 4	21 2	4 0
	23 1 19 4	2 28	3 9	15 7	13 58	21 5	4 12
	29 1 25 48	2 23	3 36	16 54	13 52	21 8	4 24

POSIZIONI DI VENERE DI SEI IN SEI GIORNI.

		Longitu- dine.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Nascere.	Passaggio pel merid.	Tramon- tare.
Luglio	5	8 2 ° 34'	2 14	4 4	18° 50'	13 49	21 12	4 35
	11	2 9 26	2 2	4 32	19 52	13 47	21 17	4 47
	17	2 16 21	1 48	5 1	20 58	13 47	21 22	4 57
	23	2 23 19	1 32	5 31	21 45	13 49	21 28	5 7
	29	3 0 21	1 14	6 1	22 13	13 55	21 35	5 17
Agosto	4	3 7 25	0 56	6 32	22 18	14 0	21 42	5 24
	10	3 14 31	0 58	7 3	22 2	14 8	21 49	5 30
	16	3 21 41	0 22	7 33	21 24	14 19	21 56	5 33
	22	3 28 52	0 4	8 4	20 23	14 31	22 3	5 35
	28	4 6 7	0 14B	8 34	19 2	14 44	22 9	5 34
Settembre	3	4 15 23	0 32	9 4	17 21	14 59	22 16	5 33
	9	4 20 42	0 47	9 33	15 22	15 13	22 21	5 28
	15	4 28 2	1 0	10 2	13 7	15 28	22 26	5 24
	21	5 5 24	1 10	10 50	10 39	15 44	22 31	5 18
	27	5 12 48	1 19	10 58	7 59	16 0	22 36	5 12
Ottobre	3	5 20 14	1 25	11 26	5 12	16 15	22 40	5 5
	9	5 27 40	1 28	11 54	2 18	16 51	22 44	4 57
	15	6 5 8	1 30	12 21	0 39A	16 47	22 47	4 47
	21	6 12 38	1 29	12 49	3 37	17 3	22 51	4 39
	27	6 20 8	1 24	13 16	6 33	17 19	22 55	4 31
Novem.	2	6 27 38	1 20	13 44	9 24	17 35	23 0	4 25
	8	7 5 10	1 12	14 13	12 7	17 52	23 5	4 18
	14	7 12 42	1 1	14 42	14 41	18 8	23 10	4 12
	20	7 20 14	0 50	15 12	17 0	18 25	23 16	4 7
	26	7 27 48	0 38	15 43	19 4	18 41	23 23	4 5
Dicembre	2	8 5 21	0 24	16 14	20 49	18 59	23 31	4 3
	8	8 12 54	0 10	16 46	22 12	19 13	23 39	4 5
	14	8 20 28	0 4A	17 18	23 11	19 28	23 48	4 8
	20	8 28 1	0 19	17 51	23 45	19 39	23 57	4 15
	26	9 5 54	0 32	18 24	23 53	19 49	0 6	4 23

POSIZIONI DI MARTE DI SEI IN SEI GIORNI.

	Longitu- dine.	Lati- tudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Nascere.	Passaggio per merid.	Tramontare.
Genmajo	0 9 22 39	0 53 38	15 23	18 0	15 56	20 42	1 28
	6 7 26 36	0 28	15 39	19 0	15 53	20 35	1 17
	12 8 0 34	0 35	15 55	19 57	15 51	20 28	1 5
	18 8 4 33	0 22	16 12	20 47	15 48	20 21	0 54
	24 8 8 32	0 17	16 29	21 31	15 45	20 14	0 43
Febbrajo	30 8 12 32	0 12	16 46	22 9	15 41	20 8	0 35
	5 8 16 32	0 7	17 3	22 41	15 38	20 1	0 24
	11 8 20 32	0 2	17 20	23 6	15 33	19 54	0 15
	17 8 24 32	0 24	17 37	23 24	15 28	19 48	0 8
	23 8 28 33	0 8	17 54	23 55	15 24	19 42	0 0
Marzo	1 9 2 33	0 14	18 12	23 40	15 17	19 35	23 53
	7 9 6 34	0 20	18 30	23 57	15 11	19 29	23 47
	13 9 10 34	0 27	18 47	23 28	15 3	19 23	23 43
	19 9 14 34	0 34	19 4	23 12	14 56	19 17	23 38
	25 9 18 34	0 41	19 22	22 49	14 49	19 11	23 33
Aprile	31 9 22 32	0 49	19 39	22 20	14 39	19 4	23 29
	6 9 26 31	0 57	19 56	21 46	14 29	18 57	23 25
	12 9 0 29	1 6	20 13	21 6	14 19	18 50	23 21
	18 10 4 27	1 15	20 30	20 20	14 8	18 43	23 18
	24 10 8 23	1 25	20 46	19 29	13 56	18 36	23 16
Maggio	30 10 12 15	1 35	21 3	18 35	13 46	18 29	23 12
	6 10 16 7	1 45	21 17	17 37	13 35	18 21	23 9
	12 10 19 56	1 57	21 35	16 37	13 19	18 12	23 5
	18 10 25 42	2 9	21 48	15 34	13 7	18 4	23 1
	24 10 27 25	2 21	22 3	14 29	12 52	17 55	22 58
Giugno	30 11 1 3	2 25	22 17	13 25	12 39	17 46	22 53
	5 11 6 57	2 46	22 31	12 18	12 24	17 36	22 48
	11 11 8 4	2 59	22 45	11 13	12 9	17 26	22 43
	17 11 17 25	3 15	22 58	10 10	11 54	17 15	22 36
	23 11 14 37	3 27	23 10	9 9	11 38	17 4	22 30
	29 11 17 59	3 42	23 22	8 11	11 22	16 52	22 22

POSSESSIONE DI MARTE DE' MESI IN SEI GIORNI.

		Longit. dine.	Lati. tudine.	Ascensione retta.	Declin. zione.	Nascita.	Passaggio pel merid.	Tramont. tare.
Luglio	5	11 20 32	3° 57'	23 56	7 17	11 6	16 39	22 12
	12	11 23 1	4 13	23 43	6 29	10 49	16 25	22 1
	17	11 25 26	4 28	23 50	5 47	10 51	16 11	21 51
	23	11 27 35	4 43	0 0	5 12	10 12	15 55	21 38
	29	11 29 18	4 57	0 6	4 45	9 54	15 38	21 22
Agosto	4	o o 37	5 11	o 11	4 26	9 33	15 19	21 5
	10	o 1 36	5 23	o 15	4 19	9 13	14 59	20 45
	16	o 1 56	5 33	o 17	4 17	8 51	14 37	20 23
	22	o 1 53	5 41	o 16	4 27	8 28	14 14	20 0
	28	o 1 18	5 44	o 14	4 44	8 4	13 48	19 32
Settem.	3	o o 19	5 44	o 10	5 9	7 36	13 19	19 2
	9	11 28 57	5 37	o 5	5 35	7 11	12 51	18 31
	15	11 27 20	5 25	23 59	6 4	6 42	12 21	18 0
	21	11 25 37	5 7	23 52	6 27	6 14	11 51	17 28
	27	11 24 5	4 45	23 46	6 44	5 45	11 21	16 57
Ottobre	3	11 22 21	4 19	23 40	6 52	5 16	10 51	16 26
	9	11 21 30	3 50	23 35	6 49	4 48	10 24	16 0
	15	11 21 5	3 17	23 32	6 36	4 21	9 57	15 33
	21	11 20 59	2 54	23 30	6 10	3 54	9 32	15 10
	27	11 21 24	2 28	23 32	5 36	3 29	9 9	14 49
Novem.	2	11 22 14	2 3	23 35	4 52	3 6	8 49	14 32
	8	11 23 29	1 39	23 39	4 2	2 42	8 29	14 16
	14	11 25 5	1 19	23 44	3 4	2 20	8 11	14 2
	20	11 27 1	1 0	23 51	2 1	1 58	7 53	13 48
	26	11 29 14	0 43	23 59	0 52	1 37	7 37	13 37
Dicembre	2	o 1 40	0 29	o 8	o 20B	1 18	7 22	13 26
	8	o 4 18	0 15	o 17	1 35	0 59	7 9	13 19
	14	o 7 6	0 3	o 27	2 53	0 40	6 55	13 10
	20	o 10 5	0 8B	o 38	4 13	0 22	6 42	13 2
	26	o 13 11	0 17	o 49	5 34	0 3	6 29	12 55

POSIZIONI DI CERERE DI SEI IN SEI GIORNI.

		Longitu- dine.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Nascere.	Passaggio per merid.	Tramontare.
Marzo	1	7° 16' 29"	11° 38'	15° 9'	6° 10'	10° 54'	16° 32'	22° 10'
	7	7 16 51	11 25	15 10	6 5	10 31	16 10	21 49
	13	7 16 59	11 25	15 11	5 57	10 8	15 47	21 26
	19	7 16 50	11 34	15 10	5 46	9 43	15 23	21 3
	25	7 16 29	11 41	15 9	5 34	9 18	14 58	20 38
Aprile	31	7 15 52	11 44	15 7	5 20	8 51	14 32	20 13
	6	7 15 2	11 45	15 4	5 6	8 22	14 5	19 48
	12	7 14 1	11 43	15 0	4 51	7 54	13 37	19 20
	18	7 12 50	11 36	14 56	4 38	7 25	13 9	18 53
	24	7 11 32	11 24	14 51	4 26	6 55	12 41	18 27
Maggio	30	7 10 11	11 9	14 45	4 17	6 26	12 12	17 58
	6	7 8 52	10 49	14 40	4 11	5 56	11 43	17 30
	12	7 7 56	10 26	14 34	4 10	5 27	11 14	17 1
	18	7 6 24	9 59	14 30	4 14	4 59	10 46	16 33
	24	7 5 25	9 29	14 25	4 23	4 31	10 17	16 3
Giugno	30	7 4 36	8 58	14 21	4 37	4 6	9 50	15 34
	5	7 3 59	8 25	14 18	4 55	3 40	9 23	15 6
	11	7 3 38	7 54	14 17	5 17	3 15	8 57	14 39
	17	7 3 27	7 22	14 15	5 44	2 52	8 32	14 12
	23	7 3 32	6 52	14 15	6 14	2 30	8 8	13 46
	29	7 3 50	6 22	14 15	6 49	2 10	7 45	13 20

POSIZIONI DI PALLADE DI SEI IN SEI GIORNI.

		Longitu- dine.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Nascere.	Passaggio pel merid.	Tramon- tare.
Marzo	1	10° 15' 49"	25° 29'B	15 22	7° 52'B	10 9	16 45	23 21
	7	10 15 56	27 13	15 24	9 25	9 42	16 24	23 6
	13	10 15 47	28 58	15 26	11 13	9 12	16 2	22 52
	19	10 15 17	30 41	15 26	13 0	8 40	15 38	22 36
	25	10 14 54	32 22	15 26	14 46	8 9	15 14	22 19
Aprile	1	10 13 29	33 55	15 24	16 33	7 36	14 49	22 2
	6	10 12 12	35 22	15 22	18 14	7 1	14 23	21 45
	12	10 10 59	36 38	15 19	19 52	6 26	13 56	21 26
	18	10 8 58	37 45	15 15	21 19	5 52	13 29	21 6
	24	10 6 59	38 36	15 10	22 38	5 17	13 1	20 45
Maggio	1	10 5 37	39 15	15 5	25 43	4 42	12 32	20 22
	6	10 3 32	39 38	15 1	24 35	4 9	12 4	19 59
	12	10 1 53	39 51	14 56	25 14	3 57	11 35	19 33
	18	10 0 26	39 49	14 52	25 38	3 6	11 7	19 8
	24	9 29 11	39 38	14 47	25 50	2 37	10 39	18 41
Giugno	1	9 28 13	39 18	14 43	25 49	2 10	10 12	18 14
	5	9 27 50	38 52	14 40	25 38	1 44	9 45	17 46
	11	9 27 6	38 21	14 35	25 16	1 20	9 19	17 18
	17	9 26 58	37 46	14 36	24 46	0 58	8 54	16 50
	23	9 27 7	37 8	14 36	24 8	0 38	8 30	16 21
	29	9 27 30	36 28	14 36	23 25	0 18	8 6	15 54

POSIZIONI DI GIUNONE DI SEI IN SEI GIORNI.

		Longitu- dine.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Nascere.	Passaggio per merid.	Tramon- tare.
Giugno	5	11 5 15	9 ° 28B	22 14	0 48A	11 19	17 19	23 19
	11	11 6 15	9 30	22 17	0 23	10 57	16 59	23 1
	17	11 7 11	9 32	22 22	0 1	10 36	16 39	22 42
	23	11 7 55	9 33	22 24	0 16B	10 14	16 18	22 22
	29	11 8 27	9 34	22 26	0 28	9 51	15 56	22 1
Luglio	4	11 8 46	9 33	22 27	0 34	9 27	15 33	21 39
	10	11 8 52	9 29	22 28	0 33	9 4	15 10	21 16
	16	11 8 39	9 23	22 27	0 24	8 42	14 46	20 50
	22	11 8 17	9 15	22 26	0 7	8 19	14 21	20 23
	28	11 7 35	9 4	22 24	0 20A	7 53	13 55	19 57
Agosto	3	11 6 42	8 48	22 21	0 53	7 30	13 29	19 28
	9	11 5 36	8 26	22 17	1 36	7 6	13 2	18 58
	15	11 4 17	8 3	22 13	2 26	6 40	12 34	18 28
	21	11 3 52	7 33	22 9	3 26	6 17	12 6	17 55
	27	11 1 26	7 0	22 4	4 27	5 52	11 37	17 22
Settem.	3	10 29 56	6 23	22 0	5 33	5 28	11 9	16 50
	9	10 28 33	5 42	21 55	6 38	5 5	10 41	16 17
	15	10 27 18	5 1	21 51	7 43	4 42	10 14	15 46
	21	10 26 13	4 19	21 48	8 44	4 19	9 47	15 15
	27	10 25 25	3 35	21 47	9 41	3 58	9 21	14 44
Ottobre	2	10 24 52	2 53	21 45	10 32	3 37	8 56	14 15
	8	10 24 37	2 12	21 45	11 16	3 17	8 33	13 49
	14	10 24 35	1 32	21 46	11 53	2 57	8 10	13 23
	20	10 24 57	0 54	21 48	12 22	2 37	7 49	13 1
	26	10 25 32	0 19	21 51	12 43	2 18	7 28	12 38
Novem.	2	10 26 25	0 14A	21 55	12 56	2 0	7 9	12 18
	8	10 27 32	0 45	22 0	13 2	1 41	6 50	11 59
	14	10 28 51	1 14	22 6	13 1	1 23	6 32	11 41
	20	11 0 27	1 41	22 13	12 54	1 6	6 15	11 24
	26	11 2 13	2 6	22 21	12 42	0 49	5 59	11 9

POSIZIONI DI VESTA DI SEI IN SEI GIORNI.

		Longitu- due.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Nascere.	Passaggio pel merid.	Tramontare.
Luglio	5	0° 16' 19"	7° 7' A	1° 10'	0° 20A	12 15	18 17	0 19
	11	0 17 43	7 27	1 17	0 48	11 56	17 59	0 2
	17	0 19 6	7 47	1 22	0 16	11 38	17 42	23 46
	23	0 20 18	8 8	1 27	0 23	11 19	17 23	23 27
	29	0 21 19	8 30	1 31	0 25	10 59	17 3	23 7
Agosto	4	0 22 8	8 54	1 35	0 22	10 39	16 43	22 47
	10	0 22 40	9 17	1 38	0 13	10 19	16 22	22 25
	16	0 23 3	9 40	1 40	0 2A	9 57	16 0	22 3
	22	0 23 5	10 3	1 40	0 22	9 36	15 38	21 40
	28	0 22 54	10 27	1 40	0 48	9 14	15 14	21 14
Settem.	3	0 22 25	10 50	1 39	1 19	8 51	14 49	20 47
	9	0 21 41	11 10	1 37	1 54	8 28	14 23	20 18
	15	0 20 43	11 27	1 34	2 32	8 3	13 56	19 49
	21	0 19 30	11 41	1 30	3 11	7 38	13 28	19 18
	27	0 18 6	11 50	1 25	3 51	7 12	13 0	18 48
Ottobre	3	0 16 36	11 55	1 19	4 29	6 46	12 31	18 16
	9	0 15 3	11 55	1 13	5 4	6 19	12 2	17 45
	15	0 13 29	11 48	1 8	5 33	5 52	11 32	17 12
	21	0 11 5	11 38	1 3	5 56	5 24	11 3	16 42
	27	0 10 47	11 23	0 58	6 12	4 56	10 34	16 12
Novem.	2	0 9 45	11 5	0 54	6 19	4 30	10 7	15 44
	8	0 8 55	10 45	0 50	6 19	4 2	9 39	15 16
	14	0 8 22	10 22	0 47	6 11	3 36	9 14	14 52
	20	0 8 3	9 56	0 45	5 56	3 9	8 48	14 27
	26	0 8 5	9 31	0 45	5 34	2 44	8 24	14 4
Dicembre	2	0 8 15	9 8	0 45	5 6	2 17	8 0	13 43
	8	0 8 47	8 44	0 46	4 32	1 54	7 38	13 22
	14	0 9 31	8 22	0 48	3 54	1 29	7 16	13 5
	20	0 10 27	7 59	0 51	3 11	1 6	6 56	12 46
	26	0 11 33	7 37	0 54	2 26	0 41	6 35	12 29

POSIZIONI DI GIOVE IN DODICI GIORNI.

	Longitu- dine.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Nascere.	Passaggio pel merid.	Tramon- tare.
Gennaio	8 29 ° 31'	0 ° 15 B	17 58'	23 ° 15 A	18 58'	23 18'	27 38'
	12 9 2 9	0 12	18 10	23 15	18 22	22 42	27 2
	24 9 4 45	0 11	18 21	23 11	17 46	22 6	26 26
	5 9 7 16	0 10	18 32	23 5	17 9	21 30	25 51
Febbrajo	9 9 37	0 9	18 42	22 57	16 32	20 53	25 14
	1 9 11 46	0 8	18 51	22 48	15 51	20 14	24 37
	13 9 13 39	0 7	19 0	22 58	15 12	19 35	23 58
	25 9 15 14	0 6	19 6	22 29	14 30	18 55	23 20
Aprile	6 9 16 28	0 5	19 12	22 22	13 48	18 13	22 38
	18 9 17 18	0 3	19 15	22 17	13 4	17 29	21 54
	30 9 17 43	0 2	19 17	22 15	12 18	16 43	21 8
	12 9 17 42	0 1	19 17	22 17	11 31	15 56	20 21
Maggio	9 17 13	0 1	19 15	22 24	10 41	15 6	19 31
	5 9 16 20	0 4	19 11	22 31	9 52	14 15	18 38
	17 9 15 7	0 5	19 5	22 41	9 0	13 23	17 46
	29 9 13 40	0 6	18 59	22 52	8 7	12 29	16 51
Luglio	11 9 12 8	0 8	18 52	23 3	7 14	11 35	15 56
	23 9 10 41	0 10	18 46	23 12	6 21	10 41	15 1
	4 9 9 26	0 12	18 41	23 19	5 29	9 49	14 9
	16 9 8 35	0 13	18 37	23 24	4 58	8 58	13 18
Agosto	28 9 8 8	0 14	18 35	23 27	3 48	8 8	12 28
	9 9 8 4	0 14	18 35	23 28	3 2	7 21	11 40
	21 9 8 25	0 15	18 37	23 27	2 16	6 36	10 56
	3 9 9 16	0 16	18 41	23 24	1 32	5 52	10 12
Settemb.	15 9 10 33	0 17	18 46	23 19	0 50	5 10	9 30
	27 9 12 11	0 18	18 53	23 12	0 11	4 30	8 49
	8 9 14 5	0 19	19 2	23 1	23 30	3 51	8 12
	20 9 16 14	0 19	19 11	22 47	22 50	3 13	7 36
Ottobre	1 9 18 39	0 20	19 21	22 29	22 1	2 36	7 1
	14 9 21 13	0 21	19 51	22 7	21 53	2 0	6 27
	26 9 23 54	0 22	19 44	21 41	20 56	1 24	5 52

POSIZIONI DI SATURNO DI DODICI IN DODICI GIORNI.

		Longitu- dine.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declin- zione.	Nascere.	Passaggio pel merid.	Tramon- tare.
Gennaio	0	4° 17' 24"	1° 0B	9° 20'	16° 38B	7 25'	14 39'	21 53'
	12	4 16 36	1 2	9 17	16 54	6 33	13 49	21 5
	24	4 15 38	1 3	9 15	17 12	5 41	12 58	20 15
Febbrajo	5	4 14 39	1 5	9 9	17 30	4 49	12 7	19 25
	17	4 13 41	1 5	9 6	17 48	3 56	11 16	18 36
Marzo	1	4 12 49	1 6	9 2	18 3	3 4	10 25	17 45
	13	4 12 6	1 6	8 59	18 16	2 13	9 35	16 57
	25	4 11 35	1 6	8 57	18 24	1 24	8 46	16 8
Aprile	6	4 11 18	1 6	8 56	18 28	0 34	7 57	15 26
	18	4 11 18	1 6	8 56	18 28	23 47	7 10	14 33
Maggio	30	4 11 34	1 6	8 57	18 23	23 2	6 24	13 46
	12	4 12 4	1 5	8 59	18 14	22 17	5 39	13 1
	24	4 12 48	1 5	9 2	18 1	21 33	4 54	12 15
Giugno	5	4 13 43	1 5	9 6	17 45	20 52	4 11	11 30
	17	4 14 48	1 5	9 10	17 26	20 10	3 28	10 46
Luglio	29	4 16 3	1 5	9 15	17 3	19 29	2 45	10 1
	11	4 17 25	1 5	9 21	16 39	18 50	2 4	9 18
	23	4 18 51	1 5	9 27	16 12	18 10	1 22	8 34
Agosto	4	4 20 22	1 6	9 33	15 44	17 31	0 41	7 51
	16	4 21 54	1 7	9 39	15 16	16 51	23 59	7 7
Settemb.	28	4 23 26	1 7	9 45	14 47	16 13	23 18	6 23
	9	4 24 55	1 9	9 50	14 18	15 34	22 37	5 40
	21	4 26 20	1 10	9 56	13 51	14 53	21 55	4 57
Ottobre	3	4 27 40	1 12	10 1	13 25	14 14	21 13	4 12
	15	4 28 52	1 14	10 6	13 2	13 32	20 30	3 28
Novemb.	27	4 29 55	1 16	10 10	12 43	12 51	19 47	2 43
	8	5 0 44	1 19	10 13	12 27	12 8	19 3	1 58
	20	5 1 21	1 21	10 15	12 17	11 23	18 18	1 13
Dicemb.	2	5 1 43	1 24	10 17	12 12	10 38	17 32	0 26
	14	5 1 49	1 27	10 17	12 12	9 51	16 45	23 39
	26	5 1 46	1 30	10 17	12 19	9 2	15 57	22 52

POSIZIONI DI URANO DI DODICI IN DODICI GIORNI.

		Longitu- dine.	Latitudine.	Ascensione retta.	Declina- zione.	Nascere.	Passaggio per merid.	Tramon- tare.
Gennajo	0	10° 4' 55"	0° 35A	20 30	19° 37A	21 11	1 49	6 27
	12	10 5 35	0 35	20 33	19 27	20 26	1 5	5 44
	24	10 6 17	0 35	20 35	19 17	19 40	0 20	5 0
Febbrajo	5	10 6 59	0 35	20 38	19 6	18 55	23 36	4 17
	17	10 7 41	0 36	20 41	18 56	18 10	22 52	3 34
Marzo	1	10 8 19	0 36	20 44	18 46	17 24	22 7	2 50
	13	10 8 53	0 36	20 46	18 37	16 39	21 22	2 5
	25	10 9 19	0 36	20 48	18 29	15 53	20 37	1 21
Aprile	6	10 9 45	0 37	20 50	18 23	15 6	19 51	0 36
	18	10 10 10	0 37	20 51	18 18	14 20	19 5	23 50
Maggio	30	10 10 21	0 38	20 52	18 16	13 34	18 19	23 4
	12	10 10 27	0 38	20 52	18 15	12 47	17 32	22 17
	24	10 10 22	0 38	20 52	18 16	11 59	16 44	21 29
Giugno	5	10 10 15	0 39	20 52	18 18	11 11	15 56	20 41
	17	10 10 2	0 39	20 51	18 23	10 23	15 8	19 53
Luglio	29	10 9 44	0 40	20 49	18 29	9 35	14 19	19 3
	11	10 9 16	0 40	20 48	18 36	8 47	13 30	18 13
	23	10 8 48	0 40	20 46	18 43	7 58	12 41	17 24
Agosto	4	10 8 20	0 40	20 44	18 51	7 9	11 52	16 35
	16	10 7 55	0 40	20 42	18 58	6 21	11 3	15 45
Settemb.	28	10 7 29	0 40	20 40	19 4	5 31	10 13	14 55
	9	10 7 4	0 40	20 39	19 10	4 44	9 25	14 6
	21	10 6 46	0 39	20 37	19 14	3 55	8 36	13 17
Ottobre.	3	10 6 36	0 39	20 37	19 16	3 8	7 48	12 28
	15	10 6 31	0 39	20 36	19 17	2 21	7 1	11 41
Novemb.	27	10 6 35	0 39	20 37	19 16	1 33	6 13	10 53
	8	10 6 44	0 38	20 37	19 13	0 46	5 27	10 8
	20	10 7 2	0 38	20 39	19 8	0 0	4 41	9 22
Dicemb.	2	10 7 25	0 38	20 40	19 2	23 13	3 55	8 37
	14	10 7 55	0 38	20 42	18 54	22 28	3 10	7 52
	26	10 8 29	0 37	20 45	18 45	21 42	2 25	7 8

*Ascensioni rette delle 36 Stelle principali
tratte dal catalogo compilato dal signor Baily
(Memoirs of the astronomical society of London, vol. II-Append.).*

STELLE.	Asc. retta 1 gen. 1830.	Log. a	Log. b	Log. c	Log. d
γ Pegaso.	0 4 29,36	+ 8,8374	+ " 1294	+ 0,4878	+ 8,2282
α Ariete.	1 57 36,12	+ 8,7989	+ 8,5498	+ 0,5240	+ 8,3846
α Balena.	2 53 23,90	+ 8,6863	+ 8,6613	+ 0,4945	+ 7,4617
α Toro.	4 26 10,09	+ 8,4414	+ 8,8040	+ 0,5344	+ 7,8860
α Auriga.	5 4 8,31	+ 8,3633	+ 8,9677	+ 0,6437	+ 8,2189
β Orione.	5 6 22,15	+ 8,1959	+ 8,8166	+ 0,4588	- 7,3587
β Toro.	5 15 52,97	+ 8,1648	+ 8,8716	+ 0,5775	+ 7,8428
α Orione.	5 45 58,18	+ 7,6141	+ 8,8267	+ 0,5106	+ 6,7221
α Cane magg.	6 37 59,27	- 8,0558	+ 8,8363	+ 0,4222	+ 7,5089
α Gemelli seg.	7 23 44,29	- 8,4497	+ 8,8670	+ 0,5861	- 8,1770
α Cane min.	7 30 23,85	- 8,4107	+ 8,7913	+ 0,4973	- 7,4043
β Gemelli.	7 34 53,78	- 8,4843	+ 8,8414	+ 0,5661	- 8,1620
α Idra.	9 19 15,69	- 8,7111	+ 8,6579	+ 0,4695	+ 7,8506
α Leone.	9 59 18,29	- 8,7716	+ 8,5361	+ 0,5079	- 8,1169
β Leone.	11 40 22,77	- 8,8385	+ 7,7721	+ 0,4863	- 8,2660
β Vergine.	11 41 50,18	- 8,8230	+ 7,7250	+ 0,4947	- 7,4998
α Vergine.	13 16 14,71	- 8,8064	- 8,5449	+ 0,4979	+ 8,0576
α Boote.	14 7 54,29	- 8,7797	- 8,5750	+ 0,4364	- 8,3152
1 α Idra.	14 41 17,78	- 8,7217	- 8,6505	+ 0,5191	+ 8,1427
2 α Idra.	14 41 29,50	- 8,7215	- 8,6510	+ 0,5192	+ 8,1437
α Corona.	15 27 29,10	- 8,6658	- 8,7709	+ 0,4024	- 8,3271
α Serpente.	15 35 55,90	- 8,5966	- 8,7549	+ 0,4677	- 7,6805
α Scorpione.	16 19 0,03	- 8,5004	- 8,8268	+ 0,5633	+ 8,1430
α Ercole.	17 6 53,56	- 8,1992	- 8,8264	+ 0,4361	- 7,6005
α Ophioco.	17 27 2,45	- 7,9909	- 8,8501	+ 0,4425	- 7,3328
α Lira.	18 31 10,77	+ 8,0655	- 8,9271	+ 0,5032	+ 7,8589
γ Aquila.	19 38 10,59	+ 8,4493	- 8,7897	+ 0,4547	+ 7,6977
α Aquila.	19 42 29,19	+ 8,4645	- 8,7837	+ 0,4659	+ 7,6305
β Aquila.	19 46 57,66	+ 8,4794	- 8,7772	+ 0,4688	+ 7,4979
1 α Capricorno.	20 8 13,02	+ 8,5601	- 8,7634	+ 0,5224	- 7,9150
2 α Capricorno.	20 8 36,98	+ 8,5614	- 8,7630	+ 0,5225	- 7,9155
α Cigno.	20 35 37,89	+ 8,7700	- 8,8631	+ 0,5096	+ 8,6170
α Acquario.	21 57 2,88	+ 8,7582	- 8,5325	+ 0,4888	- 7,9575
α Pesce austr.	22 48 14,54	+ 8,8670	- 8,5773	+ 0,5199	- 8,5728
α Pegaso.	22 56 17,71	+ 8,8206	- 8,2759	+ 0,4754	+ 8,2131
α Andromeda.	23 59 36,59	+ 8,8786	- 6,1095	+ 0,4867	+ 8,5524

La posizione vera delle stelle pel tempo t dopo il primo gennajo 1830
si ha aggiungendo alla posizione media

la quantità $aA + bB + cC + dD$ per l'ascensione retta

e la quantità $a'A + b'B + c'C + d'D$ per la declinazione.

Declinazioni delle 36 Stelle principali:
tratte dal catalogo compilato dal signor Baily
(Memoirs of the astronomical society of London).


STELLE.	Declinazione 1 genn. 1830.	Log. <i>a'</i>	Log. <i>b'</i>	Log. <i>c'</i>	Log. <i>d'</i>
γ Pegaso.	+ 14 14 18,11	+ 9,6191	+ "	+ 1,3019	- 8,2919
α Ariete.	+ 22 39 18,46	+ 9,3263	+ 9,5258	+ 1,2421	- 9,6910
α Balena.	+ 3 25 5,05	+ 9,5933	+ 8,6370	+ 1,1636	- 9,8366
α Toro.	+ 16 9 40,31	+ 9,2095	+ 9,0445	+ 0,9019	- 9,9625
α Auriga.	+ 45 48 52,30	- 9,5955	+ 9,2382	+ 0,6846	- 9,9870
β Orione.	- 8 24 14,69	+ 9,7566	- 8,5301	+ 0,6672	- 9,9880
β Toro.	+ 28 27 17,96	- 8,9345	+ 8,9630	+ 0,5869	- 9,9918
α Orione.	+ 7 22 4,13	+ 9,4800	+ 7,8946	+ 0,0886	- 9,9992
α Cane magg.	- 16 29 18,74	+ 9,8426	+ 8,6667	- 0,6452	- 9,9941
α Gemelli seg.	+ 32 15 10,87	- 9,1173	- 9,2803	- 0,8550	- 9,9703
α Cane min.	+ 5 39 19,89	+ 9,5328	- 8,5783	- 0,9386	- 9,9653
β Gemelli.	+ 28 25 45,27	- 8,7324	- 9,2823	- 0,9065	- 9,9617
α Idra.	- 7 55 30,78	+ 9,7152	+ 9,0225	- 1,1850	- 9,8098
α Leone.	+ 12 47 44,83	+ 9,4942	- 9,2821	- 1,2387	- 9,7012
β Leone.	+ 15 31 24,30	+ 9,5966	- 9,4259	- 1,3004	- 8,9320
β Vergine.	+ 2 43 22,36	+ 9,6335	- 8,6754	- 1,3006	- 8,8986
α Vergine.	- 10 16 13,13	+ 9,5670	+ 9,2266	- 1,2775	+ 9,5140
α Boote.	+ 20 4 19,19	+ 9,7709	- 9,4641	- 1,2779	+ 9,7239
α Idra.	- 15 17 2,90	+ 9,3945	+ 9,3031	- 1,1841	+ 9,8110
α Idra.	- 15 19 43,73	+ 9,3945	+ 9,3041	- 1,1838	+ 9,8114
α Corona.	+ 27 17 35,27	+ 9,8733	- 9,4520	- 1,0925	+ 9,8958
α Serpente.	+ 6 58 1,03	+ 9,7235	- 8,8533	- 1,0714	+ 9,9978
α Scorpione.	- 26 2 44,15	- 7,8451	+ 9,2725	- 0,9319	+ 9,9564
α Ercole.	+ 14 35 31,51	+ 9,8228	- 8,7624	- 0,6630	+ 9,9882
α Otiuco.	+ 12 41 31,36	+ 9,8062	- 8,4981	- 0,4582	+ 9,9955
α Lira.	+ 38 37 50,34	+ 9,9814	+ 8,9277	+ 0,4343	+ 9,9960
γ Aquila.	+ 19 13 21,03	+ 9,7694	+ 8,8669	+ 0,9204	+ 9,9589
α Aquila.	+ 8 25 57,19	+ 9,7490	+ 8,8019	+ 0,9379	+ 9,9550
β Aquila.	+ 5 59 21,55	+ 9,7118	+ 8,6716	+ 0,9283	+ 9,9509
α Capric.	- 13 1 31,41	+ 9,3655	- 9,0778	+ 1,0268	+ 9,9282
α Capric.	- 13 3 49,43	+ 9,3655	- 9,0802	+ 1,0280	+ 9,9277
α Cigno.	+ 44 40 37,75	+ 9,9325	+ 9,6450	+ 1,1000	+ 9,8911
α Aquario.	- 1 8 28,69	+ 9,6274	- 8,2335	+ 1,2362	+ 9,7085
α Pesci aust.	- 30 31 13,88	+ 9,3385	- 9,6841	+ 1,2803	+ 9,4886
α Pegaso.	+ 14 17 36,66	+ 9,6893	+ 9,3755	+ 1,2850	+ 9,4384
α Androm.	+ 28 9 6,65	+ 9,5843	+ 9,6738	+ 1,3020	+ 7,2309

Le quantità *A*, *B*, *C*, *D* che entrano nelle formole della pagina precedente sono

$$A = -18''677 \cos \Theta, \quad C = t - 0,025 \sin 2\Theta + 0,344 \sin \theta \delta + 0,004 \sin 2\delta \theta$$

$$B = -20,360 \sin \Theta, \quad D = -9'',545 \cos 2\Theta - 9'',250 \cos \theta \delta + 0'',090 \cos 2\delta \theta$$

**APPENDICE
ALLE EFFEMERIDI
DELL' ANNO 1830.**



NOTA SULL'INTERPOLAZIONE

DEI LUOGHI DELLA LUNA

DI

BARNABA ORIANI.

Fra le notizie astronomiche che si pubblicano ad Altona dal chiarissimo professore Schumacher si trova descritto un nuovo metodo per calcolare preventivamente le occultazioni delle stelle dietro la Luna del celebre professore Bessel, astronomo di Konisberga (*). In questo metodo si accenna una formula d'interpolazione, colla quale dalle ascensioni rette e declinazioni della Luna calcolate nelle Effemeridi di dodici in dodici ore, cioè a mezzodì ed a mezzanotte di ciascun giorno, si può facilmente ottenere l'ascensione retta e la declinazione della Luna in tutte le ore intermedie.

Le nostre Effemeridi contengono le longitudini e latitudini della Luna calcolate a mezzodì ed a mezzanotte d'ogni giorno, e la stessa formula d'interpolazione darebbe le longitudini e latitudini nelle ore intermedie. Gioverà pertanto indicare in qual modo essa si può dedurre da un'altra formula conosciuta e posta nelle antiche nostre Effemeridi.

Sieno A , A_1 , A_2 , A_3 , ecc. i termini esprimenti le longitudini, o latitudini, o ascensioni rette, o declinazioni della Luna calcolate ad eguali intervalli di tempo, e d' , d'' , d''' , ecc. le rispettive differenze prime, seconde, terze, ecc.

(*) V. Astronomische Nachrichten herausgegeben von Ritter und Professor H. C. Schumacher. VII Band, n.^o 145.

A

<i>A</i>	<i>d</i>			
<i>A</i> ₁		<i>d''</i>		
	<i>d'</i>		<i>d'''</i>	
<i>A</i> ₂		<i>d''</i>		<i>d'''</i>
	<i>d'</i>		<i>d'''</i>	
<i>A</i> ₃		<i>Δ''</i>		<i>Δ'''</i>
	<i>d'</i>		<i>d'''</i>	
<i>A</i> ₄		<i>d''</i>		
	<i>d'</i>			
<i>A</i> ₅				

Un termine da interpolarsi fra A_2 ed A_3 corrispondente al tempo $= t$ trascorso dopo l'istante in cui ebbe luogo A_2 , usando le differenze δ' , δ'' , δ''' , δ'''' , ecc., si otterrà dalla citata formola (*), cioè

$$A_2 + t\delta' + \frac{t(t-1)}{2}\delta'' + \frac{t(t-1)(t+1)}{2 \cdot 3}\delta''' + \frac{t(t-1)(t+1)(t-2)}{2 \cdot 3 \cdot 4}\delta'''' + \text{ecc.}$$

Da questa se ne può ricavare un'altra coll'introdurre le differenze Δ'' , Δ''' , Δ'''' , ecc. in vece di δ'' , δ''' , δ'''' , ecc., poichè essendo

$$\begin{aligned} A_2 &= A_3 - \delta' \\ \delta'' &= \Delta'' - \delta''' \\ \delta''' &= \Delta''' - \delta'''' \\ \delta'''' &= \Delta'''' - \delta''''' \text{ ecc.} \end{aligned}$$

(*) *V. Ephemerides astronomicae Mediolanenses ad annum 1778*, pag. 218.

colla sostituzione di questi valori si ottiene

$$A_3 + (t-1)\delta' + \frac{t(t-1)}{2} \Delta'' + \frac{t(t-1)(t-2)}{2 \cdot 3} \delta''' + \frac{t(t-1)(t-2)(t+1)}{2 \cdot 3 \cdot 4} \Delta'''' + \text{ecc.}$$

Qualora si voglia prendere l'origine del tempo x nella metà dell'intervallo compreso fra il tempo di A_2 e quello di A_3 , si dovrà fare $t = x + \frac{1}{2}$, e le due precedenti formole diventeranno

$$A_2 + (x + \frac{1}{2})\delta' + \frac{(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})}{2} \delta'' + \frac{(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})(x + \frac{3}{2})}{2 \cdot 3} \delta'''$$

$$+ \frac{(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})(x + \frac{3}{2})(x - \frac{3}{2})}{2 \cdot 3 \cdot 4} \delta'''' + \text{ecc.}$$

$$A_3 + (x - \frac{1}{2})\delta' + \frac{(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{2})}{2} \Delta'' + \frac{(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})}{2 \cdot 3} \Delta''''$$

$$+ \frac{(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})(x + \frac{3}{2})}{2 \cdot 3 \cdot 4} \Delta'''' + \text{ecc.}$$

Siccome tanto l'una che l'altra formola esprime lo stesso termine da interpolarsi fra A_2 ed A_3 , egli è evidente che la loro semisomma ci darà una terza espressione del medesimo termine, la quale sarà

$$\frac{A_2 + A_3}{2} + x\delta' + \frac{(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{2})}{2} \left(\frac{\delta'' + \Delta''}{2} \right) + \frac{x(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{2})}{2 \cdot 3} \delta'''$$

$$+ \frac{(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})(x + \frac{3}{2})}{2 \cdot 3 \cdot 4} \left(\frac{\delta'''' + \Delta''''}{2} \right)$$

$$+ \frac{x(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2})(x + \frac{3}{2})}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} \delta'''' + \text{ecc.}$$

L'intervallo di tempo fra i termini dati A , A_1 , A_2 , A_3 , ecc. è per ipotesi costante, ma tuttora indeterminato; nel caso delle Effemeridi astronomiche, ove si registrano le longitudini e le

latitudini o le ascensioni rette e declinazioni della Luna a mezzodì ed a mezzanotte di ciascun giorno, il detto intervallo è di dodici ore. Facciasi pertanto nell'ultima formola $x = \frac{N}{12}$, e pongasi per brevità

$$X = \frac{N}{12}$$

$$X' = \frac{N^2 - 6^2}{2 \cdot 12^2}$$

$$X'' = \frac{N^3 - 6^2 N}{2 \cdot 3 \cdot 12^3}$$

$$X''' = \frac{N^4 - 10 \cdot 6^2 N^2 + 3^2 \cdot 6^4}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 12^4} \text{ ecc.}$$

$$A_2 + A_3 = 2a$$

$$\delta' = b$$

$$\delta'' + \Delta'' = 2c$$

$$\delta''' = d$$

$$\delta'''' + \Delta'''' = 2e \text{ ecc.}$$

Si avrà il termine da interpolarsi per l'ora N dalla formola

$$a + X \cdot b + X' \cdot c + X'' \cdot d + X''' \cdot e + \text{ecc.}$$

La quale è appunto la formola d'interpolazione del professore Bessel. Per facilitare il calcolo dei diversi termini egli ha dato una tavola dei logaritmi de' coefficienti X, X', X'', X''' per ognuna delle ore sedici comprese fra

$$N = -8^{\text{h}} \text{ e } N = +8^{\text{h}}$$

Nel caso però che non si avesse la tavola dei valori di $X, X', X'', \text{ ecc.}$, torna più comoda l'interpolazione colla prima formola. In fatti ponendo $t = \frac{N}{12}$, essa ci dà

$$\begin{aligned}
 A_4 + \left(\delta' - \frac{1}{2} \delta'' - \frac{1}{6} \delta''' + \frac{1}{12} \delta'''' + \text{ecc.} \right) \frac{N}{12} \\
 + \frac{1}{2} \left(\delta'' - \frac{1}{12} \delta'''' + \text{ecc.} \right) \left(\frac{N}{12} \right)^2 \\
 + \frac{1}{2 \cdot 3} \left(\delta''' - \frac{1}{2} \delta'''' - \text{ecc.} \right) \left(\frac{N}{12} \right)^3 \\
 + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} (\delta'''' - \text{ecc.}) \left(\frac{N}{12} \right)^4.
 \end{aligned}$$

Nell'esempio recato dal professore Bessel essendo

$$\begin{aligned}
 A_4 &= 165^\circ 17' 48'',7 \\
 \delta' &= 5 42 26,0 \\
 \delta'' &= - 3 29,8 \\
 \delta''' &= 57,2 \\
 \delta'''' &= 1,7
 \end{aligned}$$

si avrà per qualunque ora N dopo il mezzodì in Berlino del 5 aprile 1830 l'ascensione retta della Luna

$$165^\circ 17' 48'',7 + 20641'',5 \frac{N}{12} - 104'',97 \left(\frac{N}{12} \right)^2 + 9'',39 \left(\frac{N}{12} \right)^3 + 0'',07 \left(\frac{N}{12} \right)^4.$$

Ed in particolare si trova per l'ora

N	Ascens. retta della Luna.
5	167° 40' 51,8
6	168 9 24,4
7	168 37 55,7

come ha trovato il professore Bessel.

Se si volesse l'ascensione retta della Luna non per un'ora intera, ma per un'ora, minuti e secondi, a cagione d'esempio

per $7^h 16' 30''$ dopo mezzodì del 5 aprile 1830, si farebbe
 $N = 7^h 16' 30'' = 7,275$ e $\log. \frac{N}{12} = 9,7826518$, e si tro-
 verebbe subito

$$165^\circ 17' 48'',7 + 3^\circ 28' 33'',9 - 38'',6 + 2'',1 = 168^\circ 45' 46'',1$$

ascensione retta cercata.

Il calcolo della terza formola, anche mediante la tavola dei valori di X , X' , X'' , ecc., deve riuscire in quest'ultimo esempio meno spedito. Noteremo per ultimo che la stessa terza formola fu dall'immortale Lagrange accennata nelle Efemeridi astronomiche di Berlino per l'anno 1783, ed anteriormente nelle Memorie dell'Accademia Reale delle scienze di Berlino per l'anno 1758 fu illustrata dall'inglese geometra Walmsley con alcuni esempi.

OBBLIQUITÀ DELL' ECLITTICA

DEDOTTA DALLE OSSERVAZIONI SOLSTIZIALI

DI

BARNABA ORIANI.

Le osservazioni delle distanze meridiane dallo zenith del Sole fatte col cerchio moltiplicatore di tre piedi in diametro cominciarono sul fine dell' anno 1810, e quelle vicine ai solstizj successivamente calcolate per dedurne l' obliquità dell' eclittica furono pubblicate nelle nostre Effemeridi degli anni 1816, 1821 e 1826. Ora daremo quelle fatte negli anni 1825, 1826, 1827, 1828 e 1829, e si compirà coi due ultimi solstizj, cioè jemale del 1828 ed estivo del 1829, il periodo di diciotto anni e mezzo, nel quale si fa prossimamente un' intera rivoluzione dei nodi dell' orbita lunare; e siccome la principale ineguaglianza nella obliquità dell' eclittica dipende dalla nutazione lunare, ossia dalla longitudine del nodo ascendente della Luna, confrontando l' obliquità osservata nel solstizio jemale del 1828 e nel solstizio estivo del 1829 rispettivamente coll' obliquità del solstizio jemale del 1810 e del solstizio estivo del 1811, potremo ottenere l' obliquità media e la sua diminuzione annua.

Le seguenti osservazioni comprendono cinque solstizj estivi e quattro jemali. Il solstizio jemale dell' anno 1825, per l' inclemenza della stagione, è appoggiato solamente a quattro osservazioni; negli altri otto solstizj le osservazioni sono più

numerose. Il tempo di ciascuna osservazione è notato ad un orologio posto vicino al cerchio, e che va sensibilmente a tempo sidereo; vi si nota pure ogni giorno l'istante del vero mezzodì. Nel barometro si segna l'altezza del mercurio in pollici e linee del piede francese; il termometro interno attaccato al barometro segna i gradi di calore sulla scala detta di Réaumur, ed il termometro esterno posto vicino all'obiettivo del cannocchiale del cerchio ha i gradi di calore sulla scala di Fahrenheit. Gli archi di distanza dallo zenith osservati sul nostro cerchio moltiplicatore sono espressi in gradi decimali, quattrocento dei quali comprendono l'intera circonferenza e sono segnati colla lettera g.

DISTANZE DEL SOLE DALLO ZENIT PRESSO IL MERIDIANO

OSSErvATE

CON UN CERCHIO MOLTIPLICATORE DI TRE PIEDI DI DIAMETRO.

6 giugno 1825.

Sole mal terminato, tremolante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
4 ^h 49' 55"		
50 41		
51 29		
52 17	4	101 ⁶ ,3404
54 1		
54 54		
55 39		
56 28	8	202,7276

4 52 34,8 Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 6¹,4. Termom. R. + 16[°],1.
 Termometro esterno Fahr. 70.

8 giugno 1825.

Sole nelle nuvole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
4 ^h 57' 31"		
58 18		
59 5		
59 44	4	
5 1 15		
2 2		
2 49		
3 27	8	200,9915

5 0 47,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,1. Termom. R. + 18[°],1.
 Termometro esterno Fahr. 74.

7 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
4 ^h 54' 7"		
54 56		
55 34		
56 10	4	100 ⁶ ,90775
58 4		
58 44		
59 31		
5 0 18	8	201,83175

4 56 41,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,2. Termom. R. + 17[°],4.
 Termometro esterno Fahr. 75.

9 giugno.

Sole interrotto dalle nuvole.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 1' 54"		
2 34		
3 21		
4 3	4	100 ⁶ ,1046
5 34		
6 16		
6 57		
7 56	8	200,2086

5 4 54,4. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,2. Termom. R. + 19[°],1.
 Termometro esterno Fahr. 78.

10 giugno 1825.

Sole tremolante e fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 6' 39"		
7 29		
8 10		
8 50	4	99 ⁸ ,7379
10 13		
11 1		
11 43		
12 33	8	199 ,4902

5 9 1,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,5. Termom. R. + 19°,5.
 Termometro esterno Fahr. 81.

11 giugno.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 9' 18"		
10 8		
10 53		
11 44	4	99 ⁸ ,43555
13 17		
14 9		
14 53		
15 39	8	198 ,84513

5 13 9,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,3. Termom. R. + 21°,3.
 Termometro esterno Fahr. 83.

12 giugno.

Sole nelle nuvole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 13' 15"		
14 7		
14 49		
15 39	4	99 ⁸ ,1428
17 13		
17 57		
18 35		
19 26	8	198 ,2508

5 17 16,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,9. Termom. R. + 20°,1.
 Termometro esterno Fahr. 79.

13 giugno 1825.

Sole mal terminato nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 18' 13"		
18 58		
19 51		
20 42	4	98 ⁸ ,85115
22 7		
22 58		
24 0		
24 49	8	197 ,7068

5 21 24,4. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,6. Termom. R. + 20°,1.
 Termometro esterno Fahr. 82.

14 giugno.

Sole mal terminato nelle nuvole.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 23' 2"		
23 42		
24 28		
25 10	4	98 ⁸ ,60725
26 42		
27 18	6	147 ,9090

5 25 32,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,3. Termom. R. + 19°,9.
 Termometro esterno Fahr. 79.

15 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 30' 14"		
31 4		
31 48		
32 33	4	98 ⁸ ,2380
34 3		
34 45		
35 30		
36 14	8	196 ,4562

5 33 48,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,6. Termom. R. + 22°,9.
 Termometro esterno Fahr. 88.

17 giugno 1825.

Sole tremolante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 34' 18"		
35	1	
35 49		
36 33	4	98°,0940
38 3		
38 47		
39 38		
40 23	8	196 ,1643

5 37 56,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,0. Termom. R. + 21°,1.
 Termometro esterno Fahr. 83.

18 giugno.

Sole un poco tremolante.

5 ^h 39' 11"		
39 55		
40 39		
41 21	4	97°,9633
42 55		
43 36		
44 32		
45 22	8	195 ,93013

5 42 5,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,3. Termom. R. + 22°,0.
 Termometro esterno Fahr. 84.

19 giugno.

Sole un poco agitato.

5 ^h 42' 27"		
43 9		
43 59		
44 46	4	97°,89415
46 34		
47 17		
48 8		
48 49	8	195 ,76503

5 46 13,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,7. Termom. R. + 21°,2.
 Termometro esterno Fahr. 83.

21 giugno 1825.

Sole nelle nuvole appena visibile.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 52' 52"		
55 47		
56 46		
57 22	4	97°,8011

5 54 31,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 4¹,7. Termom. R. + 19°,0.
 Termometro esterno Fahr. 77.

22 giugno.

Sole interrotto dalle nuvole.

5 ^h 56' 41"		
57 22		
58 3		
58 42	4	97°,7935
6 0 5		
0 50		
1 29		
2 7	8	195 ,60425

5 58 39,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 6¹,8. Termom. R. + 18°,7.
 Termometro esterno Fahr. 76.

23 giugno.

Sole ben terminato.

5 ^h 59' 5"		
59 52		
6 0 46		
1 32	4	97°,85002
3 17		
4 3		
4 57		
5 49	8	195 ,68614

6 2 48,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,7. Termom. R. + 19°,2.
 Termometro esterno Fahr. 79.

24 giugno 1825.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 3' 29"		
4 18		
5 48		
6 33	4	97 ^g ,91155
8 14		
9 0		
9 48		
10 37	8	195 ,8280

6 6 56,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,8. Termom. R. + 19°,0.
 Termometro esterno Fahr. 79.

25 giugno.

Sole ben terminato.

6 ^h	7' 45"		
8 28			
9 9			
9 51	4	98 ^g ,01056	
11 28			
12 11			
12 52			
13 31	8	196 ,0063	

6 11 4,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,6. Termom. R. + 20°,1.
 Termometro esterno Fahr. 83.

26 giugno.

Sole interrotto dalle nuvole,

mal terminato.

6 ^h	11' 50"		
12 49			
13 27			
23 28	4	98 ^g ,2097	

6 15 12,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,0. Termom. R. + 20°,5.
 Termometro esterno Fahr. 81.

27 giugno 1825.

Sole nelle nuvole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 16' 17"		
17 5		
17 53		
18 39	4	98 ^g ,2885
20 18		
21 3		
21 55		
24 11	8	196 ,5934

6 19 20,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,3. Termom. R. + 20°,7.
 Termometro esterno Fahr. 83.

28 giugno.

Sole mal terminato, tremolante.

6 ^h	20' 15"		
21 12			
21 58			
22 39	4	98 ^g ,4855	
24 10			
24 52			
25 46			
26 28	8	196 ,9635	

6 23 28,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,6. Termom. R. + 21°,7.
 Termometro esterno Fahr. 85.

29 giugno.

Sole ben terminata.

6 ^h	24' 31"		
25 12			
25 57			
26 40	4	98 ^g ,7031	
28 14			
28 53			
29 39			
30 19	8	197 ,3962	

6 27 36,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,6. Termom. R. + 21°,5.
 Termometro esterno Fahr. 86.

30 giugno 1825.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 28' 34"		
29 19		
30 6		
30 52	4	98°,9536
32 19		
33 1		
33 49		
34 38	8	197 ,8986

6 31 43,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,0. Termom. R. + 20°,1.
 Termometro esterno Fahr. 81.

6 luglio 1825.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 52' 57"		
53 42		
54 26		
55 10	4	
56 31		
57 15		
57 57		
58 36	8	101°,08195

6 56 22,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8,1. Termom. R. + 19°,8.
 Termometro esterno Fahr. 78.

3 luglio.

Sole ben terminato.

6 ^h 41' 1"		
41 40		
42 27		
43 8	4	99°,87685
44 50		
45 36		
46 19		
46 58	8	199 ,7537

6 44 4,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,1.2. Termom. R. + 21°,1.
 Termometro esterno Fahr. 88.

7 luglio.

Sole nelle nuvole appena visibile.

6 ^h 57' 8"		
59 24		
7 0 15		
7 3 36	4	101°,5346

7 0 27,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,1.2. Termom. R. + 18°,0.
 Termometro esterno Fahr. 75.

5 luglio.

Sole ben terminato.

6 ^h 48' 52"		
49 47		
50 29		
51 11	4	100°,6513
52 43		
53 28		
54 14		
54 56	8	201 ,8854

6 52 16,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,1.5. Termom. R. + 20°,0.
 Termometro esterno Fahr. 78.

9 luglio.

Sole ben terminato.

7 ^h 5' 40"		
6 27		
7 15		
7 55	4	102°,5292
9 34		
10 17		
11 2		
11 42	8	205 ,0597

7 8 38,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 6,1.3. Termom. R. + 17°,3.
 Termometro esterno Fahr. 74.

25 dicembre 1825.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 23' 28"		
24 18		
25 7		
25 59		
26 45		
27 40	6	4585,97206
29 9		
29 53		
30 49		
31 32	10	764,95988

18 27 17,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 81,2. Termom. R. + 7°,7.
 Termometro esterno Fahr. 55.

26 dicembre.

Sole sfumato e raggiante.

18 ^h	28'	19"		
28	52			
29	55			
30	59			
32	16			
32	59			
34	1			
34	46			
		8	611,69836	

18 31 48,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 51,4. Termom. R. + 7°,6.
 Termometro esterno Fahr. 54.

2 gennajo 1826.

Sole ben terminato.

18 ^h	59'	13"		
19	59	55		
0	48			
1	39		4	3038,9285
3	12			
3	58			
4	57			
5	43		8	607,8420

19 3 23,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10,0. Termom. R. + 1°,6.
 Termometro esterno Fahr. 41.

3 gennajo 1826.

Sole mal terminato nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
19 ^h 4' 4"		
4 53		
5 46		
6 38	4	3038,5125
8 21		
9 8		
9 59		
10 50	8	607,0154

19 7 52,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 91,1. Termom. R. + 0°,6.
 Termometro esterno Fahr. 40.

7 giugno.

Sole mal terminato nelle nuvole.

5 ^h	5'	9"		
5	56			
6	47			
7	34		4	1015,02555
9	8			
9	56		6	151,53155

5 8 11,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 71,7. Termom. R. + 18°,7.
 Termometro esterno Fahr. 78.

9 giugno.

Sole mal terminato nella nebbia.

5 ^h	14'	44"		
15	31			
16	15			
16	55		4	1005,1925
18	22			
19	5			
19	40			
20	24		8	200,4097

5 16 27,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 81,9. Termom. R. + 15°,9.
 Termometro esterno Fahr. 73.

11 giugno 1826.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 22 ¹ 16 ^{II}		
23 5		
23 49		
24 54	4	99 ^E ,4952
26 45		
27 17		
28 6		
28 47	8	199 ,01675

5 24 42,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,8. Termom. R. + 17°,7.
 Termometro esterno Fahr. 76.

12 giugno.

Sole mal terminato, fatto a sega.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 25 ¹ 47 ^{II}		
26 26		
27 12		
28 6	4	99 ^E ,1963
29 27		
30 12		
32 33		
33 17	8	198 ,4089

5 28 49,4. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,8. Termom. R. + 19°,4.
 Termometro esterno Fahr. 78.

13 giugno.

Sole nelle nuvole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 31 ¹ 49 ^{II}		
32 31		
33 22		
34 4	4	98 ^E ,9031

5 32 57,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,2. Termom. R. + 21°,2.
 Termometro esterno Fahr. 85.

App. Eff. 1830.

14 giugno 1826.

Sole molto tremolante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 34 ¹ 12 ^{II}		
34	56	
35	42	
36	31	
38	8	
38	52	
39	34	
40	24	
	8	197 ,3423

5 37 5,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,8. Termom. R. + 21°,5.
 Termometro esterno Fahr. 85.

15 giugno.

Sole un poco tremolante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 38 ¹ 28 ^{II}		
39	18	
40	7	
40	52	
42	20	
43	1	
43	51	
44	36	
	8	196 ,9134

5 41 15,9. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,5. Termom. R. + 22°,7.
 Termometro esterno Fahr. 86.

16 giugno.

Sole nella nebbia mal terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 42 ¹ 25 ^{II}		
43	5	
43	47	
44	30	
45	57	
46	51	
47	32	
48	19	
	8	196 ,5497

5 45 21,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,0. Termom. R. + 22°,7.
 Termometro esterno Fahr. 88.

17 giugno 1826.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 46' 1"		
46 45		
47 40		
48 23	4	98 ^g ,1277
50 2		
50 46		
51 35		
52 29	8	196,23975

5 49 30,4. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,5. Termom. R. + 20°,0.
 Termometro esterno Fahr. 78.

18 giugno.

Sole nella nebbia ben terminato.

5 ^h 50' 18"		
50 58		
51 46		
52 34	4	98 ^g ,00036
53 58		
54 48		
55 34		
56 18	8	195,9871

5 53 40,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,5. Termom. R. + 18°,5.
 Termometro esterno Fahr. 72.

19 giugno.

Sole ben terminato.

5 ^h 54' 11"		
54 50		
55 35		
56 13	4	97 ^g ,91327
57 42		
58 31		
59 12		
59 57	8	195,8010

5 57 48,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,6. Termom. R. + 19°,0.
 Termometro esterno Fahr. 78.

20 giugno 1826.

Sole mal terminato nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 59' 1"		
59 44		
6 0 31		
1 15		
2 15	4	97 ^g ,83795
3 52		
4 12		
4 51	8	195,6718

6 1 57,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,4. Termom. R. + 19°,6.
 Termometro esterno Fahr. 79.

22 giugno.

Sole ben terminato.

6 ^h 6' 40"		
7 21		
8 14		
8 53	4	97 ^g ,8146
10 26		
11 12		
12 2		
12 47	8	195,6091

6 10 15,4. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,3. Termom. R. + 17°,3.
 Termometro esterno Fahr. 78.

23 giugno.

Sole interrotto dalle nuvole.

6 ^h 11' 10"		
14 11		
14 47		
15 30		
16 7		
16 58	6	146 ^g ,74115

6 14 23,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 11¹,3. Termom. R. + 18°,5.
 Termometro esterno Fahr. 77.

24 giugno 1826.

Sole alquanto tremolante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 14 ^m 55 ^s		
15 43		
16 30		
17 17 4	97 ^g ,90367	
18 54		
19 41		
20 28		
21 11 8	195 ,78567	

6 18 32,7 Mezzodì vero.
 Barom. 27^P 11¹,9. Termom. R. + 19°,7.
 Termometro esterno Fahr. 82.

25 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 19 ^m 5 ^s		
19 51		
20 44		
21 29 4	97 ^g ,98613	
23 10		
23 53		
24 42		
25 29 8	195 ,9596	

6 22 40,9. Mezzodì vero.
 Barom. 27^P 11¹,8. Termom. R. + 20°,7.
 Termometro esterno Fahr. 83.

26 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 23 ^m 14 ^s		
23 56		
24 52		
25 40 4	98 ^g ,11315	
27 13		
28 3		
28 51		
29 33 8	196 ,20675	

6 26 49,0. Mezzodì vero.
 Barom. 27^P 11¹,6. Termom. R. + 23°,0.
 Termometro esterno Fahr. 86.

27 giugno 1826.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 27 ^m 14 ^s		
27 58		
28 50		
29 41 4	98 ^g ,2670	
31 46		
32 23		
33 7	8	196 ,5066

6 30 56,9. Mezzodì vero.
 Barom. 27^P 10¹,5. Termom. R. + 23°,0.
 Termometro esterno Fahr. 89.

28 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 31 ^m 11 ^s		
31 56		
32 45		
33 25 4	98 ^g ,45355	
34 51		
35 46		
36 27		
37 10 8	196 ,87375	

6 35 4,6. Mezzodì vero.
 Barom. 27^P 10¹,6. Termom. R. + 23°,5.
 Termometro esterno Fahr. 90.

29 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 35 ^m 40 ^s		
36 18		
37 7		
37 46 4	98 ^g ,66075	
39 17		
40 11		
40 49		
41 31 8	197 ,29877	

6 39 12,2. Mezzodì vero.
 Barom. 27^P 11¹,5. Termom. R. + 24°,9.
 Termometro esterno Fahr. 90.

30 giugno 1826.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio,	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 39' 55"		
40 36		
41 22		
42 2	4	985,9006
43 30		
44 12		
44 59		
45 35	8	197,7791

6 43 19,7. Mezzodì vero.
 Barom. 27° 11',5. Termom. R. + 25°,2.
 Termometro esterno Fahr. 91.

3 luglio 1826.

Sole mal terminato nella nebbia.

Tempo dell'orologio,	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 52' 2"		
52 53		
53 37		
64 16	4	995,80925
55 42		
56 22		
57 2		
57 44	8	199,59175

6 55 40,7. Mezzodì vero.
 Barom. 27° 10',7. Termom. R. + 25°,2.
 Termometro esterno Fahr. 86.

1 luglio.

Sole mal terminato, fosco, agitato.

6 ^h	44' 10"		
44 55			
45 36			
46 22	4	995,16646	
47 50			
48 34			
49 14			
49 56	8	198,31787	

6 47 27,1. Mezzodì vero.
 Barom. 27° 11',8. Termom. R. + 25°,9.
 Termometro esterno Fahr. 91.

5 luglio.

Sole ben terminato.

7 ^h	1' 13"		
1 51			
2 38			
3 14	4	1005,5469	
4 37			
5 17			
5 58			
6 35	8	201,0909	

7 3 54,0. Mezzodì vero.
 Barom. 27° 9',9. Termom. R. + 22°,2.
 Termometro esterno Fahr. 87.

2 luglio.

Sole un poco tremolante.

6 ^h	48' 22"		
49 5			
49 50			
50 32	4	995,47175	
51 59			
52 45			
53 25			
54 8	8	198,92975	

6 51 34,1. Mezzodì vero.
 Barom. 27° 11',3. Termom. R. + 25°,2.
 Termometro esterno Fahr. 92.

6 luglio.

Sole ben terminato.

7 ^h	5' 5"		
5 45			
6 33			
7 13	4	1005,9705	
8 48			
9 26			
10 6			
10 43	8	201,9383	

7 8 0,3. Mezzodì vero.
 Barom. 27° 9',4. Termom. R. + 25°,5.
 Termometro esterno Fahr. 89.

7 dicembre 1826.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
16 ^h 52' 29"		
53 18		
54 5		
54 51	4	3038,3721
56 42		
57 27		
58 19		
59 5	8	604,7432

16 56 4,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,1. Termom. R. + 3°,4.
 Termometro esterno Fahr. 46.

9 dicembre.

Sole agitato, fatto a sega.

17 ^h	1' 50"		
2	52		
3 47			
4 28	4	3038,31835	
6 0			
6 42			
7 25			
8 5	8	606,64365	

17 4 47,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 6¹,9. Termom. R. + 4°,0.
 Termometro esterno Fahr. 48.

11 dicembre.

Sole ben terminato.

17 ^h	10' 40"		
11 23			
12 10			
12 49	4	3048,13245	
14 15			
14 58			
15 47			
16 28	8	608,26515	

17 13 33,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 11¹,3. Termom. R. + 4°,0.
 Termometro esterno Fahr. 46.

12 dicembre 1826.

Sole nella nebbia ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
17 ^h 14' 50"		
15 31		
16 16		
17 0	4	3048,4893
18 41		
19 22		
20 7		
20 53	8	608,9779

17 7 56,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,5. Termom. R. + 5°,6.
 Termometro esterno Fahr. 46.

13 dicembre.

Sole ben terminato.

17 ^h	41' 29"		
42	20		
43 16			
44 1	4	3058,92145	
45 37			
46 21			
47 16			
48 3	8	611,84585	

17 44 34,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 6¹,5. Termom. R. + 8°,1.
 Termometro esterno Fahr. 55.

14 dicembre.

Sole ben terminato.

17 ^h	59' 26"		
18 0 21			
1 16			
1 58	4	3068,1703	
3 36			
4 26			
5 16			
5 59	8	612,5474	

18 2 8,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,4. Termom. R. + 4°,0.
 Termometro esterno Fahr. 46.

23 dicembre 1826.

Sole mal terminato, agitato, fatto a sega

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 3' 31"		
4 19		
5 11		
5 55	4	3068,15277
7 26		
8 9		
9 2		
9 45	8	612 ,30715

18 6 34,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,7. Termom. R. + 4°,2.
 Termometro esterno Fahr. 48.

24 dicembre.

Sole ben terminato.

18 ^h	8' 28"		
9	10		
9	58		
10	46	4	3068,08945
12	28		
13	16		
14	3		
14	46	8	612 ,18575

18 11 0,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,8. Termom. R. + 3°,2.
 Termometro esterno Fahr. 46.

26 dicembre.

Sole ben terminato.

18 ^h	17' 6"		
17	47		
18	31		
19	15	4	3058,8682
20	48		
21	36		
22	20		
23	7	8	611 ,7382

18 19 51,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8,7. Termom. R. + 3°,0.
 Termometro esterno Fahr. 46.

27 dicembre 1826.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 21' 22"		
22	1	
22	50	
23	36	4
25	35	
26	17	
27	4	
27	42	8

18 24 17,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8,0. Termom. R. + 2°,8.
 Termometro esterno Fahr. 45.

28 dicembre.

Sole mal terminato, fosco, agitato.

18 ^h	26' 11"		
27	1		
27	47		
28	32	4	3058,5035
30	17		
30	55		
31	37		
32	22	8	611 ,01755

18 28 42,9. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,9. Termom. R. + 2°,6.
 Termometro esterno Fahr. 44.

29 dicembre.

Sole appena visibile

senza vetro nero.

18 ^h	33' 20"		
34	27		
35	22		
36	4	4	3058,2752

18 33 8,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,2. Termom. R. + 1°,7.
 Termometro esterno Fahr. 34.

31 dicembre 1826.

Sole agitato, fatto a sega.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 39' 46"		
40 29		
41 19		
42 3	4	304 ^g ,7165
43 30		
44 9		
45 4		
45 44	8	609 ,44386

18 41 57,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,0. Termom. R. + 9°,0.
 Termometro esterno Fahr. 54.

1 gennaio 1827.

Sole ben terminato.

18 ^h	43'	28"			
44	14				
45	4				
45	49	4	304 ^g ,5771		
47	25				
48	4				
48	52				
49	37	8	608 ,7557		

18 46 22,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,6. Termom. R. + 6°,0.
 Termometro esterno Fahr. 50.

3 gennaio.

Sole malissimo terminato nella nebbia.

18 ^h	52'	3"			
52	50				
53	39				
54	24	4	303 ^g ,61055		
56	2				
56	43				
57	24				
58	4	8	607 ,2190		

18 55 11,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 3¹,7. Termom. R. + 3°,7.
 Termometro esterno Fahr. 43.

5 gennaio 1827.

Sole nelle nuvole mal terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
19 ^h 1' 14"		
1 53		
2 45		
3 26	4	302 ^g ,7013
5 42		
7 4	6	454 ,0550

19 3 59,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 1¹,5. Termom. R. + 3°,7.
 Termometro esterno Fahr. 43.

8 giugno.

Sole ben terminato.

5 ^h	0'	45"			
1	46				
2	37				
3	38	4	100 ^g ,6965		
4	57				
5	36				
6	21				
7	2	8	201 ,4024		

5 3 39,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 5¹,5. Termom. R. + 16°,1.
 Termometro esterno Fahr. 73.

10 giugno.

Sole nelle nuvole ben terminato.

5 ^h	8'	47"			
9	31				
10	25				
11	7	4	99 ^g ,92655		
12	41				
13	27				
14	9				
14	54	8	199 ,85038		

5 11 53,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,0. Termom. R. + 19°,1.
 Termometro esterno Fahr. 78.

24

11 giugno 1827.

Sole mal terminato, trepidante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 13' 5"		
13 53		
14 38		
15 20	4	99 ^o ,5774
17 1		
17 39		
18 17		
19 2	8	199 ,15755

5 16 0,6. Mezzodi vero.

Barom. 27^o 7,8. Termom. R. + 17°,3.

Termometro esterno Fahr. 75.

12 giugno.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 17' 6"		
17 54		
18 49		
19 38	4	99 ^o ,2656
21 19		
22 12		
22 55		
23 58	8	198 ,54384

5 20 8,1. Mezzodi vero.

Barom. 27^o 7,7. Termom. R. + 18°,3.

Termometro esterno Fahr. 78.

13 giugno.

Sole mal terminato,
tremulo, fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 20' 58"		
21 48		
22 35		
23 21	4	98 ^o ,9876
24 58		
25 50		
26 41		
27 36	8	197 ,9718

5 24 5,8. Mezzodi vero.

Barom. 27^o 8,2. Termom. R. + 19°,4.

Termometro esterno Fahr. 80.

14 giugno 1825.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 25' 8"		
25 56		
26 46		
27 26	4	98 ^o ,7359
29 1		
29 53		
30 37		
31 18	8	197 ,4641

5 28 23,5. Mezzodi vero.

Barom. 27^o 8,3. Termom. R. + 20°,4.

Termometro esterno Fahr. 80.

15 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 29' 35"		
30 19		
31 4		
31 47	4	98 ^o ,50875
33 29		
34 19		
35 16		
35 52	8	197,02125

5 32 31,2. Mezzodi vero.

Barom. 27^o 7,0. Termom. R. + 21°,5.

Termometro esterno Fahr. 85.

17 giugno.

Sole interrotto dalle nuvole.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 37' 43"		
38 22		
39 11		
39 52	4	98 ^o ,1551
43 4		
43 48		
44 26		
45 7	8	196 ,3379

5 40 47,7. Mezzodi vero.

Barom. 27^o 6,7. Termom. R. + 20°,0.

Termometro esterno Fahr. 80.

18 giugno 1827.

Sole ben terminato nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 41' 35"		
42 15		
43 0		
43 43	4	98°,0330
45 13		
45 49		
46 29		
47 14	8	196,04525

5 44 56,5. Mezzodi vero.

Barom. 27° 7,6. Termom. R. + 20°,9.
Termometro esterno Fahr. 80.

19 giugno.

Sole nelle ultime quattro appena visibile senza vetro nero.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 45' 50"		
46 34		
47 13		
47 52	6	97°,8290
49 43		
50 59		
51 51		
52 31	8	195,85815

5 49 4,5. Mezzodi vero.

Barom. 27° 7,9. Termom. R. + 21°,0.
Termometro esterno Fahr. 81.

20 giugno.

Sole un poco agitato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 50' 18"		
50 58		
51 41		
52 19	4	97°,85635
54 13		
54 54		
55 41		
56 19	8	195,7116

5 53 13,1. Mezzodi vero.

Barom. 27° 6,9. Termom. R. + 21°,2.
Termometro esterno Fahr. 83.

App. Eff. 1830.

21 giugno 1827.

Sole tremulo, fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 54' 23"		
55 10		
56 1		
56 39	4	97°,8131
58 26		
59 6		
59 57		
6 0 43	8	195,6292

6 57 22,1. Mezzodi vero.

Barom. 27° 8,5. Termom. R. + 20°,5.
Termometro esterno Fahr. 80.

22 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 58' 17"		
58 59		
59 45		
6 0 30	4	97°,8094
2 2		
3 48		
3 42		
4 26	8	195,6112

6 1 30,4. Mezzodi vero.

Barom. 27° 8,5. Termom. R. + 20°,5.
Termometro esterna Fahr. 81.

23 giugno.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 2' 24"		
3 13		
3 55		
4 37	4	97°,82725
6 12		
6 57		
7 43		
8 25	8	195,6484

6 5 38,8. Mezzodi vero.

Barom. 27° 8,4. Termom. R. + 20°,4.
Termometro esterno Fahr. 83.

24 giugno 1827.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 6' 48"		
7 33		
8 18		
9 6	4	97 ⁶ ,8785
10 43		
11 24		
12 10		
12 51	8	195 ,7565

6 9 47,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,4. Termom. R. + 20°,5.
 Termometro esterno Fahr. 80.

25 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 10' 42"		
11 30		
12 15		
12 57	4	97 ⁶ ,9668
14 32		
15 13		
16 3		
16 49	8	195 ,9248

6 13 54,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,4. Termom. R. + 21°,0.
 Termometro esterno Fahr. 82.

26 giugno.

Sole malissimo terminato nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 16' 9"		
16 56		
17 41		
18 18	4	98 ⁶ ,0656
19 46		
20 28		
21 23		
21 59	8	196 ,1565

6 18 2,9. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,1. Termom. R. + 18°,5.
 Termometro esterno Fahr. 77.

27 giugno 1827.

Sole mal terminato,
 le prime quattro senza vetro nero.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 19' 30"		
20 52		
21 33		
22 7	4	98 ⁶ ,2139
23 28		
24 6		
24 51		
25 32	8	196 ,4397

6 22 11,4. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,7. Termom. R. + 19°,0.
 Termometro esterno Fahr. 75.

28 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 23' 7"		
23 44		
24 34		
25 12	4	98 ⁶ ,3987
26 46		
27 32		
28 17		
28 52	8	196 ,7851

6 26 19,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,7. Termom. R. + 18°,5.
 Termometro esterno Fahr. 78.

29 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 27' 15"		
27 56		
28 44		
29 27	4	98 ⁶ ,60067
30 58		
31 41		
32 26		
33 8	8	197 ,1966

6 30 26,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,6. Termom. R. + 20°,2.
 Termometro esterno Fahr. 85.

30 giugno 1827.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 31' 13"		
31 54		
32 42		
33 24	4	98 ^g ,8417
34 55		
35 39		
36 27		
37 41	8	197 ,67065

6 34 33,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,7. Termom. R. + 22°,5.
 Termometro esterno Fahr. 88.

1 luglio.

Sole un poco tremolante.

6 ^h 35' 2"		
35 52		
36 40		
37 22	4	99 ^g ,1079
38 55		
39 35		
40 23		
41 4	8	198 ,1969

6 38 40,9. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,2. Termom. R. + 21°,5.
 Termometro esterno Fahr. 83.

2 luglio.

Sole ben terminato.

6 ^h 39' 24"		
40 4		
40 53		
41 31	4	99 ^g ,40125
42 58		
43 37		
44 17		
44 58	8	198 ,7831

6 42 47,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,3. Termom. R. + 23°,5.
 Termometro esterno Fahr. 87.

3 luglio 1827.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 43' 25"		
44 4		
44 56		
45 33	4	99 ^g ,72777
47 10		
47 56		
48 40		
49 16	8	199 ,4393

6 46 53,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,3. Termom. R. + 24°,7.
 Termometro esterno Fahr. 89.

4 luglio.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

6 ^h 47' 37"		
48 14		
49 25		
50 9	4	100 ^g ,0771
51 45		
52 27		
53 14		
53 47	8	200 ,1486

6 50 59,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,3. Termom. R. + 23°,6.
 Termometro esterno Fahr. 92.

8 dicembre.

Sole ben terminato.

16 ^h 58' 28"		
59 12		
59 59		
17 0 40	4	301 ^g ,7395
2 24		
3 7		
3 57		
4 38	8	605 ,4817

17 1 24,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 11¹,1. Termom. R. + 4°,1.
 Termometro esterno Fahr. 46.

9 dicembre 1827.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
17 ^h 1' 33"		
2 21		
3 15		
4 0		
4 52		
5 29	6	454 ^E ,8140
7 9		
7 46		
8 31		
9 15	10	958 ,0206

17 5 49,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,7. Termom. R. + 3°,3.
 Termometro esterno Fahr. 43.

10 dicembre.

Sole nella nebbia ben terminato.

17 ^h	6' 43"		
7 24			
8 22			
9 0	4	503 ^E ,6408	
10 40			
11 18			
12 11			
13 54	8	607 ,2757	

17 10 14,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,7. Termom. R. + 3°,4.
 Termometro esterno Fahr. 43.

18 dicembre.

Sole ben terminato.

17 ^h	43' 13"		
43 57			
44 47			
45 25	4	305 ^E ,87415	
47 8			
47 50			
48 39			
49 19	8	611 ,75695	

17 45 43,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,5. Termom. R. + 5°,5.
 Termometro esterno Fahr. 53.

19 dicembre 1827.

Sole nelle prime quattro

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
17 ^h 46' 58"		
51 37		
52 28		
53 3	4	306 ^E ,0022
54 41		
55 14	6	459 ,0180

17 50 10,9. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,3. Termom. R. + 4°,7.
 Termometro esterno Fahr. 47.

20 dicembre.

Sole ben terminato.

17 ^h	51' 22"		
52 5			
53 4			
55 51	4	306 ^E ,0886	
55 54			
56 38			
57 29			
58 19	8	612 ,1810	

17 54 38,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,4. Termom. R. + 3°,2.
 Termometro esterno Fahr. 45.

22 dicembre.

Sole nelle nuvole, le prime quattro
senza vetro nero.

18 ^h	6' 38"		
1 56			
2 55			
4 11	4	306 ^E ,1605	
5 39			
6 12			
7 15			
9 11	8	612 ,53975	

18 3 34,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,2. Termom. R. + 2°,1.
 Termometro esterno Fahr. 5g.

24 dicembre 1827.

Sole mal terminato nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 9' 33"		
10 17		
11 1		
11 46	4	306°,1043
13 31		
14 22		
15 18		
16 18	8	612 ,2160

18 12 29,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27° 9,3. Termom. R. + 8°,3.
 Termometro esterno Fahr. 58.

25 dicembre.

Sole mal terminato, fatto a sega.

18 ^h	14' 40"		
14 44			
15 31			
16 10	4	306°,0250	
17 50			
18 27			
19 15			
19 57	8	612 ,04736	

18 16 57,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27° 9,3. Termom. R. + 6°,8.
 Termometro esterno Fahr. 48.

26 dicembre.

Sole malissimo terminato, fatto a sega.

18 ^h	18' 9"		
19 8			
20 6			
20 48	4	305°,89836	
22 39			
23 31			
24 33			
25 17	8	611 ,8094	

18 21 25,4. Mezzodi vero.
 Barom. 28° 0,8. Termom. R. + 6°,7.
 Termometro esterno Fahr. 54.

27 dicembre 1827.

Sole fatto a sega, mal terminato.

Tempo dell'orologio	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 22' 28"		
23 15		
24 10		
24 56	4	305°,74485
26 48		
27 35		
28 29		
29 21	8	611 ,4917

18 25 53,1. Mezzodi vero.
 Barom. 28° 1,0. Termom. R. + 5°,0.
 Termometro esterno Fahr. 50.

28 dicembre.

Sole mal terminato, agitato.

18 ^h	27' 3"		
27 46			
28 39			
29 26	4	305°,5680	
31 8			
31 52			
32 44			
33 31	8	611 ,1254	

18 30 11,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27° 11,3. Termom. R. + 3°,2.
 Termometro esterno Fahr. 47.

29 dicembre.

Sole malissimo terminato

nelle nuvole.

18 ^h	32' 30"		
33 57			
35 5			
36 11	4	305°,3296	

18 34 48,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27° 9,5. Termom. R. + 2°,0.
 Termometro esterno Fahr. 38.

30 dicembre 1827.

Sole un poco agitato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 56' 6"		
56 49		
57 40		
58 25	4	305°,0741
40 5		
40 50		
41 43		
42 24	8	610 ,1512

18 59 15,9. Mezzodi vero.
Barom. 27° 10' 4. Termom. R. + 2°,6.
Termometro esterno Fahr. 45.

8 giugno 1828.

Sole un poco tremolante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 11' 58"		
12 46		
13 27		
14 6	4	100°,3836
15 30		
16 14		
17 7		
17 51	8	200 ,8047

5 13 24,6. Mezzodi vero.
Barom. 27° 9' 7. Termom. R. + 19°,2.
Termometro esterno Fahr. 80.

31 dicembre.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 40' 45"		
41 27		
42 16		
43 53	4	304°,7903
44 37		
45 22		
46 16		
46 58	8	609 ,5785

18 43 42,9. Mezzodi vero.
Barom. 27° 9' 5. Termom. R. + 2°,0.
Termometro esterno Fahr. 41.

1 gennaio 1828.

Sole nella nebbia ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 44' 54"		
45 27		
46 10		
46 47	4	304°,4663
48 28		
49 4		
49 49		
50 25	8	608 ,92515

48 10,5. Mezzodi vero.
Barom. 27° 6' 7. Termom. R. + 2°,2.
Termometro esterno Fahr. 45.

8 giugno 1828.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 14' 27"		
15 12		
16 5		
16 51	4	100°,0165
18 44		
19 34		
20 31		
21 15	8	200 ,04075

5 17 32,4. Mezzodi vero.
Barom. 27° 9' 3. Termom. R. + 20°,0.
Termometro esterno Fahr. 81.

10 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 18' 28"		
19 26		
20 14		
21 1	4	99°,6635
22 44		
23 27		
24 11		
25 2	8	199 ,3310

5 21 40,5. Mezzodi vero.
Barom. 27° 10' 2. Termom. R. + 18°,7.
Termometro esterno Fahr. 79.

11 giugno 1828.

Sole nelle nuvole,
senza vetro nero.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 23' 10"		
24 39		
27 40		
28 33	4	99 ⁵ ,3487

5 25 48,0. Mezzodi vero.

Barom. 27^P 9¹,9. Termom. R. + 19°,2.
Termometro esterno Fahr. 78.

12 giugno.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

5 ^h 26' 54"		
27 41		
28 37		
29 19	4	99 ⁵ ,0550
51 1		
31 47		
32 40		
33 33	8	198 ,1117

5 29 56,1. Mezzodi vero.

Barom. 27^P 9¹,7. Termom. R. + 20°,4.
Termometro esterno Fahr. 82.

13 giugno.

Sole ben terminato.

5 ^h 31' 3"		
31 51		
32 38		
33 23	4	98 ⁶ ,79335
34 55		
35 33		
36 19		
37 7	8	197 ,5824

5 34 5,3. Mezzodi vero.

Barom. 27^P 10¹,1. Termom. R. + 21°,0.
Termometro esterno Fahr. 85.

14 giugno 1828.

Sole offuscato nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 34' 54"		
35 49		
36 38		
37 21	4	98 ⁶ ,5663
39 6		
39 49		
40 39		
41 19	8	197 ,12725

5 38 14,0. Mezzodi vero.

Barom. 27^P 10¹,7. Termom. R. + 22°,0.
Termometro esterno Fahr. 86.

15 giugno.

Sole ben terminato.

5 ^h 42' 56"		
45 30	2	49 ⁶ ,1837

5 42 22,7. Mezzodi vero.

Barom. 27^P 10¹,7. Termom. R. + 22°,2.
Termometro esterno Fahr. 87.

16 giugno.

Sole ben terminato.

5 ^h 43' 1"		
43 49		
44 35		
45 15	4	98 ⁶ ,2017
46 43		
47 21		
48 1		
48 37	8	196 ,3844

5 46 31,6. Mezzodi vero.

Barom. 27^P 9¹,6. Termom. R. + 22°,0.
Termometro esterno Fahr. 85.

17 giugno 1828.

Sole malissimo terminato
nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 50' 43"		
51 28		
52 20		
53 0	4	98 ^E ,0476

5 50 30,5. Mezzodi vero.
Barom. 27^P 8,7. Termom. R. + 22°,0.
Termometro esterno Fahr. 85.

18 giugno.

Sole ben terminato.

5 ^h 51' 39"		
52 27		
53 16		
53 54	4	97 ^E ,9499
55 31		
56 9		
56 57		
57 35	8	195,9061

5 54 48,4. Mezzodi vero.
Barom. 27^P 7,8. Termom. R. + 25°,0.
Termometro esterno Fahr. 84.

19 giugno.

Sole un poco annebbiato.

5 ^h 55' 51"		
56 34		
57 24		
58 1	4	97 ^E ,8706
59 42		
6 0 25		
1 11		
1 56	8	195,7379

5 58 57,9. Mezzodi vero.
Barom. 27^P 19,6. Termom. R. + 21°,0.
Termometro esterno Fahr. 86.

20 giugno 1828.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 59' 58"		
6 0 39		
1 31		
2 15		
3 47	4	97 ^E ,8341
4 43		
5 30		
6 16	8	195,6463

6 3 6,1. Mezzodi vero.
Barom. 27^P 11,1. Termom. R. + 23°,3.
Termometro esterno Fahr. 89.

21 giugno.

Sole un poco tremolante.

6 ^h 4' 12"		
4 54		
5 42		
6 21	4	97 ^E ,8083
7 52		
8 36		
9 19		
10 2	8	195,6099

6 7 14,9. Mezzodi vero.
Barom. 27^P 10,0. Termom. R. + 24°,3.
Termometro esterno Fahr. 92.

22 giugno.

Sole mal terminato nella nebbia.

6 ^h 8' 13"		
9 5		
9 52		
10 27	4	97 ^E ,8227
11 51		
12 30		
13 15		
13 48	8	195,6355

6 11 25,1. Mezzodi vero.
Barom. 27^P 8,9. Termom. R. + 24°,7.
Termometro esterno Fahr. 90.

23 giugno 1828.

Sole mal terminato, tremolante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 12' 25"		
13 12		
14 2		
14 53	4	97 ⁸ ,8658
17 4		
17 45		
18 35		
19 20	8	195 ,7433

6 15 32,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,5. Termom. R. + 20°,2.
 Termometro esterno Fahr. 82.

24 giugno.

Sole un poco agitato.

6 ^h 16' 23"		
17 5		
17 52		
18 36	4	97 ⁸ ,94545
20 18		
20 57		
21 43		
22 16	8	195 ,8791

6 19 41,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,0. Termom. R. + 20°,2.
 Termometro esterno Fahr. 81.

25 giugno.

Sole tremolante, fiammeggiante.

6 ^h 20' 45"		
21 31		
22 24		
23 6	4	98 ⁸ ,0476
24 39		
25 17		
26 8		
27 11	8	196 ,0951

6 23 49,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,8. Termom. R. + 19°,9.
 Termometro esterno Fahr. 83.

App. Eff. 1830.

26 giugno 1828.

Sole mal terminato nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 25' 4"		
25 44		
26 36		
27 29	4	98 ⁸ ,1808
29 18		
29 58		
30 56		
51 40	8	196 ,3762

6 27 57,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,7. Termom. R. + 19°,8.
 Termometro esterno Fahr. 80.

27 giugno.

Sole molto tremolante.

6 ^h 29' 2"		
29 40		
30 37		
31 18	4	98 ⁸ ,3489
33 1		
33 42		
34 35		
35 16	8	196 ,7006

6 32 5,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,4. Termom. R. + 21°,6.
 Termometro esterno Fahr. 84.

28 giugno.

Sole ben terminato.

6 ^h 33' 6"		
33 45		
34 33		
35 11	4	98 ⁸ ,5503
36 54		
37 35		
38 17		
39 2	8	197 ,0931

6 36 15,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,5. Termom. R. + 22°,0.
 Termometro esterno Fahr. 86.

29 giugno 1828.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 37' 9"		
37 46		
38 33		
39 11	4	98 ⁶ ,7801
40 42		
41 19		
42 7		
43 44	8	179 ,5490

6 40 21,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,9. Termom. R. + 22°,5.
 Termometro esterno Fahr. 87.

30 giugno.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

6 ^h 41'	13"		
41 51			
42 36			
43 15	4	99 ⁶ ,0367	
44 54			
45 31			
46 18			
47 2	8	198 ,0624	

6 44 28,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,0. Termom. R. + 22°,2.
 Termometro esterno Fahr. 87.

1 luglio.

Sole un poco agitato.

6 ^h 45'	53"		
46 36			
47 19			
47 51	4	99 ⁶ ,3138	
49 15			
49 54			
50 35			
51 13	8	198 ,6307	

6 48 35,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8¹,0. Termom. R. + 23°,7.
 Termometro esterno Fahr. 91.

2 luglio 1828.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 49' 22"		
50 3		
50 45		
51 28	4	99 ⁶ ,6446
52 46		
53 29		
54 7		
54 43	8	199 ,2727

6 52 42,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,8. Termom. R. + 24°,3.
 Termometro esterno Fahr. 90.

3 luglio.

Sole un poco tremolante.

6 ^h 53'	32"		
54 10			
54 53			
55 27	4	99 ⁶ ,99255	
57 2			
57 43			
58 21			
59 - 4	8	199 ,96855	

6 56 48,9. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,3. Termom. R. + 24°,2.
 Termometro esterno Fahr. 92.

4 luglio.

Sole ben terminato.

6 ^h 58'	17"		
58 58			
59 39			
7 0 16	4	100 ⁶ ,3576	
1 48			
2 25			
3 2			
3 53	8	200 ,7189	

7 0 55,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,3. Termom. R. + 25°,2.
 Termometro esterno Fahr. 94.

5 dicembre 1828.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
16 ^h 44' 37"		
45 21		
46 8		
46 54	4	301 ⁸ ,57895
48 44		
49 29		
50 22		
51 9	8	603 ,1484

16 48 43,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,7. Termom. R. + 1°,7.
 Termometro esterno Fahr. 46.

6 dicembre.

Sole ben terminato.

16 ^h	50'	9"		
50	51			
51	38			
52	18	4	302 ⁸ ,1137	
53	53			
54	40			
55	33			
56	22	8	604 ,2300	

16 53. 3,9. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 11¹,5. Termom. R. + 3°,0.
 Termometro esterno Fahr. 48.

7 dicembre.

Sole mal terminato, fatto a sega.

16 ^h	54'	27"		
55	10			
56	3			
56	44	4	302 ⁸ ,6189	
58	36			
59	20			
17 0	11			
17 0	52	8	605 ,2413	

17 57. 24,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,5. Termom. R. + 3°,7.
 Termometro esterno Fahr. 52.

10 dicembre 1828.

Sole mal terminato, annebbiato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
17 ^h 7' 23"		
8	9	
9	5	
9	51	
11	33	
12	24	
13	18	
14	9	
	8	607 ,8971

17 10 30,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 11¹,3. Termom. R. + 6°,1.
 Termometro esterno Fahr. 54.

13 dicembre.

Sole mal terminato nella nebbia.

17 ^h	20'	26"		
21	9			
22	2			
22	47	4	304 ⁸ ,9591	
24	32			
25	23			
26	15			
27	1	8	609 ,9204	

17 23. 41,4. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 11¹,8. Termom. R. + 1°,0.
 Termometro esterno Fahr. 41.

15 dicembre.

Sole ben terminato.

17 ^h	29'	9"		
29	55			
30	52			
31	37	4	305 ⁸ ,47015	
33	48			
34	32			
35	30			
36	18	8	610 ,94635	

17 32. 30,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,0. Termom. R. + 1°,0.
 Termometro esterno Fahr. 42.

16 dicembre 1828.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
17 ^h 33' 46"		
34 25		
35 15		
35 51	4	305°,6716
37 31		
38 16		
39 6		
39 45	8	611,34395

17 36 54,4. Mezzodi vero.
 Barom. 28^P 0,4. Termom. R. + 2°,4.
 Termometro esterno Fahr. 44.

19 dicembre.

Sole malissimo terminato, fatto a sega.

17 ^h 47' 26"		
48 11		
49 8		
49 54	4	306°,0723
51 36		
52 23		
53 21		
54 5	8	612,15535

17 50 8,4. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,7. Termom. R. + 3°,2.
 Termometro esterno Fahr. 43.

22 dicembre.

Sole ben terminato.

18 ^h 0' 49"		
1 31		
2 23		
3 12	4	306°,1600
5 1		
5 46		
6 42		
7 34	8	612,3322

18 3 21,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,7. Termom. R. + 6°,5.
 Termometro esterno Fahr. 52.

23 dicembre 1828.

Sole malissimo terminato

nelle nuvole.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 5' 5"		
8 46		
9 55	4	306°,1260
11 33		

18 7 46,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,1. Termom. R. + 3°,8.
 Termometro esterno Fahr. 43.

28 dicembre.

Sole nelle nuvole appena visibile
senza vetro nero.

18 ^h 27' 9"		
28 1		
28 57		
29 50	4	305°,3949
31 46		
33 29		
34 28		
35 40	8	610,81405

18 29 49,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,3. Termom. R. + 6°,0.
 Termometro esterno Fahr. 49.

29 dicembre.

Sole ben terminato.

18 ^h 31' 1"		
31 38		
32 26		
33 6	4	305°,1464
35 8		
35 49		
36 37		
37 12	8	610,2908

18 34 14,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,4. Termom. R. + 6°,0.
 Termometro esterno Fahr. 54.

30 dicembre 1828.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
18 ^h 34' 43"		
35		
36 10		
36 54	4	304 ⁶ ,8659
38 33		
39 20		
40 8		
40 46	8	609 ,7243

18 38 38,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 11¹,4. Termom. R. + 6°,3.
 Termometro esterno Fahr. 56.

3 gennaio 1829.

Sole un poco tremolante.

18 ^h	52'	3"			
53	48				
53	44				
54 29		4	303 ⁵ ,3917		
56 16					
57 2					
57 51					
58 37		8	606 ,77595		

18 56 12,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 5¹,0. Termom. R. + 2°,0.
 Termometro esterno Fahr. 44.

4 gennaio.

Sole ben terminato.

18 ^h	56'	23"			
57	6				
57	57				
58 38		4	302 ⁶ ,93615		
19 0 30					
1 12					
2 1					
2 50		8	605 ,8603		

19 0 34,2. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 5¹,5. Termom. R. + 1°,9.
 Termometro esterno Fahr. 44.

8 gennaio 1829.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato..
19 ^h 14' 40"		
15	27	
16	18	
17	2	
18	51	
19	37	
20	59	
21	59	601 ,5712

19 18 0,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 3¹,9. Termom. R. + 1°,7.
 Termometro esterno Fahr. 38.

7 giugno.

Sole mal terminato, tremolante.

4 ^h	59'	6"			
5	0	3			
	0	55			
1	38		4		
3	20			100 ⁶ ,9092	
4	6				
5	3				
5	50		8		201 ,8262

5 2 12,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7¹,9. Termom. R. + 17°,0.
 Termometro esterno Fahr. 73.

8 giugno.

Sole ben terminato.

5 ^h	3'	18"			
4	9				
5	53				
5	54		4		100 ⁶ ,4914
7	48				
8	39				
9	17				
10	6		8		200 ,9959

5 6 19,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9¹,6. Termom. R. + 17°,2.
 Termometro esterno Fahr. 76.

9 giugno 1829.

Sole nella nebbia mal terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 7 ^m 19 ^s		
8 7		
9 0		
9 48	4	100 ^g ,105,15
11 31		
12 21		
13 6		
15 52	8	200 ,21485

5 10 28,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,5. Termom. R. + 16°,2.
 Termometro esterno Fahr. 73.

10 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 11 ^m 34 ^s		
12 25		
13 16		
14 2	4	99 ^g ,7464
15 43		
16 41		
17 29		
18 29	8	199 ,5065

5 14 37,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8,3. Termom. R. + 17°,7.
 Termometro esterno Fahr. 74.

11 giugno.

Sole mal terminato, agitato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 16 ^m 14 ^s		
16 57		
17 42		
18 25	4	99 ^g ,41275
19 58		
20 41		
21 25		
22 00	8	198 ,8347

5 15 33,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8,3. Termom. R. + 17°,9.
 Termometro esterno Fahr. 75.

12 giugno 1829.

Sole un poco agitato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 20 ^m 11 ^s		
20 54		
21 45		
22 50	4	99 ^g ,1179
24* 16		
25 1		
25 52		
26 41	8	198 ,24965

5 22 54,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,0. Termom. R. + 16°,9.
 Termometro esterno Fahr. 73.

13 giugno.

Sole interrotto dalle nuvole.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 25 ^m 39 ^s		
26 31		
27 28		
28 16	4	98 ^g ,8435
29 44		
30 25		
31 9		
31 45	8	197 ,7544

5 27 4,1. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,3. Termom. R. + 17°,7.
 Termometro esterno Fahr. 75.

14 giugno.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 28 ^m 33 ^s		
29 25		
30 26		
31 11	4	98 ^g ,6115
33 0		
33 52		
34 39		
35 30	8	197 ,2484

5 31 12,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10¹,8. Termom. R. + 19°.
 Termometro esterno Fahr. 81.

15 giugno 1829.

Sole mal terminato nella nebbia.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Aroo osservato.
5 ^h 32' 1"		
32 52		
33 40		
34 27	4	98 ^E ,4142
36 15		
37 3		
37 53		
38 40	8	196,82495

5 35. 21,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 11,9. Termom. R. + 20°,6.
 Termometro esterno Fahr. 82.

16 giugno.

Sole un poco tremolante.

5 ^h 36' 19"		
37 8		
38 2		
38 52	4	98 ^E ,23655
40 36		
41 24		
42 19		
43 11	8	196,4760

5 39 31,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,5. Termom. R. + 20°,7.
 Termometro esterno Fahr. 85.

17 giugno.

Sole mal terminato nella nebbia.

5 ^h 40' 33"		
41 28		
42 20		
43 4	4	98 ^E ,0880
44 46		
45 35		
46 15		
47 4	8	196,1791

5 43 40,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8,0. Termom. R. + 20°,0.
 Termometro esterno Fahr. 81.

18 giugno 1829.

Sole mal terminato, tremolante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Aroo osservato.
5 ^h 44' 39"		
45 28		
46 21		
47 8	4	97 ^E ,97315
48 46		
49 45		
50 32		
51 18	8	195,95345

5 47 50,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 6,5. Termom. R. + 21°,3.
 Termometro esterno Fahr. 84.

19 giugno.

Sole alquanto tremolante.

5 ^h 48' 51"		
49 36		
50 31		
51 19	4	97 ^E ,8892
53 5		
53 52		
54 46		
55 30	8	195,78295

5 52 1,4. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,9. Termom. R. + 17°,9.
 Termometre esterno Fahr. 76.

20 giugno.

Sole nella nebbia mal terminato.

5 ^h 53' 3"		
53 42		
54 38		
55 21	4	97 ^E ,8522
56 58		
57 44		
58 36		
59 18	8	195,6638

5 56 10,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8,2. Termom. R. + 18°,6.
 Termometro esterno Fahr. 76.

21 giugno 1829.

Sole mal terminato, fatto a sega.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
5 ^h 57'	7"	
57	57	
58	50	
59	54	4
6	13	97 ⁵ ,8119
1	56	
2	51	
3	48	8
		195,6227

6 o 19,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,8. Termom. R. + 19°,2.
 Termometro esterno Fahr. 80.

24 giugno 1829.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 9'	31"	
10	19	
11	24	
12	9	4
13	58	97 ⁵ ,92345
14	48	
15	51	
16	38	8
		195,8558

6 12 49,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 10,4. Termom. R. + 22°,5.
 Termometro esterno Fahr. 87.

22 giugno.

Sole mal terminato, fiammeggiante.

6 ^h	1'	21"		
2	7			
2	58			
3	43	4	97 ⁵ ,8171	
5	47			
6	35			
7	25			
8	8	8	195,6400	

6 4 30,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,5. Termom. R. + 20°,5.
 Termometro esterno Fahr. 82.

25 giugno.

Sole ben terminato.

6 ^h	14'	46"		
15	19			
16	15			
17	6	4	98 ⁵ ,00875	
18	44			
19	29			
20	26			
21	12	8	196,04965	

6 16 58,9. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,8. Termom. R. + 23°,7.
 Termometro esterno Fahr. 89.

23 giugno.

Sole ben terminato.

6 ^h	5'	31"		
6	12			
7	4			
7	51	4	97 ⁵ ,85395	
9	39			
10	27			
11	18			
12	3	8	195,7120	

6 8 40,0. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,5. Termom. R. + 22°,0.
 Termometro esterno Fahr. 84.

26 giugno.

Sole ben terminato.

6 ^h	17'	52"		
18	40			
19	32			
20	15	4	98 ⁵ ,1555	
22	2			
22	48			
23	37			
24	19	8	196,30625	

6 21 8,8. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 9,0. Termom. R. + 21°,7.
 Termometro esterno Fahr. 85.

27 giugno 1829.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 21' 57"		
22 48		
23 39		
24 21	4	98 ^E ,3139
25 58		
26 43		
27 34		
28 15	8	196,6211

6 25 17,7. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,9. Termom. R. + 22°,5.
 Termometro esterno Fahr. 84.

30 giugno.

Sole malissimo terminato

nelle nuvole.

6 ^h	34' 48"		
35 34			
36 57			
42 12	4	98 ^E ,9875	

6 37 45,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,5. Termom. R. + 18°,7.
 Termometro esterno Fahr. 76.

3 luglio.

Sole interrotto dalle nuvole,
mal terminato.

6 ^h	46' 34"		
47 30			
48 27			
49 14	4	99 ^E ,9058	
52 29			
53 9			
53 51			
54 32	8	199,8313	

6 50 12,5. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 8,5. Termom. R. + 20°,0.
 Termometro esterno Fahr. 80.

App. Eff. 1830.

4 luglio 1829.

Sole ben terminato.

Tempo dell'orologio.	Numero delle osserv.	Arco osservato.
6 ^h 52' 20"		
53 4		
53 46		
54 23	4	100 ^E ,25995
56 1		
56 42		
57 24		
58 7	8	200,5459

6 54 20,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,8. Termom. R. + 21°,0.
 Termometro esterno Fahr. 84.

5 luglio.

Sole ben terminato.

6 ^h	55' 8"		
55 51			
56 39			
57 29	4	100 ^E ,6741	
59 8			
59 54			
7 0 41			
1 30	8	201,3429	

7 58 28,3. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,5. Termom. R. + 21°,3.
 Termometro esterno Fahr. 84.

6 luglio.

Sole mal terminato, tremolante.

7 ^h	0' 16"		
1 2			
1 53			
2 40	4	101 ^E ,0902	
4 14			
5 0			
5 48			
6 36	8	202,2063	

7 2 35,6. Mezzodi vero.
 Barom. 27^P 7,6. Termom. R. + 22°,0.
 Termometro esterno Fahr. 86.

Col metodo indicato nelle nostre Effemeridi dell'anno 1816 si è dedotta per ciascun giorno d'osservazione l'apparente distanza del Sole dallo zenith. A questa distanza si applicarono le correzioni dipendenti dalla rifrazione, dalla parallasse, dalla latitudine del Sole e dalla riduzione al solstizio, e si ottenne la distanza meridiana dallo zenith dell'eclittica nell'istante del solstizio. La differenza fra questa e la latitudine della Specola ci diede l'apparente obliquità dell'eclittica.

Solstizio d'inverno 1825.

Giorni 1825.	Distanza meridiana apparente del Sole dallo zenith.	Rifraz. - parall.	Latitud. del Sole.	Riduzione al solstizio.	Distanza meridiana dell'eclittica dallo zenith nel solstizio.
Dicem. 25 26 1826	68° 59' 37,46	2 18,58	- 0,32	2 43,73	68° 55' 39,45
	49 51,02	2 17,41	- 0,18	4 34,07	42,33
Genn. 2 3	22 47,86	2 20,26	- 0,37	30 31,77	39,52
	17 13,60	2 19,49	- 0,25	36 5,24	38,08
Medie . . .					68 55 39,84
Latitudine della Specola . . .					45 28 0,70
Obliquità apparente					23 27 39,14

Solstizio d'estate 1825.

Giorni 1825.	Distanza meridiana apparente del Sole dallo zenith.	Rifraz. - parall.	Latitud. del Sole.	Riduzione al solstizio.	Distanza meridiana dell'eclittica dallo zenith nel solstizio.
Giugno 6	22 ° 48' 6,90	19,88	+ 0,56	- 48' 11,03	22 ° 0' 16,31
7	42 6,27	19,83	0,63	42 8,04	18,69
8	36 27,61	19,68	0,67	36 28,96	19,00
9	31 10,46	19,29	0,66	31 13,99	16,42
10	26 19,69	19,23	0,63	26 22,94	16,70
11	21 55,06	19,06	0,56	21 56,22	18,46
12	17 54,11	19,14	0,47	17 53,87	19,85
13	14 14,51	18,93	0,33	14 15,97	17,80
14	11 2,27	18,05	0,18	11 2,62	18,88
16	5 51,00	18,54	- 0,13	5 49,83	19,58
17	3 50,70	18,74	- 0,37	3 50,51	18,66
18	2 16,85	18,56	- 0,40	2 16,02	18,99
19	1 7,01	18,61	- 0,53	1 6,22	18,87
21	0 2,15	18,65	- 0,67	0 1,78	18,95
22	0 6,09	18,83	- 0,71	0 5,93	18,48
23	0 34,60	18,83	- 0,69	0 35,47	17,27
24	1 30,28	18,93	- 0,64	1 29,79	18,78
25	2 48,50	18,77	- 0,56	2 48,86	17,85
26	4 55,92	18,83	- 0,47	4 32,63	21,65
27	6 39,03	18,80	- 0,35	6 41,05	16,43
28	9 15,55	18,78	- 0,20	9 14,05	20,06
29	12 11,93	18,66	- 0,04	12 11,56	18,99
30	15 34,86	18,89	+ 0,11	15 33,49	20,37
Luglio 3	28 5,86	18,93	0,48	28 5,17	20,10
5	38 27,66	19,56	0,60	38 26,72	21,10
6	44 15,01	19,56	0,61	44 13,33	21,85
7	50 25,15	19,75	0,58	50 23,64	21,84
9	23 3 55,15	19,96	0,42	63 54,77	20,76
				Medio	22 0 19,02
				Latitudine della Specola	45 28 0,70
				Obliquità apparente	23 27 41,68

Solstizio d'estate 1826.

Giorni 1826.	Distanza meridiana apparente del Sole dallo zenit.	Rifraz. - parall.	Latitud. del Sole.	Riduzione al solstizio.	Distanza meridiana dell'eclittica dallo zenit nel solstizio.
Giugno 7	22° 43' 35,65	19,52	" " - 0,21	- 43' 33",58	22° 0' 21,38
9	32 29,60	19,65	- 0,33	32 27,40	21,52
11	23 1,99	19,42	- 0,41	23 58,06	22,94
12	18 53,20	19,33	- 0,45	18 49,89	22,19
13	15 9,12	18,92	- 0,41	15 6,19	21,44
14	11 48,40	18,84	- 0,33	11 47,00	19,82
15	8 55,23	18,79	- 0,23	8 52,45	21,54
16	6 28,85	18,51	- 0,09	6 22,50	24,77
17	4 20,64	18,89	+ 0,06	4 17,28	22,31
18	2 39,96	19,22	0,20	2 36,77	22,31
19	1 24,27	18,90	0,35	1 21,00	22,73
20	0 33,69	18,81	0,50	0 30,10	22,90
22	0 5,87	18,84	0,72	0 2,44	22,99
23	0 28,25	18,59	0,80	0 25,84	21,80
24	1 17,28	18,95	0,83	1 13,99	23,06
25	2 27,01	18,90	0,83	2 26,91	19,83
26	4 7,00	18,87	0,81	4 4,56	22,12
27	6 10,14	18,61	0,72	6 6,87	22,60
28	8 37,23	18,63	0,63	8 33,94	22,64
29	11 31,06	18,74	0,49	11 25,38	24,91
Luglio 1	14 46,83	18,74	0,34	14 41,44	24,47
2	18 25,74	18,81	0,19	18 21,92	22,82
3	22 32,13	18,76	0,04	22 26,77	24,16
5	27 0,80	19,09	- 0,11	26 55,84	24,03
6	37 10,58	19,16	- 0,36	37 6,22	23,16
	42 52,43	19,14	- 0,46	42 47,30	24,81
				Medio	22 0 22,69
				Latitudine della Specola	45 28 0,70
				Obliquità apparente	23 27 38,01

Solstizio d'inverno 1826.

Giorni 1826.	Distanza meridiana apparente del Sole dallo zenit.	Rifraz. - parall.	Latitud. del Sole.	Riduzione al solstizio.	Distanza meridiana dell'eclittica dallo zenit nel solstizio.
Dicem. 7	68° 1' 53,85	2 15,35	" 0,47	51° 25,71	68° 55 35,38
9	14 43,97	2 15,72	0,25	38 36,38	36,32
11	25 42,04	2 19,61	- 0,04	27 35,09	36,70
12	30 30,03	2 20,47	- 0,18	22 45,41	35,73
18	49 50,66	2 17,66	- 0,78	3 29,38	36,93
22	53 15,46	2 21,50	- 0,55	0 0,34	34,55
23	52 56,23	2 20,75	- 0,44	0 18,83	35,37
24	52 8,96	2 21,34	- 0,29	1 5,68	34,99
26	49 8,16	2 21,38	+ 0,02	4 4,30	33,86
27	46 58,17	2 21,10	0,16	6 16,01	35,44
28	44 15,57	2 22,39	0,29	8 55,95	34,20
29	41 8,00	2 24,97	0,41	12 3,99	37,37
31	33 38,38	2 16,23	0,53	19 44,01	39,15
1827					
Genn. 1	29 0,08	2 18,02	0,55	24 15,77	34,42
2	18 37,83	2 16,29	0,48	34 42,03	36,63
3	6 23,67	2 13,86	0,28	46 57,51	35,32
				Medio . . .	68 55 35,77
				Latitudine della Specola . . .	45 28 0,70
				Obliquità apparente	23 27 35,07

Solsazio d'estate 1827.

Giorni 1827.	Distanza meridiana apparente del Sole dallo zenith.	Rifraz. - parall.	Latitud. del Sole.	Riduzione al solstizio.	Distanza meridiana dell'eclittica dallo zenith nel solstizio.
Giugno 8	22 39 12,89	19,53	" 0,22	- 38' 7,18	22° 0' 25,36
10	28 44,85	19,34	0,47	28 38,48	26,08
11	24 5,39	19,44	0,57	24 0,39	24,99
12	19 51,79	19,14	0,63	19 46,58	24,98
13	16 1,70	19,03	0,65	15 57,14	24,24
14	12 37,95	18,98	0,65	12 32,18	25,40
15	9 57,38	18,62	0,61	9 31,76	24,85
17	4 49,85	18,74	0,41	4 44,77	24,23
18	3 4,81	18,77	0,29	2 58,39	25,54
19	1 43,64	18,72	0,13	1 36,69	25,80
20	0 48,01	18,59	- 0,02	0 39,82	26,76
21	0 13,84	18,77	- 0,17	0 7,76	24,68
22	0 7,39	18,73	- 0,30	0 0,53	25,29
23	0 23,14	18,64	- 0,44	0 18,14	23,20
24	1 6,70	18,78	- 0,55	1 0,57	24,36
25	2 14,99	18,72	- 0,65	2 7,78	25,30
26	3 47,98	18,87	- 0,68	3 39,75	26,42
27	5 44,31	19,02	- 0,68	5 36,42	26,23
28	8 4,06	18,99	- 0,66	7 57,73	24,66
29	10 50,75	18,89	- 0,61	10 43,22	25,82
Luglio 1	14 0,98	18,74	- 0,52	13 54,02	25,18
2	17 34,73	18,98	- 0,41	17 28,82	24,48
3	21 34,08	18,94	- 0,28	21 27,94	24,80
4	25 57,05	18,93	- 0,12	25 51,22	24,64
	30 44,71	18,86	+ 0,04	30 38,62	24,99
Medio					
Latitudine della Speccola					
Obliquità apparente					
22 0 25,13					
45 28 0,70					
23 27 35,57					

Solstizio d'inverno 1827.

Giorni 1827.	Distanza meridiana apparente del Sole dallo zenit.	Rifraz. - parall.	Latitud. del Sole.	Riduzione al solstizio.	Distanza meridiana dell'eclittica dallo zenit nel solstizio.
Dicem. 8	68° 6' 53",79	2 17,24	- 0,80	46' 24",36	68° 55' 34",59
9	53 9,84	2 18,30	- 0,75	40 6,44	33,83
10	49 0,39	2 19,01	- 0,67	34 13,39	34,12
18	49 15,06	2 20,00	+ 0,42	3 56,76	32,24
19	50 53,05	2 21,51	0,50	2 15,18	30,24
20	52 6,35	2 22,45	0,54	1 1,84	31,08
22	53 6,12	2 23,46	0,52	0 0,13	30,23
24	52 20,33	2 18,30	0,35	9 51,76	30,76
25	51 13,61	2 21,27	0,25	2 0,06	35,17
26	49 31,82	2 20,72	0,08	3 36,06	29,28
27	47 26,03	2 21,82	- 0,07	5 41,46	29,24
28	44 59,08	2 21,69	- 0,22	8 14,46	30,01
29	41 54,22	2 23,40	- 0,35	11 15,52	32,79
30	38 24,78	2 21,70	- 0,49	14 44,55	30,54
31	34 33,00	2 21,50	- 0,62	18 41,55	35,43
1828					
Genn. 1	30 9,09	2 19,64	- 0,71	23 4,45	31,87
Medio					
Latitudine della Specola					
Obliquità apparente					
23 27 31,26					

Solstizio d'estate 1828.

Giorni 1828.	Distanza meridiana apparente del Sole dallo zenit.	Rifraz. - parall.	Latitud. del Sole.	Riduzione al solstizio.	Distanza meridiana dell'eclittica dallo zenit nel solstizio.
Giugno 8	22° 35' 6,21	19,22	+ 0,11	- 34' 58",51	22° 0 27,23
9	29 57,71	19,27	- 0,04	29 50,10	26,84
10	25 12,71	19,34	- 0,18	25 5,87	26,00
11	20 56,52	19,31	- 0,31	20 45,93	28,58
12	16 58,10	19,06	- 0,41	16 50,40	26,35
13	13 26,84	18,89	- 0,48	13 19,35	25,90
14	10 22,46	18,84	- 0,53	10 12,89	27,88
15	7 40,95	18,74	- 0,52	7 31,10	28,07
16	5 22,33	18,72	- 0,49	5 13,97	26,59
17	3 31,20	18,63	- 0,43	3 21,51	27,89
18	2 4,47	18,59	- 0,34	1 53,98	28,74
19	0 59,09	18,67	- 0,22	0 51,18	26,36
20	0 20,82	18,56	- 0,07	0 12,22	27,00
21	0 8,51	18,36	+ 0,08	0 0,02	25,93
22	0 20,12	18,38	0,24	0 11,65	27,09
23	0 55,56	18,64	0,39	0 48,03	26,56
24	1 56,39	18,73	0,53	1 49,18	26,47
25	3 23,15	18,72	0,64	3 14,04	28,47
26	5 14,02	18,94	0,74	5 5,60	28,10
27	7 27,96	18,72	0,81	7 20,77	26,72
28	10 8,50	18,61	0,82	10 0,55	27,38
29	13 14,36	18,65	0,82	13 4,74	29,09
30	16 39,90	18,71	0,79	16 33,41	25,99
Luglio 1	20 34,42	18,61	0,70	20 25,41	28,32
2	24 53,54	18,71	0,60	24 43,67	29,20
3	29 34,31	18,78	0,46	29 25,07	28,48
4	34 39,20	18,78	0,31	34 30,54	27,75
Medio					22° 0 27,37
Latitudine della Specola . . .					45 28 0,70
Obliquità apparente					23 27 33,33

Solstizio d'inverno 1828.

Giorni 1828.	Distanza meridiana apparente del Sole dallo zenit.	Rifraz. - parall.	Latitud. del Sole.	Riduzione al solstizio.	Distanza meridiana dell'eclittica dallo zenit nel solstizio.
Dicem. 5	67° 51' 7,21	2 15,26	'' 58	62° 8,56	68° 55' 31,61
6	67 58 26,94	2 15,75	0,68	54 50,68	34,05
7	68 5 15,71	2 14,95	0,76	47 59,32	30,74
10	23 10,93	2 16,86	0,75	30 6,43	34,97
13	36 50,72	2 22,36	0,44	16 19,23	32,75
15	43 44,72	2 22,56	0,14	9 26,34	33,76
16	46 28,42	2 23,33	- 0,01	6 41,84	33,58
19	51 55,29	2 22,20	- 0,40	1 16,98	34,07
22	53 6,44	2 20,62	- 0,57	0 6,31	32,80
23	53 32,92	2 22,90	- 0,55	0 39,36	34,53
28	42 45,36	2 19,02	- 0,04	10 28,58	32,92
29	39 21,22	2 17,98	+ 0,12	13 50,88	30,20
30	35 31,08	2 17,74	0,27	17 41,17	30,26
1829				Medio	68 55 32,51
Genn. 3	15 36,07	2 16,25	0,74	Latitudine della Specola	45 28 0,70
4	68 9 25,04	2 15,68	0,76	Obliquità apparente	23 27 31,81
8	67 40 28,40	2 13,34	0,58		

Solstizio d'estate 1829.

Giorni 1829.	Distanza meridiana apparente del Sole dallo zenit.	Rifraz. - parall.	Latitud. del Sole.	Ridezione al solstizio.	Distanza meridiana dell'eclittica dallo zenit nel solstizio.
Giugno 7	22 42 2,10	19,23	- 0,35	- 41 54,79	22 0 26,19
8	36 24,46	19,65	- 0,24	36 16,54	27,33
9	31 10,12	19,53	- 0,09	31 2,06	27,19
10	26 21,45	19,47	+ 0,06	56 12,45	28,53
11	21 53,61	19,49	0,23	21 46,75	26,58
12	17 53,66	19,50	0,38	17 45,44	28,10
13	14 17,40	19,36	0,51	14 8,61	28,66
14	11 4,26	19,05	0,62	10 55,39	28,64
15	8 16,61	18,98	0,72	8 8,57	27,74
16	5 54,11	18,72	0,77	5 45,48	28,12
17	3 55,80	18,76	0,78	3 47,07	28,27
18	2 23,34	18,52	0,78	2 13,09	29,25
19	1 14,16	18,93	0,71	1 4,48	29,32
20	0 28,21	18,94	0,62	0 20,53	27,24
21	0 10,21	18,73	0,52	0 0,97	28,48
22	0 14,86	18,75	0,38	0 6,41	27,58
23	0 45,90	18,68	0,22	0 36,64	28,16
24	1 41,31	18,62	0,07	1 31,67	28,23
25	3 0,38	18,52	- 0,08	2 51,40	27,32
26	4 47,36	18,66	- 0,21	4 35,92	29,89
27	6 55,94	18,67	- 0,34	6 45,07	29,20
30	15 51,35	19,13	- 0,57	15 40,12	29,99
Luglio 3	28 22,58	19,29	- 0,47	28 14,65	26,71
4	33 25,30	19,11	- 0,38	33 14,45	29,58
5	38 48,11	19,17	- 0,27	38 38,21	28,80
6	44 36,01	19,19	- 0,12	44 25,82	29,26
Medio					
Latitudine della Specola					
Obliquità apparente					
23 27 32,41					

Volendo ridurre l' obliquità apparente alla media colla nutazione lunisolare già usata in tutte le precedenti osservazioni, cioè colla formula

$$- 9'',63 \cos N - 0'',49 \cos 2S$$

nella quale N esprime la longitudine del nodo ascendente della Luna, e S la longitudine vera del Sole, avremo nei

Solstizj d'estate.

Anno.	Numero dei giorni d'osser- vazione.	Obliquità apparente dell'eclittica.	Nutazione luni- solare.	Obliquità media dell'eclittica.
1825	28	23° 27' " 41,68	- 2,10	23° 27' " 43,78
1826	31	38,01	5,11	43,12
1827	25	35,57	7,65	43,22
1828	27	33,33	9,38	42,71
1829	26	32,41	10,10	42,51

Solstizj d'inverno.

1825	4	23° 27' 39,14	3,64	23° 27' 42,72
1826	16	35,07	6,47	41,54
1827	16	31,26	8,63	39,89
1828	16	31,81	9,88	41,99

Nell' insigne opera *Fundamenta Astronomiae* pubblicata nell'anno 1818 il celebre professore Bessel ha dedotto dalle fondamentali formole della *Meccanica celeste* di Laplace un'espressione della nutazione lunisolare più estesa, comprendendovi due nuovi termini dipendenti dalla doppia longitudine della

Luna e dalla doppia longitudine del suo nodo ascendente. Questi termini per verità tenuissimi arrivano appena alla centesima parte del termine principale, che ha per argomento la semplice longitudine del nodo, e perciò furono da Laplace ommessi come insensibili. Ora però gli astronomi, provveduti d'istromenti molto perfezionati, aspirano ad una maggiore esattezza e richiedono dalla teoria l'espressione dei termini che arrivano solamente a un decimo di secondo in arco.

Ritenuta la significazione di N , S data sopra, ed indicando con L la longitudine vera della Luna, la nutazione dell'obliquità dell'eclittica trovata dal professore Bessel, da applicarsi all'obliquità apparente per ridurla alla media, è

$$- [9'',6480 \cos N - 0'',09423 \cos 2N + 0'',09390 \cos 2L] (1+i)$$

$$- [0'',4933 - 1'',2452 \cdot i] \cos 2S.$$

La massa della Luna è in generale $= \frac{1+i}{69,2376 - 178,2918 \cdot i}$
e nel caso di $i = 0$ questa massa risulta $\frac{1}{69,2376}$ di quella
della Terra, e la nutazione dell'obliquità

$$- 9'',648 \cos N - 0'',493 \cos 2S$$

$$+ 0'',094 \cos 2N - 0'',094 \cos 2L.$$

I primi due termini sono sensibilmente quegli stessi usati nella riduzione delle precedenti osservazioni. Il professore Bessel ha poi adottata (*) col barone Lindenau la massa della Luna $= \frac{1}{87,73}$, e ne venne quindi $i = - 0,069541$, e la nutazione dell'obliquità

$$- 8'',977 \cos N - 0'',580 \cos 2S$$

$$+ 0'',088 \cos 2N - 0'',087 \cos 2L.$$

(*) Veggasi la rinomata opera del professore Schumacher, *Astronomische Nachrichten*, Bd. 34, 83 e 133.

Ultimamente il celebre geometra Poisson, a cui si devono dei teoremi importantissimi nella teoria delle perturbazioni dei pianeti, s' accinse a perfezionare la teoria della precessione degli equinozj, e ne ricavò le formole della nutazione trovate già dal professore Bessel. Servendosi egli poi delle masse dei pianeti date da Laplace nella quinta edizione dell'*Esposizione del sistema del mondo*, ed in particolare facendo la massa della Luna = $\frac{1}{75}$ di quella della Terra, trovò la nutazione dell' obliquità dell' eclittica, presa con segno contrario (*),

$$\begin{aligned} & - 9'',4004 \cos N - 0'',519 \cos 2S \\ & + 0'',0917 \cos 2N - 0'',092 \cos 2L. \end{aligned}$$

Questa espressione, intermedia fra le due date dal professore Bessel, è stata calcolata ed applicata alle obliquità apparenti dei solstizj osservati col nostro cerchio nei decorsi diciotto anni, e trovasi nelle due seguenti tavole:

(*) Mémoire sur le mouvement de la Terre autour de son centre de gravité, lu à l'Académie des sciences le 30 avril 1827 par M. Poisson.

Solstizi d'inverno.

Anno.	Numero dei giorni d'osserv.	Obliquità apparente dell'eclittica.	Nutazione secondo Poisson.	Obliquità media dell'eclittica.
1810	14	23° 27' 39,77"	+ 9,99	23° 27' 49,76"
1811	15	38,68	9,44	48,12
1812	8	39,11	8,90	47,11
1813	14	40,64	5,65	46,29
(*) 1814	5	43,16	2,62	45,78
1815	10	43,68	- 0,59	43,09
1816	15	46,36	- 3,50	42,86
1817	9	48,17	- 5,98	42,19
1818	20	52,88	- 7,92	44,96
1819	10	50,57	- 8,80	41,77
1820	7	51,15	- 8,53	42,62
1821	14	49,55	- 7,39	42,16
1822	22	44,89	- 5,49	39,40
1823	21	42,62	- 2,70	39,92
1824	20	43,34	+ 0,47	43,81
1825	4	39,14	3,54	42,68
1826	16	35,07	6,25	41,32
1827	16	31,26	8,48	39,74
1828	16	31,81	9,86	41,67

Le osservazioni fatte nei solstizi jemali degli anni 1814, 1815, 1816, 1817, 1819 e 1820 furono ommesse nelle nostre precedenti Effemeridi, ma si daranno nelle Effemeridi seguenti.

Solstizj d'estate.

Anno.	Numero dei giorni d'osserv.	Obliquità apparente dell'eclittica.	Nutazione secondo Poisson.	Obliquità media dell'eclittica.
1811	10	23° 27' " 41,17	+ 9,98	23° 27' " 51,15
1812	16	41,70	8,91	50,61
1813	16	42,83	6,80	49,63
1814	20	45,01	4,15	49,16
1815	21	49,23	1,18	50,41
1816	21	52,90	- 2,09	50,81
1817	26	54,99	- 4,95	50,04
1818	26	53,77	- 7,06	46,71
1819	30	55,64	- 8,32	47,32
1820	24	55,82	- 8,83	47,09
1821	24	55,11	- 8,22	46,89
1822	30	51,79	- 6,57	45,22
1823	25	51,02	- 4,05	46,97
1824	28	47,80	- 1,26	46,54
1825	28	41,68	- 1,90	43,58
1826	31	38,01	5,05	43,06
1827	25	35,57	7,59	43,16
1828	27	33,33	9,17	42,50
1829	26	32,41	9,94	42,35

Limitandoci ora a confrontare le obliquità medie degli anni 1810 e 1811 con quelle degli anni 1828 e 1829, nei quali la nutazione era vicina al suo massimo valore, abbiamo nei solstizj d'inverno

1810		23 ^h 27' 49",76	Differenza 8",09
1828		23 27 41 ,67	

$$\text{e la diminuzione annua} = \frac{8'',09}{18} = 0'',449$$

nei solstizj d'estate.

1811		23 ^h 27' 51",15	Differenza 8",80
1829		23 27 42 ,35	

$$\text{e la diminuzione annua} = \frac{8'',80}{18} = 0'',480.$$

La maggiore copia delle buone osservazioni d'estate, soggette a minore influenza delle rifrazioni, ci consiglia a preferire la seconda determinazione alla prima, e possiamo quindi ritenere = 0'',480 la diminuzione annua dell'obliquità media dell'eclittica.

SULLA PICCOLA INEGUAGLIANZA

DEL MOTO DELLA TERRA

CHE HA PER ARGOMENTO LA LONGITUDINE DEL SOLE
MENO IL PERIGEO DELLA LUNA

DI

FRANCESCO CARLINI.

Gli elementi dell'orbita del Sole che si adoperano anche attualmente dagli astronomi si fondano sopra le osservazioni di Bradley e di Maskeline fatte in un corso di anni compreso fra il 1752 ed il 1802, calcolate e discusse dal signor Delambre. Pochi anni erano passati dalla pubblicazione delle sue tavole, quando il signor Burckhardt (*Connaiss. des tems pour 1816*) avendo intrapresa una nuova disamina, trovò necessarie alcune piccole emendazioni, le quali cadevano principalmente sulla quantità di massa attribuita alla Luna, sull'epoca dell'anomalia media del Sole e sul moto medio in longitudine. La necessità di quest'ultima correzione si è resa col progresso del tempo sempre più manifesta, e fu successivamente riconosciuta dal signor Ricchebach (*Opuscoli astronomici, Roma 1824*), dal signor Brioschi (*Commentarij astronomici, vol. I, Napoli 1824 e 1826, pag. 200*), dal signor

App. Eff. 1830.

South (*Transazioni filosofiche, Londra* 1826, pag. 423) e dal signor G. B. Airy (*Trans. filos.* 1828, pag. 23). Ultimamente il signor Bessel (*Astronom. Nachrichten*, n.^o 135) avendo presi ad esaminare tutti gli elementi dei moti dal Sole, ha compilate alcune compendiose tavole contenenti le correzioni che conviene applicare a quelle da me pubblicate nel 1810.

Desiderando io di porre a profitto i lavori di questi valenti calcolatori, mi sono accinto a rifondere interamente le mie prime tavole ed a rettificarle sui dati più certi e più recenti. Una difficoltà però mi rimaneva da rischiarare concernente ad alcune ineguaglianze del moto della Terra prodotte dalla perturbazione lunare, le quali sfuggendo per la loro piccolezza ad ogni indagine fondata sul confronto delle immediate osservazioni, non potevano essere determinate che per mezzo dell'analisi d'un caso assai spinoso e complicato del problema dei tre corpi.

Questo problema, qualunque sia il metodo con cui si tratta, conduce ad equazioni differenziali di primo o di second' ordine, le quali contengono nel secondo membro delle funzioni delle coordinate stesse che debbonsi determinare, moltiplicate per un coefficiente dell'ordine della forza perturbatrice. Allorchè si trascurano le potenze superiori di questa forza, basta sostituire nelle accennate funzioni i valori delle coordinate ellittiche, ed in tal modo si ottengono delle espressioni non molto complicate ed in gran parte simmetriche. Questo grado d'approssimazione è stato ritenuto come sufficiente nel calcolo delle perturbazioni dei pianeti sul moto della Terra dato nella Meccanica celeste del signor Laplace: solo la formola che rappresenta la perturbazione lunare (*tomo III, pag. 107*) contiene implicitamente dei termini appartenenti alle ulteriori approssimazioni; poichè a differenza delle altre è espressa non in funzione del tempo, ma in funzione delle longitudini della Luna e del Sole prese nelle rispettive orbite perturbate.

Almeno in questo senso, per rispetto alle coordinate della Luna, fu interpretata quella formola dal signor Delambre, il quale nell' Introduzione alle sue tavole solari (foglio b, pag. 6) premette la seguente avvertenza: *Jusqu'ici on s'était contenté, pour l'équation lunaire, de former l'argument par la comparaison des lieux moyens du Soleil et de la Lune; mais cette inégalité dépend de la distance angulaire vraie. L'erreur pouvait aller à 1",2; car la somme des inégalités du Soleil et de la Lune est de 8°.* Indi presenta il valore dell' elongazione vera, nella quale introduce non solo le due equazioni del centro, ma ancora l'Evezione, la Variazione e l'equazione annua. Nelle tavole poi, sebbene espressamente non si dica, vedesi che il coefficiente dell' ineguaglianza lunare fu fatto proporzionale al raggio vettore della Luna preso nell' orbita perturbata. Nelle mie tavole solari, avendo voluto ridurre gli argomenti in parti del moto medio diurno rispettivo, mi fu necessario sostituire all' originaria formola della perturbazione prodotta dalla Luna il suo svolgimento in funzione di angoli proporzionali al tempo (*V. Esposizione d'un nuovo metodo di costruire le tavole astronomiche*, pag. XIX). In quell' occasione io feci avvertire che non tutti i termini che nascevano dallo svolgimento stesso potevansi ritenere come realmente dati dalla teoria; ma non avendo allora un criterio sicuro per distinguere dagli altri quei termini che cadevano sotto una tale eccezione, presi il partito di conservare nel calcolo le due inegualianze che si presentavano per le prime nell' ordine delle grandezze numeriche de' coefficienti, e di trascurare tutte le altre, nessuna delle quali oltrepassava due decime di secondo. I lavori che ho eseguiti posteriormente intorno alla teoria analitica dei moti della Luna avendomi procacciata una certa pratica in questo genere di calcoli, mi mettono ora in grado di risolvere la difficoltà allora promossa.

Poichè il teorema del moto del centro di gravità d'un sistema di corpi (*), sul quale si fonda la formula sinora usata nelle tavole solari, è sicuramente esatto entro il limite della quantità $\frac{a}{a'}$, la quale esprime il rapporto delle distanze medie dalla Terra del Sole e della Luna, sembrerebbe a primo aspetto che la formula stessa non dovesse differire dal vero se non in que' termini che nascerebbero dallo svolgimento delle inegualianze del moto lunare che chiamansi parallatiche; sotto il qual nome si comprendono tutte quelle che sono moltiplicate per la suddetta quantità $\frac{a}{a'}$, ed i cui argomenti contengono i multipli dispari dell'elongazione della Luna dal Sole. Se così fosse, trascurati soltanto i termini moltiplicati per le potenze superiori di $\frac{a}{a'}$, la formula dovrebbe ritenersi come geometricamente esatta per rispetto alle altre quantità piccolissime e, e', γ, m . Ma per rispetto a quest'ultima conviene avvertire che in molti termini il fattore m^* è introdotto dall'eliminazione del rapporto $\frac{a^3}{a'^3}$, cosicchè in simil caso, sebbene i suddetti termini non siano esplicitamente moltiplicati per $\frac{a}{a'}$,

(*) Il teorema di cui si tratta nella Meccanica analitica del Lagrange trovò espresso in questi precisi termini: *Le mouvement du centre de gravité d'un système libre de corps est toujours le même que si les corps étaient tous réunis dans un seul point, et qu'en même tems chacun d'eux fut animé des mêmes forces accélératrices que dans leur état naturel.* A maggiore schiarimento di questa proposizione non sarà forse inutile il far avvertire che sarebbe un errore il supporre che le forze acceleratrici da cui sarebbero animati i corpi se fossero riuniti nel centro di gravità siano le stesse che quelle che su di essi agiscono nel loro stato naturale. Noi potremo dunque far astrazione dalle azioni reciproche quando calcoleremo il moto del centro di gravità, ma non potremo fare del pari astrazione dai cangimenti nelle posizioni dei diversi corpi prodotti dalle azioni suddette dove queste posizioni entrano come elemento delle forze acceleratrici da cui ciascun corpo è animato.

entrano ciò nulla ostante nel numero di quelli che non possono dedursi dal teorema sopra enunciato. Questa eccezione poi si estende ancora ad altri termini ancorchè non moltiplicati per m^2 ; il che avviene tutte le volte che il termine corrispondente della perturbazione della Luna abbia perduta una o più dimensioni in conseguenza delle integrazioni. La prima inegualianza di tal natura che si presenta nel calcolo della perturbazione della Terra è quella che ha per argomento la longitudine del Sole meno il périgeo lunare, o ciò che è lo stesso la differenza fra l' elongazione e l' anomalia della Luna, poichè deriva immediatamente dall'Evezione, che è la prima fra le inegualianze lunari che nelle integrazioni subiscano un cambiamento nel loro ordine analitico di grandezza. In generale indicando

per brevità con b^2 il rapporto $\frac{a}{a'}$ e con $E\nu$ l' elongazione $v - m\nu$, e conservando del resto le denominazioni introdotte nella teoria della Luna del signor Laplace, troveremo che il teorema del moto del centro di gravità può darci esattamente i primi termini dei coefficienti di $\sin E\nu$, $\sin(E \pm c'm)\nu$, $\sin(E \pm 2c'm)\nu$, ecc.; ma ci darebbe dei coefficienti inesatti ed erronei quando si volesse estenderlo 1.^o ai termini moltiplicati per b^4 , b^6 , ecc.; 2.^o ai coefficienti di $\sin(E \pm c)\nu$, $\sin(E \pm c'm \pm c)\nu$, ecc.; 3.^o ai termini ulteriori dei coefficienti di $\sin(E \pm c'm)\nu$, $\sin(E \pm 2c'm)\nu$, ecc., nel calcolo de' quali non può trascurarsi l' influenza dell' equazione annua della Luna.

Questa conclusione, che qui si deduce *a priori* dalla natura stessa del problema, si vedrà confermata dall'immediato calcolo fondato sull' integrazione delle equazioni differenziali che esporremo compendiosamente. Noi ci occuperemo in appresso nella determinazione de' coefficienti numerici in quanto dipendono dalla massa della Luna; pel quale oggetto ci verrà entrare in diverse discussioni relative alle formole della precessione e della nutazione dei punti equinoziali, della parallasse della Luna e della gravità terrestre dedotta dalla

lunghezza del pendolo semplice che batte i secondi a diverse latitudini. In tali disamine procureremo di tener conto delle più piccole quantità, la cui omissione lasciar potrebbe qualche incertezza sul valor finale della massa della Luna determinato con metodi diversi. Alcune delle avvertenze che qui proporremo sembreranno forse ad alcuno troppo minute, ma se si considereranno le circostanze tutte della questione, si riconoscerà di leggieri che chi volesse trascurare alcune delle suddette quantità piccolissime, conservandone ad arbitrio alcune altre di egual ordine di grandezza, potrebbe entro un certo limite ottenere per la massa lunare quel valore numerico che più gli aggrada.

Equazioni generali del problema.

1.^o Considerando il solo moto relativo della Luna e del Sole attorno alla Terra, siano x, y, z le coordinate rettangole del centro della Luna, ed x', y', z' le corrispondenti del centro del Sole, riferite le une e le altre al piano dell'eclittica ed al centro della Terra, si avranno, come è noto, rispetto alle tre prime le equazioni differenziali

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{d\Omega}{dx}, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{d\Omega}{dy}, \quad \frac{d^2z}{dt^2} = \frac{d\Omega}{dz},$$

dove

$$\Omega = \frac{\sigma}{r} - \frac{M'}{r'^3} (xx' + yy' + zz') + M' \{ (x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2 \}^{-\frac{1}{2}},$$

indicando con σ la somma delle masse della Terra e della Luna, con M' la massa del Sole, e con r ed r' i raggi vettori assoluti dei suddetti due corpi presi dal centro della Terra.

2.^o Per rispetto alle altre coordinate si avrà del pari

$$\frac{d^2x'}{dt^2} = \frac{d\Omega'}{dx'}, \quad \frac{d^2y'}{dt^2} = \frac{d\Omega'}{dy'}, \quad \frac{d^2z'}{dt^2} = \frac{d\Omega'}{dz'},$$

posto

$$\Omega' = \frac{\sigma'}{r'} - \frac{M}{r'^3} (xx' + yy' + zz') + M \{ (x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (z'-z)^2 \}^{-\frac{1}{2}},$$

ed indicando con M la massa della Luna e con σ' la somma delle masse della Terra e del Sole.

Noi supporremo nei seguenti calcoli che le espressioni analitiche delle coordinate rettangole x, y, z , e quelle delle coordinate polari che ad esse corrispondono, siano già date in funzione del tempo e sotto forma di serie che procedano secondo le potenze e i prodotti delle eccentricità, delle inclinazioni e dei rapporti dei moti medj e delle medie distanze.

3.^o Se questi valori si suppongono sostituiti nelle equazioni relative alle coordinate x', y', z' , si vede facilmente che, eseguiti gli svolgimenti e le integrazioni, le potenze e i prodotti suddetti vi compariranno tutti di nuovo sotto forme diversamente modificate; di modo che volendo spingere il calcolo della perturbazione del Sole fino ai termini d'un dato ordine per rispetto alle quantità piccolissime e, e', γ, b^a , converrà conservare i termini d'egual ordine nell'espressione delle perturbazioni della Luna. Questa regola però soffre alcune eccezioni per rispetto alle dimensioni del rapporto m dei moti medj, il quale nelle diverse differenziazioni ed integrazioni passando spesso al denominatore viene a turbar l'ordine delle approssimazioni, cosicchè accadrà talvolta che per ottenere nella perturbazione del Sole i termini dell'ordine m^i converrà conservare nella perturbazione della Luna quelli degli ordini m^{i+1} ed m^{i+2} . Da ciò si può facilmente conghetturare quale immensità di calcoli si dovrebbe intraprendere se si volessero spingere le approssimazioni soltanto fino alle quantità di quart' ordine per rispetto alle eccentricità ed alle inclinazioni. Ma poichè a motivo della piccolezza della massa della Luna sappiamo già che il valor numerico della total perturbazione da essa esercitata sul Sole è quantità poco considerabile, potremo qui limitare gli svolgimenti a poche dimensioni; anzi nelle nostre ricerche preliminari ci accontenteremo di considerare i termini indipendenti dalle eccentricità e dalle

inclinazioni suddette, e quelli che sono moltiplicati per la sola prima potenza delle eccentricità e ed e' , ordinando però le operazioni in modo da poterle all'uopo estendere agli altri termini successivi. E qui è cosa essenziale l'avvertire che una siffatta separazione dei termini di diversi ordini non tende già a farci trovare dei valori i quali non siano veri se non in quanto si omettono nel calcolo delle quantità piccolissime, ma tende a somministrarci il valore analitico esatto ed indipendente da qualunque particolar supposizione del coefficiente che moltiplica un dato termine nello svolgimento delle coordinate che si vogliono considerare.

Equazioni differenziali nel caso in cui si trascurino i termini dipendenti dalle inclinazioni.

4.^o Nel caso che qui si considera, presa l'eclittica fissa per piano delle coordinate, dovremo porre z e $z' = 0$. Le equazioni da risolversi saranno allora

$$(a) \quad \frac{d^*x'}{dt^*} = \frac{d\Omega'}{dx'}, \quad \frac{d^*y'}{dt^*} = \frac{d\Omega'}{dy'},$$

dalle quali si dedurrà colle solite combinazioni

$$(b) \quad d \cdot \frac{x'dy' - y'dx'}{dt} = \left(x' \frac{d\Omega'}{dy'} - y' \frac{d\Omega'}{dx'} \right) dt$$

$$(c) \quad x' \frac{d^*x'}{dt} + y' \frac{d^*y'}{dt} = d \cdot \frac{x'dx' + y'dy'}{dt} - \frac{dx'^2 + dy'^2}{dt} \\ = \left(x' \frac{d\Omega'}{dx'} + y' \frac{d\Omega'}{dy'} \right) dt.$$

5.^o Introducendo in luogo di x' ed y' le nuove coordinate u' e v' determinate dalle equazioni

$$x' = \frac{\cos v'}{u'}, \quad y' = \frac{\sin v'}{u'}$$

ossia $\tan u' = \frac{y'}{x'}, \quad \frac{1}{u'^3} = x'^2 + y'^2,$

si avrà $du' = -u'^3(x'dx' + y'dy'), \quad dv' = u'^2(x'dy' + y'dx')$

e quindi

$$\begin{aligned} d\Omega' &= \frac{d\Omega'}{du'} du' + \frac{d\Omega'}{dv'} dv' \\ &= -u'^3 \frac{d\Omega'}{du'} (x'dx' + y'dy') + u'^2 \frac{d\Omega'}{dv'} (x'dy' - y'dx'). \end{aligned}$$

Essendo questa quantità identica con $\frac{d\Omega'}{dx'} dx' + \frac{d\Omega'}{dy'} dy'$, dovrà essere

$$\frac{d\Omega'}{dx'} = -x'u'^3 \frac{d\Omega'}{du'} - y'u'^2 \frac{d\Omega'}{dv'}, \quad \frac{d\Omega'}{dy'} = -y'u'^3 \frac{d\Omega'}{du'} + x'u'^2 \frac{d\Omega'}{dv'},$$

dove si deduce $x' \frac{d\Omega'}{dy'} - y' \frac{d\Omega'}{dx'} = \frac{d\Omega'}{du'}$.

Con ciò l'equazione (b) diverrà

$$d \cdot \frac{x'dy' - y'dx'}{dt} = d \cdot \frac{dv'}{u'^2 dt} = \frac{d\Omega'}{dv'} dt.$$

Moltiplicando ora i due membri per $2 \frac{dv'}{u'^2 dt}$, integrando ed indicando con h^2 la costante dell'integrazione, si avrà

$$(d) \quad dt = \frac{dv'}{u'^2} \left(h^2 + 2 \int \frac{d\Omega'}{dv'} \cdot \frac{dv'}{u'^2} \right)^{-\frac{1}{2}},$$

nella quale espressione v' è divenuta la variabile principale in luogo di t , cosicché converrà riguardare dv' come costante.

6.^o Eseguendo le medesime sostituzioni nell'equazione (c), si trova

$$d \cdot \frac{du'}{u'^3 dt} + \frac{dv'^2}{u'^2 dt} + \frac{du'^2}{u'^4 dt} = u' \frac{d\Omega'}{du'} dt.$$

Ora differenziando la frazione $\frac{du'}{u'^3 dt}$, si ha

$$\begin{aligned} d \cdot \frac{du'}{u'^3 dt} &= \frac{d^2 u'}{u'^3 dt} - du' \frac{d(u'^3 dt)}{(u'^3 dt)^2} \\ &= \frac{d^2 u'}{u'^3 dt} - \frac{du'}{u'^3 dt} \left(\frac{du'}{u'} + \frac{d(u'^3 dt)}{u'^2 dt} \right); \end{aligned}$$

dunque l'equazione precedente moltiplicata per $\frac{u'^3 dt}{dv'^2}$ diverrà

$$\frac{d^2 u'}{dv'^2} + u' - \frac{du'}{dv'^2} \cdot \frac{d(u'^3 dt)}{u'^2 dt} = \frac{u'^4 dt^2}{dv'^2} \cdot \frac{d\Omega'}{du'}.$$

Il valore di $\frac{d(u'^3 dt)}{u'^3 dt}$ si deduce dall'equazione (d), la quale moltiplicata per u'^3 e differenziata dà

$$\frac{d(u'^3 dt)}{u'^3 dt} = - \frac{\frac{d\Omega'}{dv'} \cdot \frac{dv'}{u'^2}}{h'^2 + 2 \int \frac{d\Omega'}{dv'} \cdot \frac{dv'}{u'^2}}.$$

Dalla stessa equazione si ha

$$\frac{u'^4 dt^2}{dv'^2} = \frac{1}{h'^2 + 2 \int \frac{d\Omega'}{dv'} \cdot \frac{dv'}{u'^2}};$$

verrà dunque

$$(e) \left(u' + \frac{d^2 u'}{dv'^2} \right) \left(h'^2 + 2 \int \frac{d\Omega'}{dv'} \cdot \frac{dv'}{u'^2} \right) = \frac{d\Omega'}{du'} - \frac{du'}{u'^2 dv'} \cdot \frac{d\Omega'}{dv'} \quad (*).$$

Le equazioni (d) ed (e) sono quelle dalle quali dovrà dedursi il valore della longitudine vera v' del Sole progettata sull'eclittica, e quello del raggio vettore $\frac{1}{u'}$ pure progettato sull'eclittica.

(*) Laplace, Méc. céleste, V. I, p. 150; Gautier, Essai historique etc., p. 125.

Svolgimento della funzione Ω' .

7.^o Poichè abbiamo fatto $x' = \frac{\cos v'}{u'}, y' = \frac{\sin v'}{u'},$
 facciamo del pari $x = \frac{\cos v}{u}, y = \frac{\sin v}{u},$

il valore di Ω' diverrà

$$\Omega' = \sigma' u' - M \frac{u^2}{u'} \cos(v - v') + M \left\{ \frac{1}{u'^2} - 2 \frac{\cos(v - v')}{u u'} + \frac{1}{u'^3} \right\}^{-\frac{1}{2}}.$$

Questa funzione deve svolgersi secondo le potenze di $\frac{u'}{u}$, quantità piccolissima e dell'ordine del rapporto delle distanze medie, ossia della quantità che abbiamo chiamata b^3 . Se il calcolo non si vuole spingere al di là delle prime dimensioni di questa costante, dovremo trascurare u'^3 a fronte di u^3 , e quindi anche u' a fronte di $\frac{u^2}{u'}$. Ora la parte radicale del valore di Ω' essendo svolta in serie, dà per primo termine $M \left(\frac{1}{u'^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = Mu'$; dunque dovrà omettersi a fronte dei termini precedenti, di guisa che si avrà semplicemente

$$\Omega' = \sigma' u' - M \frac{u^2}{u'} \cos(v - v').$$

8.^o Prendendo i differenziali parziali di questa funzione e sostituendoli nelle equazioni (d) ed (e), si avrà

$$\begin{aligned} & \left(u' + \frac{d^2 u'}{d v'^2} \right) \left(h'^2 - 2M \int \frac{u^2}{u'^3} \sin(v - v') dv' \right) \\ &= \sigma' + M \frac{u^2}{u'^2} \cos(v - v') - M \frac{du'}{dv'} \cdot \frac{u^2}{u'^3} \sin(v - v') \\ & \frac{dt}{dv'} = \frac{1}{u'^2} \left\{ h'^2 - 2M \int \frac{u^2}{u'^3} \sin(v - v') dv' \right\}^{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

ossia, dividendo per h^3 e ponendo per brevità

$$R' = \frac{M}{h^3} \cdot \frac{u^3}{u'^3} \sin(\nu - \nu'), \quad Q' = \frac{M}{h^3} \cdot \frac{u^3}{u'^3} \cos(\nu - \nu'),$$

$$(f) \quad u' + \frac{d^2 u'}{d\nu'^2} = \frac{\sigma'}{h^2} + 2 \left(u' + \frac{d^2 u'}{d\nu'^2} \right) \int R' d\nu' + \frac{du'}{d\nu'} R' + u' Q',$$

$$(g) \quad \frac{dt}{d\nu'} = \frac{1}{h^3 u'^3} \left\{ 1 - 2 \int R' d\nu' \right\}^{-\frac{1}{2}}.$$

9.^o Supponiamo che il valore di u' sia svolto in una serie della forma

$$u' = C + C' \cos(c'\nu' - \varpi') + C'' \cos(a\nu' - \varpi'') + C''' \cos(\beta\nu' - \varpi''') + \text{ecc.},$$

il termine C , che contiene tutto quello che vi è di costante nella funzione u' messa sotto la forma succennata, avrà un valore fisso e determinato, ed in senso analitico potrebbe dirsi il valor medio di u' ; ma poichè in astronomia si ritiene comunemente per valor medio d'una quantità la semisomma del massimo e del minimo, per evitare ogni equivoco chiameremo la costante C il termine costante di u' in funzione di ν' .

Fra i termini periodici che vengono appresso, uno, per esempio $C' \cos(c'\nu' - \varpi')$, deve contenere le due costanti arbitrarie dovute all'equazione differenziale di second'ordine, e queste possono essere le due C e ϖ' . E poichè diverrebbe inutile l'introdurre nel calcolo un maggior numero di costanti arbitrarie, potremo determinare le altre costanti in modo da soddisfare all'equazione suddetta.

10.^o S'immagini ora che nel secondo membro dell'equazione (f) sieno stati sostituiti i valori delle coordinate u , ν , u' in funzione di ν' , il termine costante che ne risulterà sarà necessariamente della forma

$$\frac{\sigma'}{h^2} + A M b^3 + B M^3,$$

ciò che si riconosce riflettendo 1.^o che i termini moltiplicati per $\sin(\nu - \nu')$, $\cos(\nu - \nu')$ non possono produrre termini costanti se quei fattori non si combinano con seni e coseni degli stessi angoli esistenti nei valori delle coordinate u , ν , u' ; 2.^o che le ineguaglianze delle coordinate della Luna che contengono la semplice elongazione sono tutte moltiplicate per b^2 ; 3.^o che i termini analoghi delle coordinate del Sole, dei quali abbiamo intrapreso il calcolo, sono necessariamente moltiplicati per M . Dunque se nel calcolo attuale non si vogliono considerare i termini dell'ordine Mb^2 e dell'ordine M^2 , il termine costante di cui si tratta sarà semplicemente $= \frac{\sigma'}{h^2}$.

11.^o Allo stesso modo si può dimostrare che l'angolo $c'\nu' - \varpi'$ non può entrare nel secondo membro dell'equazione (f) se non moltiplicato per Mb^2 o per M^2 ; trascurando dunque le quantità di questi ordini e sostituendo nel primo membro dell'equazione il valore attribuito ad u' , l'equazione stessa diverrà

$$\begin{aligned} C + (1 - c'^2) C' \cos(c'\nu' - \varpi') + (1 - \alpha^2) C'' \cos(\alpha\nu' - \varpi'') \\ + (1 - \beta^2) C''' \cos(\beta\nu' - \varpi''') + \text{ecc.} \\ = \frac{\sigma'}{h^2} + 0 \cdot \cos(c'\nu' - \varpi') + D'' \cos(\alpha\nu' - \varpi'') + D''' \cos(\beta\nu' - \varpi''') + \text{ecc.}, \end{aligned}$$

e rimanendo C' e ϖ' indeterminate, si avrà subito

$$C = \frac{\sigma'}{h^2}, \quad c' = 1.$$

Ma poichè queste due determinazioni non sono vere che prossimamente, noi continueremo a considerare C e c' come le rappresentazioni del valore esatto e totale di queste due quantità: una tale avvertenza è indispensabile per rispetto a c' , la quale entra sotto i seni e coseni moltiplicata per ν' , cioè per un angolo che cresce indefinitamente col tempo; solo nei

luoghi ov' essa comparisce come fattore dei coefficienti sarà lecito sostituire il suo valore approssimato (*).

12.^o Poichè nei problemi dinamici (*Lagrange, Méc. anal.*, t. I, p. 256) si può per facilitare i calcoli, od almeno per abbreviarne la scrittura, sopprimere un numero di costanti arbitrarie eguale a quello delle incognite, da restituirsi poi alla fine dell'operazione, noi porremo qui eguali a zero l'epoca dell'anomalia = ω' e l'epoca della longitudine che verrebbe introdotta nel calcolo dall'integrazione dell'equazione (g); e

(*) Da quanto abbiamo detto si scorge che nel problema delle reciproche attrazioni di tre soli corpi, l'angolo $c'\nu' - \omega'$, che corrisponde prosimamente all'anomalia media nel moto ellittico, è composto di due parti, l'una $c'\nu'$ progressiva e semplicemente proporzionale all'angolo ν' , l'altra ω' assolutamente costante. Per determinare in questo problema la piccola quantità di cui il coefficiente c' differisce dall'unità basterebbe spingere più oltre il calcolo tenendo conto dei termini d'un ordine superiore per rispetto alle quantità piccolissime b^2 ed M . La cosa va diversamente quando si vogliono considerare tutte insieme le azioni dei diversi corpi del sistema solare sopra la terra; poichè allora conviene introdurre nel valore di ν' altrettante inegualanze della forma

$$C' \cos(c'\nu' - \omega') , \quad C'' \cos(c''\nu' - \omega'') , \quad C''' \sin(c'''\nu' - \omega''') \text{ ecc.}$$

nelle quali C' , C'' , C''' , ecc., ω' , ω'' , ω''' , ecc. sono ancora quantità assolutamente costanti, e c' , c'' , c''' , ecc. sono le radici d'una equazione algebrica di grado eguale al numero dei pianeti che si considerano. La somma delle suddette inegualanze può ridursi ad un termine solo della forma $P \cos(\nu' - \Pi)$, ma allora P e Π sono quantità variabili, ossia affette da quelle che chiamansi *variazioni secondari*. Questa forma è utile negli usi astronomici stante la circostanza che le funzioni P e Π variano assai lentamente; ma nelle operazioni analitiche, volendo poter eseguire attualmente le integrazioni, è necessario ritornare alle espressioni originali, a meno che restringendo il calcolo ad un numero limitato di secoli, non si vogliano sostituire a P ed a Π i loro svolgimenti in una serie di potenze successive del tempo.

supponendo del pari che sieno state sopprese le epoche nelle espressioni delle coordinate della Luna, avremo

$$u' = C + C' \cos c'\nu' + C'' \cos a\nu' + C''' \cos \beta\nu' + \text{ecc.},$$

ove C' , come s'è detto, è una delle costanti arbitrarie del problema, e C'', C''', \dots ecc. sono coefficienti dell'ordine della massa M da determinarsi per mezzo delle equazioni differenziali.

Facciamo, per avvicinarci alle espressioni usate in astronomia,

$$C = \frac{1}{a'(1 - e'e')} , \quad C' = \frac{e'}{a'(1 - e'e')},$$

le due nuove costanti a', e' subentrare a C e C' rappresenteranno prossimamente la distanza media nell'elisse e l'eccentricità dell'orbita del Sole, e si avrà, posto per maggior facilità $a'C'' = A$, $a'C''' = B$, ecc.,

$$a'u' = \frac{1 + e' \cos c'\nu'}{1 - e'e'} + A \cos a\nu' + B \cos \beta\nu' + \text{ecc.}$$

13.^o Poichè $a'u'$ è quantità di nessuna dimensione o puramente numerica, gioverà introdurla nelle espressioni delle funzioni Q' ed R' . Supposto poi che au sia la quantità analoga ad $a'u'$ e relativa all'orbita della Luna, si avrà facilmente

$$Q' = \frac{M}{h'^2} \cdot \frac{a'^3}{a^2} \cdot \frac{(au)^3}{(a'u')^3} \cos(\nu - \nu'), \quad R' = \frac{M}{h'^2} \cdot \frac{a'^3}{a^2} \cdot \frac{(au)^3}{(a'u')^3} \sin(\nu - \nu'),$$

ossia sostituendo in luogo di h'^2 il suo valore tratto dalla equazione approssimata $\frac{a'}{h'^2} = C = \frac{1}{a'(1 - ee')}$, e fatto per brevità $\frac{M}{a'} \cdot \frac{a'^3}{a^2} = k$,

$$Q' = \frac{k}{1 - e'e'} \cdot \frac{(au)^3}{(a'u')^3} \cos(\nu - \nu'), \quad R' = \frac{k}{1 - e'e'} \cdot \frac{(au)^3}{(a'u')^3} \sin(\nu - \nu').$$

Queste quantità sono anch'esse di nessuna dimensione essendo moltiplicate pel rapporto delle masse e pel rapporto delle distanze medie.

14.^o L'equazione (g) colla sostituzione del valore di h' diverrà

$$(h) \quad \frac{dt}{dv'} = \frac{a'^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\sigma'(1 - e'e')}} (a'u')^{-2} (1 - 2 \int R'dv')^{-\frac{1}{2}}.$$

Svolgendo il secondo membro e rappresentando con $k\Sigma$ la somma dei termini moltiplicati per k , si avrà

$$\begin{aligned} \frac{dt}{dv'} &= \frac{a'^{\frac{3}{2}}(1 - e'e')^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\sigma'(1 - e'e')}} (1 + e' \cos c'v')^{-2} + k\Sigma \\ &= \frac{a'^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\sigma'}} (1 - e'e')^{\frac{3}{2}} (1 + e' \cos c'v')^{-2} + k\Sigma. \end{aligned}$$

Sia $\frac{1}{n'}$ il termine tutto costante del valore di $\frac{dt}{dv'}$, esso sarà eguale al termine costante della funzione

$$\frac{a'^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\sigma'}} (1 - e'e')^{\frac{3}{2}} (1 + e' \cos c'v')^{-2}$$

più il termine costante della funzione $k\Sigma$. Ora ripetendo il raziocinio usato al n.^o 10, si può dimostrare che quest'ultimo non può essere d'un ordine inferiore ad M^2 od a Mb^3 ; laonde quando si trascurano le quantità di quest'ordine e dei seguenti, si avrà semplicemente

$$\frac{1}{n'} = \frac{a'^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\sigma'}} (1 - e'e')^{\frac{3}{2}} \times \{ \text{term. costante di } (1 + e' \cos c'v')^{-2} \}.$$

Ma si sa che la funzione $(1 + e' \cos c'v')^{-2}$ svolta in serie di coseni dei multipli di $c'v'$ dà per primo termine o per coefficiente di $\cos 0$ la quantità $(1 - e'e')^{-\frac{3}{2}}$; sarà dunque

$\frac{1}{n'} = \frac{a'^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\sigma'}}$, valore esatto entro il sopra indicato limite (*).

15.^o Moltiplicando per n' i due membri dell'equazione (h), si ottiene

$$(i) \quad \frac{d \cdot n't}{dv'} = \frac{(a'u')^{-2}}{\sqrt{(1 - e'e')}} (1 - 2 \int R'dv')^{-\frac{1}{2}};$$

si ha poi, moltiplicando per a' l'equazione (f),

$$(k) \quad a'u' + \frac{d^2 \cdot a'u'}{dv'^2} = 1 + 2 \left(a'u' + \frac{d^2 \cdot a'u'}{dv'^2} \right) \int R'dv' + \frac{d \cdot a'u'}{dv'} R' + a'u' Q'.$$

Abbiamo già trovato che la parte del valore di $a'u'$ indipendente dal fattore k è $= \frac{1 + e' \cos c'v'}{1 - e'e'}$, ossia, svolgendo il denominatore,

$$= 1 + e'^2 + e'^4 + \text{ecc.} + (e' + e'^3 + \text{ecc.}) \cos c'v';$$

ora la parte corrispondente del valore di $n't$ si avrà svolgendo la funzione $(1 - e'e')^{\frac{1}{2}} (1 + e' \cos c'v')^{-2}$, indi integrando e facendo $c' = 1$ nei termini non moltiplicati per v' ; con ciò si ottiene

$$n't = v' - 2e' \sin c'v' + \frac{3}{4} e'^2 \sin 2c'v' + \text{ecc.},$$

(*) Nella teoria della Luna la funzione $\frac{d\Omega}{du}$ contiene nella prima approssimazione un termine indipendente dai seni e coseni, perciò il termine costante del valore di $\frac{dt}{dv}$, che indicheremo con $\frac{1}{n}$, differisce da $\frac{a^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{\sigma}}$ d'una quantità che è dell'ordine della prima potenza della forza perturbatrice. Avendo supposto $\frac{1}{n^2} = x \frac{a^3}{\sigma}$, si è determinato il coefficiente x per mezzo di successive approssimazioni, tenendo conto delle potenze superiori della forza suddetta, e si è trovato

$$x = 1 + \frac{1}{2} m^2 + \frac{75}{32} m^4 + \frac{3}{4} m^2 e'^2 + \frac{27}{256} m^2 \gamma^2 + \frac{675}{64} m^2 e^2 + \text{ecc.}$$

ommessa, giusta l'avvertenza fatta al n.^o 12, la costante della integrazione che terrebbe il luogo dell'epoca della longitudine.

Le parti dei valori di $a'u'$, $n't$ che abbiamo qui sviluppate sono quelle che soglionsi chiamare i valori effettivi delle coordinate, ma impropriamente, perchè le costanti a' , n' , c' , ecc. da cui dipendono sono già modificate dalla perturbazione.

Coordinate della Luna.

16.^o Le equazioni differenziali relative al moto della Luna, integrate per mezzo di successive approssimazioni, ci hanno dato il valore di au e quello di nt in funzione della longitudine vera. Da quest'ultimo colle note regole dell'inversione delle serie si è dedotto il valore di v in funzione di nt . Di tali espressioni non trascriveremo qui che quelle sole parti che debbonsi adoperare nel calcolo che abbiamo intrapreso. Essendosi da noi rappresentate con $E\nu$, $c\nu$, $c'm\nu$ l'elongazione e le anomalie della Luna e del Sole espresse per mezzo della longitudine vera della Luna ν , saranno $E \cdot nt$, $c \cdot nt$, $c'm \cdot nt$ le stesse quantità espresse per mezzo della longitudine media. Introdotte queste denominazioni, si ebbe

$$\bar{\nu} = nt +$$

$$\begin{aligned} \sin 2E \cdot nt & \cdot \left(-\frac{11}{8}m^3 + \frac{59}{12}m^5 + \frac{893}{72}m^7 \right) \\ c \cdot nt & \cdot e \left(2 + \frac{3}{2}m^2 - \frac{75}{64}m^4 - \frac{6659}{456}m^6 \right) \\ (2E - c)nt & \cdot e \left(+\frac{15}{4}m + \frac{263}{16}m^3 + \frac{50377}{768}m^5 + \frac{1973903}{9216}m^7 \right) \\ (2E + c)nt & \cdot e \left(+\frac{17}{8}m^2 + \frac{169}{24}m^4 \right) \\ (4E - c)nt & \cdot e \left(-\frac{255}{64}m^3 \right) \end{aligned}$$

$$\sin c'm \cdot nt \cdot e'(-3m + 0 \cdot m^2)$$

$$(2E + c'm)nt \cdot e'\left(-\frac{11}{16}m^2\right)$$

$$(2E - c'm)nt \cdot e'\left(+\frac{77}{16}m^2\right).$$

Il valore poi di a_{tt} in funzione di v risultò

$$a_{tt} = 1$$

$$\cos 2E \cdot v \cdot \left(m^2 + \frac{19}{6}m^3 + \frac{64}{9}m^4\right)$$

$$c \cdot v \cdot e(+1),$$

$$(2E - c)v \cdot e\left(+\frac{15}{8}m + \frac{273}{32}m^2 + \frac{13875}{512}m^3 + \frac{164711}{2048}m^4\right)$$

$$(2E + c)v \cdot e\left(-\frac{15}{8}m^2 - \frac{23}{48}m^3\right)$$

$$(4E - c)v \cdot e\left(-\frac{75}{64}m^3\right)$$

$$c'm \cdot v \cdot e\left(-\frac{3}{2}m^2 + 0 \cdot m^3\right)$$

$$(2E + c'm)v \cdot e'\left(-\frac{1}{2}m^2\right)$$

$$(2E - c'm)v \cdot e'\left(+\frac{7}{2}m^2\right).$$

17.^o In queste espressioni non abbiamo conservate che le prime dimensioni di e ed e' ; quanto alle dimensioni di m , in alcune serie abbiamo spinta l'approssimazione fino alle seconde potenze, ed in alcune fino alle terze ed alle quarte, nella quale scelta ci siamo regolati non solo sulla natura delle integrazioni da eseguirsi che alterano talvolta l'ordine analitico

delle dimensioni, ma ancora sul valore finale de' coefficienti numerici, pei quali non è possibile assegnare alcuna certa regola. Poichè per ottenere un tal grado di approssimazione si è dovuto tener conto delle potenze superiori della forza perturbatrice del Sole sulla Luna, sembrerebbe che fosse necessario nel calcolo delle coordinate u' , v' conservare le potenze superiori della forza perturbatrice k (*). Ma si vedrà che nelle integrazioni questa quantità acquista il fattore m^3 ; cosicchè trascurando il quadrato della terza perturbatrice, si trascurano realmente delle quantità dell'ordine di $k^3 m^4$. Perciò nella formazione delle funzioni Q' , R' che sono già moltiplicate per k ci basterà sostituire le sole parti di $a'u'$ e di v' indipendenti da k , delle quali abbiamo dato il valore al n.^o 15, e quindi per tradurre le coordinate della Luna in funzione della variabile v' ci basterà sostituire in luogo di nt il suo valore approssimato

$$nt = \frac{n't}{m} = \frac{v'}{m} - \frac{2e'}{m} \sin c v'.$$

18.^o Si sostituisca questo valore di nt nell'espressione di v data al n.^o 16, si svolgano i seni e coseni conservando le sole prime potenze di e e di e' , e si otterrà

(*) Per una particolar combinazione degli elementi del sistema nostro le forze perturbatrici esercitate dal Sole sulla Luna e dalla Luna sul Sole valutate in parti delle rispettive forze centrali sono prossimamente eguali; in fatti la prima essendo espressa da $\frac{M^l}{\sigma} \cdot \frac{a^3}{a'^3} \cdot \frac{a}{h^2}$, o prossimamente da $\frac{\sigma'}{\sigma} \cdot \frac{a^3}{a'^3} \cdot \frac{a}{h^2}$, risulta colla sostituzione dei valori di σ , σ' ed h^2 prossimamente $= m^2$ ossia in numeri $= \frac{1}{179}$. La seconda poi rappresentata da $k = \frac{M}{\sigma'} \cdot \frac{a'^2}{a^2}$ riesce $= \frac{M}{\sigma} \cdot \frac{x b^2}{m^2}$, cosicchè posta la massa della Luna $M = \frac{M''}{80} = \frac{\sigma'}{81}$, si ha $k = \frac{1}{181}$.

$$\begin{aligned}
 & \cos \cdot 0 \quad \cdot \quad \omega^3 = \left(+ \frac{121}{128} m^4 \right) ; \quad \sin \cdot 0 = A(0) = 0 \\
 & c \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{165}{32} m^3 + \frac{5627}{128} m^4 \right) \\
 & (2E - c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{11}{4} m^2 + \frac{59}{6} m^3 + \frac{3869}{144} m^4 \right) \\
 & (2E + c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(- \frac{11}{4} m^2 - \frac{59}{6} m^3 \right) \\
 & (4E - c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(- \frac{165}{32} m^3 \right) \\
 & (2E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{11}{4} m + \frac{59}{6} m^2 \right) \\
 & (2E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot e \left(- \frac{11}{4} m - \frac{59}{6} m^2 \right) \\
 & \omega^3 = \cos c \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{363}{64} m^4 \right);
 \end{aligned}$$

sarà dunque

$$\begin{aligned}
 & \sin(v - v') = \\
 & \sin E \frac{v'}{m} \cdot \left(1 + \frac{11}{16} m^2 + \frac{59}{24} m^3 + \frac{13199}{304} m^4 \right) - 3(3) \\
 & 3E \frac{v'}{m} \cdot \left(+ \frac{11}{16} m^2 + \frac{59}{24} m^3 \right) - (3)(3) \\
 & (E + c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(1 + \frac{9}{8} m^2 - \frac{13}{16} m^3 \right) - (3)(3) \\
 & (E - c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(- 1 + \frac{15}{8} m + \frac{261}{32} m^2 + \frac{17601}{512} m^3 + \frac{238175}{2048} m^4 \right) \\
 & (3E + c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{7}{4} m^2 + \frac{287}{48} m^3 \right)
 \end{aligned}$$

$$\cos(2E + c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{33}{16} m^2 + \frac{165}{16} m^3 \right)$$

$$(4E - c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{495}{128} m^3 \right)$$

$$cm \frac{v'}{m} \cdot e \left(- \frac{3}{2} m^2 \right)$$

$$(2E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot e \left(- 2m + \frac{41}{6} m^2 \right)$$

$$(2E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ 2m + \frac{59}{6} m^2 \right).$$

Svolgimento del seno e del coseno dell'angolo $v - v'$.

20.^o Facciasi per brevità $v = \frac{v'}{m} + \omega$, indicando con ω la somma dei termini di cui abbiamo dato il valore nel n.^o 18, si avrà

$$\sin(v - v') = \sin \left(v' \left(\frac{1}{m} - 1 \right) + \omega \right) = \sin \left(E \frac{v'}{m} + \omega \right);$$

$$= \sin E \frac{v'}{m} \cdot \cos \omega + \cos E \frac{v'}{m} \cdot \sin \omega$$

$$\cos(v - v') = \cos E \frac{v'}{m} \cdot \cos \omega - \sin E \frac{v'}{m} \cdot \sin \omega;$$

conviene adunque preparare i valori di

$$\sin \omega = \frac{\omega}{1} - \frac{\omega^3}{6} + \text{ecc.}, \quad \cos \omega = 1 - \frac{\omega^2}{2} + \text{ecc.}$$

Ora trascurando le potenze superiori delle eccentricità, si trova facilmente

I coefficienti che entrano nel valore di $\sin(v - v')$ sono stati calcolati con una dimensione di più dei corrispondenti nel valore di $\cos(v - v')$, ad eccezione di quello che appartiene all'argomento $E - c$; di questa apparente irregolarità si vedrà fra poco la ragione.

Formazione delle funzioni $a'u'Q'$ ed R' .

$$21.^{\circ} \text{ Essendo } a'u'Q' = \frac{k(au)^2 \cos(v-v')}{(1-e'e)(a'u')^3}, \quad R' = \frac{k(au)^2 \sin(v-v')}{(1-e'e)(a'u')^3},$$

convien cominciare dall'elevare al quadrato la funzione au . Posto a tal fine $au = 1 + y$, si avrà $(au)^2 = 1 + 2y + y^2$; ora per formare y^2 , poichè non si considerano le potenze superiori delle eccentricità, basterà moltiplicare i due termini

$$-\frac{11}{8}m^4 + \left(m^2 + \frac{19}{6}m^3 + \frac{64}{9}m^4\right) \cos 2E \frac{v'}{m}$$

prima per sè stessi, e poi pel doppio di tutti i rimanenti; si avrà per tal modo

$$\begin{aligned} y^2 &= \\ \cos \cdot 0 &\quad \cdot \left(-\frac{11}{8}m^4\right) \\ c \frac{v'}{m} &\quad \cdot \cdot \left(-\frac{15}{8}m^3 + \frac{355}{32}m^4\right) \\ (2E - c) \frac{v'}{m} &\quad \cdot e \left(+m^2 + \frac{19}{6}m^3 + \frac{64}{9}m^4\right) \\ (2E + c) \frac{v'}{m} &\quad \cdot e \left(+m^2 + \frac{19}{6}m^3\right) \\ (4E - c) \frac{v'}{m} &\quad \cdot e \left(+\frac{15}{8}m^3\right); \end{aligned}$$

e quindi il valore di $(au)^2$ sarà

$$\begin{aligned}
 & (au)^2 = \\
 & \cos \cdot 0 \quad \left(1 + \frac{9}{4} m^4 \right) \\
 & 2E \frac{v'}{m} \quad \cdot \left(+ 2m^3 + \frac{19}{3} m^3 + \frac{128}{9} m^4 \right) \\
 & c \frac{v'}{m} \quad \cdot e \left(+ 2 - \frac{525}{64} m^3 - \frac{16809}{256} m^4 \right) \\
 & (2E - c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{15}{4} m + \frac{203}{16} m^3 + \frac{33625}{768} m^3 + \frac{1270079}{9216} m^4 \right) \\
 & (2E + c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{41}{8} m^2 + \frac{571}{24} m^3 \right) \\
 & (4E - c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{615}{64} m^3 \right) \\
 & c'm \frac{v'}{m} \cdot e' \left(- 3 m^3 \right) \\
 & (2E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot e' \left(- 4m - \frac{41}{3} m^2 \right) \\
 & (2E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot e' \left(+ 4m + \frac{59}{8} m^2 \right).
 \end{aligned}$$

22.^o Per questo fattore debbonai ora moltiplicare i valori di $\sin(v - v')$ e $\cos(v - v')$ dati al n.^o 20. L'operazione non ha alcuna difficoltà fuor che quella che proviene dalla molteplicità dei termini nati dalle differenti combinazioni che si debbono riunire. I più complicati fra i coefficienti da formarsi sono quelli del seno e del coseno di $(E - c) \frac{v'}{m}$, i quali si sono dovuti spingere fino alle quarte potenze di m ; per dare un saggio del modo con cui abbiamo ordinati i nostri calcoli, trascriveremo qui per disteso le diverse parti che compongono il primo di questi coefficienti.

Parti componenti il coefficiente di $\sin(E - c) \frac{v'}{m}$ nella funzione $(av)^2 \sin(v - v')$:

$$\begin{aligned}
 e & \left(-1 + \frac{15}{8}m + \frac{261}{32}m^2 + \frac{17691}{512}m^3 + \frac{238175}{2048}m^4 \right. \\
 & + 1 - \frac{15}{8} - 1 - \frac{19}{6} - \frac{9}{4} \\
 & + \frac{11}{16} + \frac{59}{24} - \frac{9}{8} \\
 & - \frac{203}{32} - \frac{525}{128} - \frac{64}{9} \\
 & - \frac{33625}{1536} + \frac{13199}{2304} \\
 & - \frac{165}{128} - \frac{16809}{512} \\
 & + \frac{15}{8} - \frac{1270079}{18432} \\
 & \quad \frac{2233}{512} \\
 & \quad - \frac{295}{64} \\
 & \quad + \frac{241}{32} \\
 & \quad - \frac{95}{16} \\
 & \quad + \left. \frac{451}{256} \right)
 \end{aligned}$$

$$\text{Somma} \dots e \left(0 + 0m + \frac{3}{2}m^2 + \frac{135}{16}m^3 + \frac{257}{16}m^4 \right).$$

23.^o Con questa norma sono state eseguite le riunioni dei termini che compongono le diverse funzioni che entrano nel calcolo. Per rispetto alla funzione succennata si ebbe

$$\begin{aligned}
 & (au)^3 \sin(v - v') = \\
 & \sin E \frac{v'}{m} + \left(1 - \frac{5}{16} m^2 - \frac{17}{24} m^3 + \frac{1999}{2304} m^4 \right) \\
 & 3E \frac{v'}{m} + \left(+ \frac{27}{16} m^2 + \frac{45}{8} m^3 \right) \\
 & (E + c) \frac{v'}{m} + e \left(+ 2 + \frac{1}{4} m^2 - \frac{445}{48} m^3 \right) \\
 & (E - c) \frac{v'}{m} + e \left(+ \frac{3}{2} m^2 + \frac{135}{16} m^3 + \frac{257}{16} m^4 \right) \\
 & (3E + c) \frac{v'}{m} + e \left(+ 6 m^2 + \frac{47}{2} m^3 \right) \\
 & (3E - c) \frac{v'}{m} + e \left(+ \frac{15}{4} m + \frac{217}{16} m^2 + \frac{32717}{768} m^3 \right) \\
 & (E + c'm) \frac{v'}{m} + e' \left(- m^{-1} - \frac{19}{16} m + \frac{71}{96} m^2 \right) \\
 & (E - c'm) \frac{v'}{m} + e' \left(+ m^{-1} + \frac{19}{16} m - \frac{449}{96} m^2 \right) \\
 & (3E + c'm) \frac{v'}{m} + e' \left(- \frac{81}{16} m - \frac{523}{32} m^2 \right) \\
 & (3E - c'm) \frac{v'}{m} + e' \left(+ \frac{81}{16} m + \frac{685}{32} m^2 \right).
 \end{aligned}$$

24.^o Si ebbe del pari, limitando il numero delle dimensioni giusta l'avvertenza fatta al n.^o 20,

$$\begin{aligned}
 & \cos (au)^3 \cos(v - v') = \\
 & \cos E \frac{v'}{m} \cdot \left(1 + \frac{5}{16} m^2 + \frac{17}{24} m^4 \right) \\
 & 3E \frac{v'}{m} \cdot \left(+ \frac{27}{16} m^2 \right) \\
 & (E + c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ 2 + \frac{5}{4} m^2 \right) \\
 & (E - c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(- 3 m^2 - \frac{135}{8} m^4 - \frac{4507}{64} m^6 \right) \\
 & (3E + c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ 6 m^2 \right) \\
 & (3E - c) \frac{v'}{m} \cdot e \left(+ \frac{15}{4} m + \frac{217}{16} m^4 \right) \\
 & (E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot e' \left(- m^{-1} - \frac{29}{16} m \right) \\
 & (E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot e' \left(+ m^{-1} + \frac{29}{16} m \right) \\
 & (3E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot e' \left(- \frac{81}{16} m \right) \\
 & (3E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot e' \left(+ \frac{81}{16} m \right).
 \end{aligned}$$

25.^o Il valore di R' si avrà moltiplicando quello ora trovato di $(au)^3 \sin(v - v')$ per $\frac{k}{(1 - e'e)(au)^3}$; quest'ultimo fattore, conservando le sole prime potenze di e' e di k , si ridurrà a $k(au)^{-3} = k \left(1 - 3e' \cos c'm \frac{v'}{m} \right)$. Ora si vede facilmente che per eseguire questa moltiplica basterà aggiungere al primo fattore moltiplicato per k il prodotto dei

soli due primi termini del fattore medesimo moltiplicati per
 $-3k e' \cos c'm \frac{v'}{m}$. Sarà dunque

$$R' =$$

$$\sin E \frac{v'}{m} \cdot \left(1 - \frac{5}{16}m^2 - \frac{27}{24}m^3 + \frac{1999}{2304}m^4 \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot \left(+ \frac{27}{16}m^2 + \frac{45}{8}m^3 \right)$$

$$(E + c) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(+ 2 + \frac{1}{4}m^2 - \frac{445}{48}m^3 \right)$$

$$(E - c) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(+ \frac{3}{2}m^2 + \frac{135}{16}m^3 + \frac{257}{16}m^4 \right)$$

$$(3E + c) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(+ 6m^2 + \frac{47}{2}m^3 \right)$$

$$(3E - c) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(+ \frac{15}{4}m + \frac{207}{16}m^2 + \frac{32717}{768}m^3 \right)$$

$$(E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(- m^{-1} - \frac{3}{2} - \frac{19}{16}m + \frac{29}{24}m^2 \right)$$

$$(E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(+ m^{-1} - \frac{3}{2} + \frac{19}{16}m - \frac{101}{24}m^2 \right)$$

$$(3E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(- \frac{81}{16}m - \frac{151}{8}m^2 \right)$$

$$(3E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(+ \frac{81}{16}m - \frac{151}{8}m^2 \right).$$

26.^o Rimane a trovarsi il valore dell'integrale $-\int R'dv$. Consideriamo a tal fine un termine qualunque della serie precedente, rappresentato da $A \sin a v' = A \sin \left(m a \frac{v'}{m} \right)$, si

avrà, integrando ed omettendo la costante,

$$-\int A \sin a v' dv' = \frac{A}{a} \cos a v'.$$

I coefficienti α nascóno dalla combinazione della quantità E , che abbiamo scritta in luogo di $1 - m$, colla quantità c che rappresenta il moto medio dell'anomalia della Luna in parti del moto medio della longitudine, e colla quantità $c'm$ che rappresenta il corrispondente moto medio dell'anomalía del Sole. Il valore di c è dato dalla teoria della Luna, ed omettendo i termini moltiplicati pei quadrati delle eccentricità e delle inclinazioni, risulta

$$c = 1 - \frac{3}{4} m^2 - \frac{225}{32} m^3 - \frac{4071}{128} m^4 - \text{ecc.};$$

al valore poi di $c'm$ si può in questo luogo sostituire semplicemente m . Con questi dati si troveranno per diversi argomenti che entrano nel valore di R i seguenti valori del coefficiente $\frac{1}{\alpha}$:

Argomenti	Valori di ma	Valori di $\frac{I}{\alpha}$
E	$1 - m$	$m + m^2 + m^3 + m^4$
$3E$	$3 - 3m$	$\frac{1}{3}(m + m^4)$
$E + c$	$2 - m - \frac{3}{4}m^2 - \frac{225}{32}m^3$	$\frac{1}{2}\left(m + \frac{1}{2}m^2 + \frac{5}{8}m^3 + \frac{257}{64}m^4\right)$
$E - c$	$-m + \frac{3}{4}m^2 + \frac{225}{32}m^3$	$-\left(1 + \frac{3}{4}m + \frac{243}{32}m^2\right)$
$3E + c$	$4 - 3m$	$\frac{1}{4}\left(m + \frac{3}{4}m^2\right)$
$3E - c$	$2 - 2m + \frac{3}{4}m^2$	$\frac{1}{2}\left(m + \frac{3}{2}m^2 + \frac{15}{8}m^3\right)$
$E + c'm$	1	m
$E - c'm$	$1 - 2m$	$m(1 + 2m + 4m^2 + 8m^3)$
$3E + c'm$	$3 - 2m$	$\frac{m}{3}\left(1 + \frac{2}{3}m\right)$
$3E - c'm$	$3 - 4m$	$\frac{m}{3}\left(1 + \frac{4}{3}m\right)$

27.^o Moltiplicando per questi fattori i termini rispettivi del valore di R' , si avrà

$$\begin{aligned}
 & -\int R' d\nu' = \\
 \cos E \frac{\nu'}{m} & \cdot k \left(m + m^2 + \frac{11}{16} m^3 - \frac{1}{48} m^4 - \frac{2047}{2304} m^5 \right) \\
 3E \frac{\nu'}{m} & \cdot k \left(+ \frac{9}{16} m^3 + \frac{39}{16} m^4 \right) \\
 (E + c) \frac{\nu'}{m} & \cdot k e \left(+ m + \frac{1}{2} m^2 + \frac{3}{4} m^3 - \frac{107}{192} m^4 \right) \\
 (E - c) \frac{\nu'}{m} & \cdot k e \left(- \frac{3}{2} m^2 - \frac{153}{16} m^3 - \frac{1081}{32} m^4 \right) \\
 (3E + c) \frac{\nu'}{m} & \cdot k e \left(+ \frac{3}{2} m^3 + 7 m^4 \right) \\
 (3E - c) \frac{\nu'}{m} & \cdot k e \left(+ \frac{15}{8} m^2 + \frac{307}{32} m^3 + \frac{100613}{1536} m^4 \right) \\
 (E + c'm) \frac{\nu'}{m} & \cdot k e' \left(- 1 - \frac{3}{2} m - \frac{19}{16} m^2 + \frac{29}{24} m^3 \right) \\
 (E - c'm) \frac{\nu'}{m} & \cdot k e' \left(+ 1 + \frac{1}{2} m + \frac{35}{16} m^2 + \frac{1}{6} m^3 \right) \\
 (3E + c'm) \frac{\nu'}{m} & \cdot k e' \left(- \frac{27}{16} m^2 - \frac{89}{12} m^3 \right) \\
 (3E - c'm) \frac{\nu'}{m} & \cdot k e' \left(+ \frac{27}{16} m^2 - \frac{205}{24} m^3 \right).
 \end{aligned}$$

28.^o Essendo $a'u'Q' = \frac{k}{(1 - e'e')} \cdot \frac{(au)^3}{(a'u')^2} \cos(\nu - \nu')$, per formare questa funzione basterà moltiplicare il valore di $(au)^3 \cos(\nu - \nu')$ per $k \left(1 - 2e' \cos c'm \frac{\nu'}{m} \right)$, e si avrà

$$a'u'Q' =$$

$$\cos \quad E \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k \left(-1 + \frac{5}{16} m^2 + \frac{17}{24} m^3 \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k \left(+ \frac{27}{16} m^2 \right)$$

$$(E+c) \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k e \left(+ 2 + \frac{5}{4} m^2 - \frac{65}{48} m^3 \right)$$

$$(E-c) \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k e \left(- 3 m^2 - \frac{135}{8} m^3 - \frac{4507}{64} m^4 \right)$$

$$(3E+c) \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k e \left(+ 6 m^2 + \frac{47}{2} m^3 \right)$$

$$(3E-c) \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k e \left(+ \frac{15}{4} m + \frac{217}{16} m^2 + \frac{27667}{768} m^3 \right)$$

$$(E+c'm) \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k e \left(- m^{-1} - 1 + \frac{29}{16} m \right)$$

$$(E-c'm) \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k e \left(+ m^{-1} - 1 + \frac{29}{16} m \right)$$

$$(3E+c'm) \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k e \left(- \frac{81}{16} m \right)$$

$$(3E-c'm) \frac{v'}{m} \quad \cdot \quad k e \left(+ \frac{81}{16} m \right).$$

Integrazione dell'equazione differenziale fra $a'u'$ e v' .

29.^o Il secondo membro dell'equazione (k) contiene i termini $2 \left(a'u' + \frac{d^2 \cdot a'u'}{dv'^2} \right) \int R' dv'$ e $\frac{d \cdot a'u'}{dv'} R'$; poichè la funzione R' è tutta moltiplicata per k , per formare questi due prodotti basterà prendere la parte di $a'u'$ che è indipendente da k , con che si avrà

$$a'u' + \frac{d^2 a'u'}{dv'^2} = 1, \quad \frac{d \cdot a'u'}{dv'} = - e \sin c'm \frac{v'}{m}.$$

3o.° Moltiplicando quest'ultimo termine per R' , si trova subito

$$\frac{d \cdot a' u'}{d v'} \cdot R' = \cos(E + c'm) \frac{v'}{m} e^{\left(+\frac{1}{2} + o m\right)}$$

$$(E - c'm) \frac{v'}{m} e^{\left(-\frac{1}{2} + o m\right)};$$

riunendo poi in una sola somma questa quantità colle altre $\frac{2}{3} R' d v'$ ed $a' u' Q'$, l'equazione (k) diverrà

$$a' u' + \frac{d^2 \cdot a' u'}{d v'^2} =$$

$$\cos E \frac{v'}{m} + k \left(-1 - 2m - \frac{27}{16} m^2 - \frac{2}{3} m^3 \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} + k \left(+ \frac{27}{16} m^2 \right)$$

$$(E + c) \frac{v'}{m} + k e \left(+ 2 - \frac{3}{4} m + \frac{1}{4} m^2 - \frac{113}{48} m^3 \right)$$

$$(E - c) \frac{v'}{m} + k e \left(+ \frac{9}{4} m^3 - \frac{183}{64} m^4 \right)$$

$$(3E + c) \frac{v'}{m} + k e \left(+ 6 m^2 + \frac{41}{2} m^3 \right)$$

$$(3E - c) \frac{v'}{m} + k e \left(+ \frac{15}{4} m + \frac{157}{16} m^2 + \frac{12931}{768} m^3 \right)$$

$$(E + c'm) \frac{v'}{m} + k e \left(- m^{-1} + \frac{3}{2} + \frac{19}{16} m \right)$$

$$(E - c'm) \frac{v'}{m} + k e \left(+ m^{-1} - \frac{7}{2} + \frac{13}{16} m \right)$$

$$(3E + c'm) \frac{v'}{m} + k e \left(- \frac{81}{16} m \right)$$

$$(3E - c'm) \frac{v'}{m} + k e \left(+ \frac{81}{16} m \right).$$

31.^o Abbiamo supposto al n.^o 12 che il valore di $a'u'$, oltre la parte $\frac{1 + v' \cos c v'}{1 - c'v'}$ che contiene le costanti arbitrarie, sia composto d'una serie di termini della forma $A \cos \alpha v'$; ed è evidente che per soddisfare all'equazione differenziale ora formata conviene attribuire successivamente ad α il valore di ciascuno dei coefficienti di v' negli argomenti che entrano nel secondo membro dell'equazione stessa. Fatta la sostituzione e paragonati i coefficienti dei termini omogenei, si avranno altrettante equazioni della forma

$$A(1 - \alpha^2) = B, \text{ che daranno } A = \frac{B}{1 - \alpha^2}.$$

Ecco per ciascuno degli argomenti il corrispondente valore della frazione $\frac{1}{1 - \alpha^2}$.

Argomenti	Valori di $\frac{1}{1 - \alpha^2}$
E	$-m^3(1 + 2m + 4m^3 + 8m^5)$
$3E$	$-\frac{m^3}{9}$
$E + c$	$-\frac{m^3}{4}\left(1 + m + \frac{7}{4}m^2 + \frac{293}{32}m^3\right)$
$E - c$	$+\frac{2}{3m}\left(1 - \frac{75}{8}m\right)$
$3E + c$	$-\frac{m^3}{16}$
$3E - c$	$-\frac{m^3}{4}\left(1 + 3m + \frac{25}{4}m^2\right)$
$E + c'm$	$-m^3(1 + m^2 + o \cdot m^3)$
$E - c'm$	$-m^3(1 + 4m + 13m^3)$
$3E + c'm$	$-\frac{m^3}{9}$
$3E - c'm$	$-\frac{m^3}{9}.$

32.^o Non ci rimane più che a moltiplicare rispettivamente i termini del valore di $a'u' + \frac{d^2a'u'}{dv'^2}$ per i precedenti fattori, a fine d' avere i corrispondenti del valore di $a'u'$, i quali riuniti alla parte già calcolata al n.^o 15 daranno

$$a'u' = 1 + e' \cos c'm \frac{v'}{m} +$$

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot k \left(-m^2 + \frac{27}{16}m^4 + \frac{97}{24}m^5 \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot k \left(-\frac{3}{16}m^4 \right)$$

$$(E + c) \frac{v'}{m} \cdot ke \left(-\frac{1}{2}m^2 - \frac{5}{16}m^3 - \frac{3}{4}m^4 \right)$$

$$(E - c) \frac{v'}{m} \cdot ke \left(+\frac{3}{2}m^2 - \frac{495}{32}m^3 \right)$$

$$(3E + c) \frac{v'}{m} \cdot ke \left(-\frac{3}{8}m^4 \right)$$

$$(3E - c) \frac{v'}{m} \cdot ke \left(-\frac{15}{16}m^3 - \frac{337}{64}m^4 \right)$$

$$(E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot ke' \left(+m - \frac{3}{2}m^2 - \frac{3}{16}m^3 \right)$$

$$(E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot ke' \left(-m - \frac{1}{2}m^2 + \frac{3}{16}m^3 \right)$$

$$(3E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot ke' \left(+\frac{9}{16}m^3 \right)$$

$$(3E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot ke' \left(-\frac{9}{16}m^3 \right).$$

Integrazione dell'equazione differenziale fra $n't$ e v' .

33.^o Per comporre il secondo membro dell'equazione (i) cominceremo dallo svolgimento della potenza -2 di $a'u'$, nella quale operazione è qui necessario tener conto tanto dei termini moltiplicati per k , quanto di quelli indipendenti da questa quantità. Supposto perciò $a'u' = 1 + e' \cos c'm \frac{v'}{m} + ky'$, avremo, trascurando i quadrati di e' e di k , ma conservando il prodotto di queste due quantità,

$$(a'u')^{-2} = 1 - 2e' \cos c'm \frac{v'}{m} - 2ky' + 6e' \cos c'm \frac{v'}{m} \times ky';$$

ossia sostituito il valore di y' ,

$$(a'u')^{-2} = 1 - 2e' \cos c'm \frac{v'}{m} +$$

$$\cos E \frac{v'}{m} + k \left(-2m^2 - \frac{27}{8}m^4 \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} + k \left(+ \frac{3}{8}m^4 \right)$$

$$(E + c) \frac{v'}{m} + ke \left(+ m^2 + \frac{5}{8}m^3 + \frac{3}{2}m^4 \right)$$

$$(E - c) \frac{v'}{m} + ke \left(- 3m^2 + \frac{495}{16}m^3 \right)$$

$$(3E + c) \frac{v'}{m} + ke \left(+ \frac{3}{4}m^4 \right)$$

$$(3E - c) \frac{v'}{m} + ke \left(+ \frac{15}{8}m^3 + \frac{337}{32}m^4 \right)$$

$$\cos (E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot ke' \left(-2m + 0m^2 + \frac{3}{8}m^3 \right)$$

$$(E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot ke' \left(+2m - 2m^2 - \frac{3}{8}m^3 \right)$$

$$(3E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot ke' \left(-\frac{9}{8}m^3 \right)$$

$$(3E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot ke' \left(+\frac{9}{8}m^3 \right).$$

34° Il valore di $\frac{d \cdot n' t}{d v'}$ contiene tre fattori, l'uno $= (a'u')^{-2}$ che abbiamo ora formato, l'altro $= (1 - e'e')^{-\frac{1}{2}}$ che nel calcolo attuale deve farsi eguale all'unità, ed il terzo $(1 - 2/R'dv')^{-\frac{1}{2}}$, il quale trascurando le potenze superiori di k , si riduce a $1 + \int R'dv'$; sarà dunque

$$\frac{d \cdot n' t}{d v'} = (a'u')^{-2} + (a'u')^{-2} \int R'dv',$$

ed in quest'ultimo termine basterà porre al luogo di $(a'u')^{-2}$ la parte di essa funzione che è indipendente da k . Riunendo i diversi termini, si ottiene

$$\frac{d \cdot n' t}{d v'} = 1 - 2e' \cos c'm \frac{v'}{m} +$$

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot \left(-m + m^2 - \frac{11}{16}m^3 - \frac{161}{48}m^4 - \frac{16577}{2304}m^5 \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot \left(-\frac{9}{16}m^3 - \frac{33}{16}m^4 \right)$$

$$(E + c) \frac{v'}{m} \cdot \left(-m + \frac{1}{2}m^2 - \frac{1}{8}m^3 + \frac{395}{192}m^4 \right)$$

$$(E - c) \frac{v'}{m} \cdot \left(-\frac{3}{2}m^2 + \frac{81}{2}m^3 \right)$$

96

$$\begin{aligned} \cos(3E + c)\frac{v'}{m} &\cdot \left(-\frac{3}{2}m^3 - \frac{25}{4}m^4\right) \\ (3E - c)\frac{v'}{m} &\cdot \left(-\frac{15}{8}m^2 - \frac{247}{32}m^3 - \frac{84437}{1536}m^4\right) \\ (E + c'm)\frac{v'}{m} &\cdot \left(+1 + \frac{1}{2}m + \frac{35}{16}m^2 - \frac{7}{24}m^3\right) \\ (E - c'm)\frac{v'}{m} &\cdot \left(-1 + \frac{5}{2}m - \frac{19}{16}m^2 + \frac{7}{24}m^3\right) \\ (3E + c'm)\frac{v'}{m} &\cdot \left(+\frac{27}{16}m^2 + \frac{89}{12}m^3\right) \\ (3E - c'm)\frac{v'}{m} &\cdot \left(-\frac{27}{16}m^2 + \frac{259}{24}m^3\right). \end{aligned}$$

35.^o Per passare da questo differenziale al valore della longitudine media del Sole = $n't$ non si ha più che a moltiplicare i termini della precedente espressione pei corrispondenti fattori rappresentati generalmente da $\frac{1}{a}$, dei quali abbiamo dati i valori al n.^o 26; otterremo dunque finalmente

$$\begin{aligned} n't &= v' - 2e' \sin c'm \frac{v'}{m} + \\ \sin E \frac{v'}{m} &\cdot k \left(-m^2 - \frac{11}{16}m^4 - \frac{97}{24}m^5 - \frac{25889}{2304}m^6\right) \\ 3E \frac{v'}{m} &\cdot k \left(-\frac{3}{16}m^4 - \frac{7}{8}m^5\right) \\ (E + c)\frac{v'}{m} \cdot ke &\left(-\frac{1}{2}m^2 - \frac{1}{4}m^4 - \frac{41}{48}m^5\right) \\ (E - c)\frac{v'}{m} \cdot ke &\left(+\frac{3}{2}m^2 - \frac{315}{8}m^3\right) \end{aligned}$$

$$\sin(3E + c) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(-\frac{3}{8} m^4 - \frac{59}{32} m^5 \right)$$

$$(3E - c) \frac{v'}{m} \cdot k e \left(-\frac{15}{16} m^3 - \frac{337}{64} m^4 - \frac{107621}{3072} m^5 \right)$$

$$(E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e' \left(m + \frac{1}{2} m^2 + \frac{35}{16} m^3 - \frac{7}{24} m^4 \right)$$

$$(E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e' \left(-m + \frac{1}{2} m^2 - \frac{3}{16} m^3 + \frac{1}{12} m^4 \right)$$

$$(3E + c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e' \left(+ \frac{9}{16} m^3 + \frac{205}{72} m^4 \right)$$

$$(3E - c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e' \left(- \frac{9}{16} m^3 + \frac{205}{72} m^4 \right).$$

36.^o Ora che abbiamo esposto tutto il processo del calcolo, potremo facilmente risalire dalle ultime alle prime operazioni, onde riconoscere i cambiamenti che avvengono nell'ordine analitico dei coefficienti. Consideriamo a tal fine un termine qualunque del valore di $n't$ rappresentato generalmente da $C \sin \alpha v'$, nel quale il coefficiente α sia della forma $\frac{p + p'm + p'm^2 + \text{ecc.}}{m}$, indicando con p, p', p'' ecc. dei coefficienti numerici, e supponiamo dapprima che il coefficiente p non sia = 0, si avrà differenziando $\frac{d \cdot n't}{dv'} = \frac{p + p'm + \text{ecc.}}{m} C \cos \alpha v'$; dunque per avere nella funzione $n't$ i termini dell'ordine m^i basterà computare il suo differenziale fino ai termini dell'ordine m^{i-1} .

37.^o Progredendo in questo esame, è facile il vedere che la funzione $\frac{d \cdot n't}{dv'}$ essendo composta dei termini $(a'u')^{-1}$ e $\int R'dv'$, converrà che entrambe queste due quantità siano esatte fino al suddetto ordine m^{i-1} . Ora il termine dipendente dall'argomento $\alpha v'$ nel valore di $a'u'$ si deduce dal

termine corrispondente del valore di $a'u' + \frac{d^2 \cdot a'u'}{dv'^2}$, moltiplicando quest'ultimo pel fattore $\frac{1}{1-a^2}$; il quale, sostituito il valore di a , risulta $= \frac{-m^2}{p^2 + 2pp'm + (p'^2 - 1)m^2 + \text{ecc.}}$. Questa quantità nel caso che qui si considera è dell'ordine di m^2 , dunque per avere il valore di $n't$ esatto fino all'ordine m^i basterà calcolare le parti che compongono la funzione $a'u' + \frac{d^2 \cdot a'u'}{dv'^2}$, cioè le quantità R' , $a'u'Q'$ e $\int R'dv'$, fino all'ordine m^{i-3} .

38.^o L'integrale $\int R'dv'$ entra per conseguenza nel valore di $n't$ in due modi; primo immediatamente nel valore di $\frac{d \cdot n't}{dv'}$, e qui dovrà essere calcolato sino alle quantità dell'ordine m^{i-1} ; secondo indirettamente, in quanto forma parte del valore di $a'u' + \frac{d^2 \cdot a'u'}{dv'^2}$, e qui dovrà essere calcolato sino alle quantità dell'ordine m^{i-3} ; dunque i corrispondenti valori di R' dovranno essere calcolati sino agli ordini m^{i-2} ed m^{i-4} ; ma la funzione $a'u'Q'$ non entra che una volta sola nel valore di $n't$ per mezzo della funzione $a'u' + \frac{d^2 \cdot a'u'}{dv'^2}$, e quindi deve spingersi soltanto sino alle quantità dell'ordine m^{i-3} . Questo è il motivo pel quale nella formazione di $\sin(v-v')$, $\cos(v-v')$ esposta al n.^o 20 abbiamo calcolati i termini di quest'ultima funzione rispetto agli argomenti pei quali non era $p=0$, con una dimensione di meno.

39.^o Consideriamo ora il caso in cui fosse $p=0$; è chiaro che in tal supposizione sarebbe a una quantità dell'ordine zero. Ripetendo allora i precedenti raziocinj, si troverebbe che l'integrale $\int R'dv'$, in quanto entra immediatamente nel valore di $\frac{d \cdot n't}{dv'}$, deve calcolarsi fino all'ordine m^i . Se poi simultaneamente con $p=0$ si ha $p'=\pm 1$, questa

medesima funzione al pari della Q' , in quanto entrano nel valore di $a'u' + \frac{d^a \cdot a'u'}{dv^m}$, devono calcolarsi sino all'ordine m^{i+1} . Questa speciale combinazione ci si è presentata nell'argomento $(E - c) \frac{v'}{m}$. Ora abbiamo veduto che i coefficienti che ad esso corrispondono nei valori di $\sin(v - v')$, $\cos(v - v')$ sono quantità dell'ordine di em° ossia di prim'ordine; da essi adunque sarebbero potuti nascere nel valore di $n't$, ossia nella perturbazione solare, dei termini dell'ordine $k \frac{e}{m}$, quantità che ridotta in arco ascende a molti minuti. Ma l'aumento di dimensione prodotto dall'integrazione è stata compensata dalle elisioni di tre termini successivi nelle serie dei coefficienti di quest'argomento che abbiamo veduto accadere, due nella formazione de' prodotti di $(a'u')^a$ per $\sin(v - v')$ e per $\cos(v - v')$, e la terza nella riunione dei termini di $a'u' + \frac{d^a \cdot a'u'}{dv^m}$.

40.^o Il calcolo diverrebbe ancora più spinoso se si avesse simultaneamente $p = 0$ e $p' = 0$, poichè allora converrebbe calcolare le funzioni Q' ed R' fino all'ordine m^{i+2} . Questo caso s'incontra nell'argomento $(E + c'm - c)$ che non abbiamo compreso fra quelli sopra calcolati, perchè ha un coefficiente moltiplicato pel prodotto ee' . Cotesto coefficiente potrebbe divenire assai considerabile se non accadesse anche in esso l'elisione di diversi termini successivi.

Calcolo dei termini moltiplicati per e^2 .

41.^o La scelta che abbiamo fatta della longitudine v' per variabile principale ha fatto comparire nell'espressione di σ introdotta al n.^o 20 la quantità piccolissima m al denominatore, cosicchè l'espressione stessa contiene il termine $-\frac{2e'}{m} \sin c'm \frac{v'}{m}$, che è quantità dell'ordine zero. In conseguenza

$$\sin(2E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{11}{4} + \frac{647}{96} m \right)$$

$$(2E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{11}{4} + \frac{1241}{96} m \right).$$

ormando in appresso i valori di $\sin(v - v')$, $\cos(v - v')$, avranno nella prjma di queste due funzioni i nuovi termini

$$\sin E \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(- m^{-1} - \frac{59}{16} - \frac{59}{24} m \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(- \frac{99}{16} - \frac{177}{8} m \right)$$

$$(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} + \frac{3}{8} m^{-1} + \frac{59}{32} + \frac{175}{384} m \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} - \frac{3}{8} m^{-1} + \frac{59}{32} + \frac{769}{384} m \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{99}{32} + \frac{1119}{128} m \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{99}{32} + \frac{1713}{128} m \right)$$

nella seconda i termini

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(- m^{-1} - \frac{37}{16} \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(- \frac{99}{16} \right)$$

$$(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} + \frac{3}{8} m^{-1} + \frac{37}{32} \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} - \frac{3}{8} m^{-1} + \frac{37}{32} \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{99}{32} \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{i\alpha} \left(+ \frac{99}{32} \right).$$

di ciò lo svolgimento delle funzioni $\sin(v - v')$, $\cos(v - v')$ secondo le potenze di e condurrebbe ad una serie che non sarebbe convergente se non fosse la circostanza che il valore numerico di e' è almeno quattro volte minore di quello di m . Del resto la difficoltà analitica che abbiamo indicata viene a sciogliersi da sè stessa quando invertendo la serie si cerca l'espressione di v' in funzione di n^2 , poichè allora i primi due termini dei coefficienti che sono moltiplicati per le potenze superiori di e' spariscono compiutamente dal calcolo. Ma poichè questa perfetta elisione non potrebbe facilmente nè prevedersi, nè dimostrarsi *a priori*, non sarà inutile l'esporre qui il processo degli svolgimenti relativi alle inegualanze che dipendono dai quadrati dell'eccentricità dell'orbita del pianeta perturbato, tenendo conto non solo dei termini che debbono elidersi alla fine dell'operazione, ma anche dei primi fra quelli che rimangono, i quali anche in una soluzione puramente numerica non sarebbero affatto trascurabili.

Per non allungare di troppo questo scritto ci basterà indicare di mano in mano i nuovi termini appartenenti a questa parte del calcolo, che sono da aggiungersi alle diverse funzioni già definite nei numeri precedenti.

42.^o Primieramente all'espressione della longitudine della Luna in funzione di nt conviene aggiungere il termine $-\frac{9}{4}me^3 \sin 2cm \cdot nt$, ed all'espressione di ne in funzione di v' il termine $+\frac{3}{4} \cdot \frac{e'^2}{m} \sin 2c'v'$. Fatta la sostituzione come al n.^o 18, il valore di ω verrà accresciuto dei termini

$$\sin' 2E \frac{v'}{m} \cdot e'^2 \left(-\frac{11}{2} - \frac{59}{3} m \right)$$

$$2cm \frac{v'}{m} \cdot e'^2 \left(+\frac{3}{4} m^{-1} - \frac{3}{4} m + 0.2m^2 \right)$$

e per la seconda

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot e'^2 \left(-m^{-2} - \frac{53}{16} \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot e'^2 \left(-\frac{243}{16} \right)$$

$$(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e'^2 \left(+\frac{1}{2}m^{-2} + \frac{3}{8}m^{-1} + \frac{53}{32} \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e'^2 \left(+\frac{1}{2}m^{-2} - \frac{3}{8}m^{-1} + \frac{53}{32} \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e'^2 \left(+\frac{243}{32} \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e'^2 \left(+\frac{243}{32} \right).$$

45.^o I valori totali delle funzioni sopracennate debbon si moltiplicare l'una per

$$k \frac{(a'u')^{-3}}{1 - e'e'} = k(1 + e^a - 3e' \cos c'\varphi' + 3e'' \cos 2c'\nu'),$$

l'altra per

$$k \frac{(a'u')^{-3}}{1 - e'e'} = k(1 + \frac{1}{2}e'^2 - 2e' \cos c'\nu' + \frac{3}{2}e'' \cos 2c'\nu');$$

eseguiti i prodotti, si avranno le seguenti aggiunte da farsi alle due quantità R' ed $a'u'Q'$ già svolte ai numeri 26 e 28:

$$R' =$$

$$\sin E \frac{v'}{m} \cdot k e'^2 \left(-m^{-2} - \frac{27}{16} - \frac{79}{24}m \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot k e'^2 \left(-\frac{243}{16} - \frac{437}{8}m \right)$$

43.^o I termini della coordinata au in funzione di v moltiplicati per e^{α} che si hanno dalla teorica della Luna sono tutti superiori all'ordine delle dimensioni che qui si considerano, ma fatta la riduzione in funzione di v' , risultano nella stessa coordinata i due termini seguenti

$$\cos 2E \frac{v'}{m} \cdot e^{\alpha} \left(-4 - \frac{38}{3} m \right)$$

$$(2E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{\alpha} \left(+2 + \frac{49}{12} m \right)$$

$$(2E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{\alpha} \left(+2 + \frac{103}{12} m \right),$$

e nel quadrato di au il doppio di questi medesimi termini.

44.^o Venendo ai prodotti $(au)^2 \sin(v-v')$, $(au)^2 \cos(v-v')$, si trova per la prima funzione

$$\sin E \frac{v'}{m} \cdot e^{\alpha} \left(-m^{-2} - \frac{43}{16} - \frac{79}{24} m \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot e^{\alpha} \left(-\frac{243}{16} - \frac{437}{8} m \right)$$

$$(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{\alpha} \left(+\frac{1}{2} m^{-2} + \frac{3}{8} m^{-1} + \frac{43}{32} + \frac{1343}{384} m \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{\alpha} \left(+\frac{1}{2} m^{-2} - \frac{3}{8} m^{-1} + \frac{43}{32} + \frac{539}{128} m \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{\alpha} \left(+\frac{243}{32} + \frac{2767}{128} m \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot e^{\alpha} \left(+\frac{243}{32} + \frac{4225}{128} m \right),$$

$$\cos(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} + \frac{11}{8} + \frac{47}{32} m + \frac{1463}{384} m^2 \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} - \frac{3}{8} + \frac{55}{32} m + \frac{971}{128} m^2 \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{81}{32} m + \frac{3091}{384} m^2 \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{81}{32} m + \frac{3845}{384} m^2 \right).$$

Finalmente la parte da aggiungersi al prodotto $- \frac{d(a'u')}{dv'} R'$
sarà

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- m^{-1} \right)$$

$$(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} + \frac{3}{4} \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} - \frac{3}{4} \right).$$

46.^o Componendo ora con queste parti la funzione $a'u' + \frac{d^2 \cdot a'u'}{dv^2}$,
si hanno i termini

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- m^{-2} + 3m^{-1} - \frac{13}{16} \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- \frac{243}{16} \right)$$

$$(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-2} - \frac{1}{8} m^{-1} - \frac{45}{32} \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-2} - \frac{23}{8} m^{-1} + \frac{125}{32} \right)$$

$$\sin(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-2} + \frac{15}{8} m^{-1} + \frac{91}{32} + \frac{2027}{384} m \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-2} - \frac{15}{8} m^{-1} + \frac{91}{32} + \frac{311}{128} m \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{243}{32} + \frac{3739}{128} m \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{243}{32} + \frac{3258}{128} m \right),$$

$$a'u'Q' =$$

$$\sin E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- m^{-2} - \frac{45}{16} \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- \frac{243}{16} \right)$$

$$(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-2} + \frac{11}{8} m^{-1} + \frac{77}{32} \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-2} - \frac{11}{8} m^{-1} + \frac{77}{32} \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{243}{32} \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{243}{32} \right).$$

I termini da aggiungersi alla parte già calcolata della funzione $-fR'dv'$ saranno

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- m^{-1} - 1 - \frac{43}{16} m - \frac{287}{48} m^2 \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- \frac{81}{16} m - \frac{1117}{48} m^2 \right)$$

$$\cos(E+2c'm)\frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} + \frac{11}{8} + \frac{47}{32} m + \frac{1463}{384} m^3 \right)$$

$$(E-2c'm)\frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} - \frac{3}{8} + \frac{55}{32} m + \frac{971}{128} m^3 \right)$$

$$(3E+2c'm)\frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{81}{32} m + \frac{3091}{384} m^3 \right)$$

$$(3E-2c'm)\frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{81}{32} m + \frac{3845}{384} m^3 \right).$$

Finalmente la parte da aggiungersi al prodotto $- \frac{d(a'u')}{dv'} R'$
sarà

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- m^{-1} \right)$$

$$(E+2c'm)\frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} + \frac{3}{4} \right)$$

$$(E-2c'm)\frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-1} - \frac{3}{4} \right).$$

46.^o Componendo ora con queste parti la funzione $a'u' + \frac{d^5 a'u'}{dv^5}$,
si hanno i termini

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- m^{-2} + 3m^{-1} - \frac{13}{16} \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(- \frac{243}{16} \right)$$

$$(E+2c'm)\frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-2} - \frac{1}{8} m^{-1} - \frac{45}{32} \right)$$

$$(E-2c'm)\frac{v'}{m} \cdot k e^{i\alpha} \left(+ \frac{1}{2} m^{-2} - \frac{23}{8} m^{-1} + \frac{125}{32} \right)$$

$$\begin{aligned}
 & \text{sin} \\
 & (E + 2cm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(-\frac{245}{32} m^2 \right) \\
 & (E - 2cm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(-\frac{245}{32} m^2 \right) \\
 & \text{si quindi corrispondono due valori di } v' \text{ a seguire} \\
 & \cos E \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(1 - m + \frac{39}{16} m^2 \right) \\
 & \cos E \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(+ \frac{37}{16} m^2 \right) \\
 & (E + 2cm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(-\frac{1}{4} + \frac{9}{16} m + \frac{161}{32} m^2 \right) \\
 & (E - 2cm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{16} m - \frac{21}{32} m^2 \right) \\
 & (3E + 2cm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(-\frac{27}{32} m^2 \right) \\
 & (3E - 2cm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(-\frac{27}{32} m^2 \right).
 \end{aligned}$$

47.^o Converrà ora formare la funzione $\frac{(a'u')^{-z}}{\sqrt{1 - e^{iz}}}$, tenendo conto dei termini che nascono dal denominatore, i quali non avevano alcuna influenza sui coefficienti sviluppati al n.^o 34, e si avrà

$$\begin{aligned}
 & \frac{(a'u')^{-z}}{\sqrt{1 - e^{iz}}} = \\
 & \cos E \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(-2 + 2m - \frac{75}{8} m^2 \right) \\
 & - \frac{v'}{m} \cdot k e^{iz} \left(-\frac{27}{8} m^2 \right)
 \end{aligned}$$

$$\cos(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(+ 1 + \frac{3}{4} m - \frac{173}{16} m^3 \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(+ 1 - \frac{11}{4} m - \frac{3}{16} m^3 \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(+ \frac{27}{16} m^3 \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(+ \frac{27}{16} m^3 \right).$$

Di qui si deduce

$$\frac{d \cdot n' t}{dv'} =$$

$$\cos E \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(m^{-1} - 1 + \frac{59}{16} m - \frac{211}{48} m^3 \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(+ \frac{81}{16} m + \frac{1117}{48} m^3 \right)$$

$$(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(- \frac{1}{2} m^{-1} - \frac{11}{8} - \frac{95}{32} m - \frac{8759}{384} m^3 \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(- \frac{1}{2} m^{-1} + \frac{19}{8} - \frac{151}{32} m - \frac{811}{128} m^3 \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(- \frac{81}{32} m - \frac{3091}{384} m^3 \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(- \frac{81}{32} m - \frac{2549}{384} m^3 \right),$$

e finalmente integrando

$$n't =$$

$$\sin E \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(1 + 0 \cdot m + \frac{59}{16} m^3 - \frac{17}{24} m^5 \right)$$

$$3E \frac{v'}{m} \cdot k e^{is} \left(+ \frac{27}{16} m^3 + \frac{85}{9} m^5 \right)$$

$$\sin(E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^m \left(-\frac{1}{2} - \frac{7}{8}m - \frac{67}{32}m^2 - \frac{7955}{384}m^3 \right)$$

$$(E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^m \left(-\frac{1}{2} + \frac{7}{8}m - \frac{67}{32}m^2 - \frac{3631}{128}m^3 \right)$$

$$(3E + 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^m \left(-\frac{27}{32}m^3 - \frac{3415}{1152}m^4 \right)$$

$$(3E - 2c'm) \frac{v'}{m} \cdot k e^m \left(-\frac{27}{32}m^3 - \frac{4169}{1152}m^4 \right).$$

48.^o Se questi termini si riuniscono a quelli trovati al n.^o 35, si vedrà che il coefficiente di $\sin E \frac{v'}{m}$ viene ad essere composto di due serie, i cui primi termini sono d'un medesimo ordine analitico, poichè questo coefficiente risulta

$$= k \left(-m^3 + \frac{11}{16}m^4 - \frac{97}{24}m^5 - \frac{25909}{2304}m^6 + \text{ecc.} \right)$$

$$+ k e^m \left(1 + \frac{59}{16}m^3 + \frac{17}{24}m^4 + \text{ecc.} \right),$$

Il coefficiente di $\sin 3E \frac{v'}{m}$ sarà del pari composto di due parti ed eguale a

$$k \left(-\frac{3}{16}m^4 - \frac{7}{8}m^5 + \text{ecc.} \right) + k e^m \left(-\frac{27}{16}m^3 + \frac{85}{9}m^4 + \text{ecc.} \right).$$

Se nel calcolo si fosse tenuto conto dei termini dipendenti dall'inclinazione dell'orbita della Luna, si sarebbero potute determinare le parti dei coefficienti suddetti che sono moltiplicate per γ^2 , le quali però non avendo acquistato nello svolgimento il divisore m^2 , sarebbero risultate nel coefficiente di $\sin E \frac{v'}{m}$, dell'ordine $k \gamma^2 m^2$. Lo stesso deve dirsi delle parti dipendenti da e^4 , le quali sono necessariamente dell'ordine $k e^4 m^4$.

(Si dà il fine)

DECLINAZIONI DI STELLE

DETERMinate col CIRCOLO MERIDIANO

DEL R. OSSERVATORIO DI MODENA

DA

GIUSEPPE BIANCHI.

Ai medj delle letture de' quattro nonj, in ogni osservazione, sono state applicate le rispettive correzioni del livello del circolo alidada fisso; indi se ne levarono le quantità della rifrazion vera calcolate sulla tavola del signor Carlini; e in fine colla posizion dello zero del circolo, d'altronde ben riconosciuta, e colla latitudine della specola modenese, ormai definita e ben sicura ($44^{\circ} 38' 52''$, 75), si ottengnero le declinazioni apparenti. Queste, dall'epoca di ciascuna osservazione, che fu per la maggior parte nel^o 1828, si ridussero al principio dell'anno medesimo, e ciò mediante le rispettive quantità della variazion annua e del suo aumento secolare, già determinate con ogni esattezza dal professore Bessel, ed esposte nell'Efemeridi di Milano per gli anni 1827-28. Dalle declinazioni apparenti risultano le medie, togliendo alle prime l'aberrazione e la nutazien lunisolare, nel qual calcolo per le 36 stelle principali sonosi adoperate le costanti e le formole secondo le tavole che veggono nell'Efemeridi per 1818 (pag. 87).

e seguenti). Per rispetto alle stelle circompolari nel calcolo dell'aberrazione e della nutazione sonosi usate le tavole generali del professore Gauss (Effemeridi di Milano pel 1823, pag. 87). La precessione annua di ciascuna è stata calcolata pel 1828, desumendola, colla variazion della costante, da quella pel 1800, espressa nella nota formola . . .

$$\text{precess.} = 20'', 0455 \cos AR.$$

Il valor della costante fu con somma precisione determinato dal professore Bessel nell'esimia di lui opera *Astronomiae Fundamenta*, e per la variazione di essa, non che per la variazion secolare della precessione di ciascuna stella (escluse α e δ Orsa minore) ho adoperato le tavole del signor Carlini (Effemeridi di Milano pel 1820, pag. 53 e seg. dell'appendice), le quali servono del pari e a trasportar la precessione dall'una all'altra epoca in genere, e a trovar per ogni stella in particolare, fino alla declinazione $84^\circ 15'$, il termine del quadrato del tempo che appartiene alla sua precessione. Ho soggiunto i moti propri delle stelle secondo Piazzi e Bessel, ricopiandoli dal catalogo della citata Effemeride 1820, pag. 87 e seg., e vi ho posto a canto quelli che risultano dal confronto delle declinazioni del catalogo di Piazzi nel 1800 colle mie nel 1828. Un errore di $3''$, distribuito a opposti sensi nelle due osservazioni estreme paragonate, importa l'errore di $0'',1$ nel moto proprio che se ne deduce; per cui veramente non può mettersi ancora tutta la fiducia in questi moti propri per l'ultima precisione sulla loro quantità; ma l'accordo sufficiente fra le tre determinazioni prova già che gli strumenti e le osservazioni astronomiche tendono rapidamente ad una perfezione, che permetterà fra non molto di assicurarsi eziandio delle più picciole quantità dei moti celesti.

Niuna ricerca si è fatta, e quindi niun conto si è tenuto né dell'eccentricità del circolo, né degli errori speciali delle

divisioni, nè della flessione del gran cannocchiale di cinque piedi; le quali imperfezioni, ove sussistessero e fossero sensibili, dovrebbero pur essere investigate nella precisa loro quantità per correggerne le osservazioni originali, e quindi anche gli ultimi risultamenti.

Ora dunque riflettendo per una parte che molte cause di picciole, ma pur sensibili, differenze o anomalie non saprebbero verosimilmente compensarsi e distruggersi a vicenda in una serie di determinazioni diverse, e tanto più nel confronto di tali determinazioni sui medesimi oggetti ottenute in luoghi, con istromenti e da osservatori diversi; e per l'altra parte considerato il mirabile accordo fra i tre circoli meridiani per le 36 stelle, qual si vede nella tavola, sarà forza conchiudere e stabilire 1.^o che il summentovato valor della latitudine di Modena rimane vie più fermo e non bisognoso neppur di un minimo cangiamento: 2.^o che le rifrazioni secondo la tavola del signor Carlini hanno luogo precisamente anche in Modena per le altezze maggiori di 30°; per altezze minori di questa incontrandosi, dipendentemente per avventura dalle rifrazioni, piccoli dubbj e le più forti differenze nel confronto delle declinazioni, come apparisce nelle prime otto stelle più australi della tavola; 3.^o che il circolo meridiano di Modena non ha errori di eccentricità, di speciali divisioni e di flession del cannocchiale, parlando almeno di errori sensibili e superiori all'ordine delle differenze fra i tre circoli.

È bene altresì notare che i tre circoli paragonati occupano posizioni le più diverse, quali sono quelle di Königsberg alla spiaggia del Baltico, di Torino in vicinanza dell'Alpi, e di Modena situata nella vasta pianura lombarda; e dopo tale avvertenza non potrà negarsi che i grandi stromenti di Reichenbach perfettamente si accordano fra di loro in tutti i luoghi; e si direbbe che le divisioni così costanti ne riuscirono, come quelle degli archi celesti, cui mirano a misurare.

Convinto da ultimo (ed è un altro pregiò dei circoli di Reichenbach a grande utile dell'astronomia) che due o tre osservazioni, istituite con tempo favorevole, bastano per determinar un'esatta declinazione, io mi rivolsi a trovar le declinazioni delle stelle circompolari le più distinte, al duplice scopo e di compiere il quadro delle declinazioni ben conosciute, e di prepararmi un elemento per la ricerca delle rifrazioni che mi sono proposta ed esporrò in altra occasione.

**DECLINAZIONI DELLE 36 STELLE PRINCIPALI
CONFRONTATE SOPRA TRE CIRCOLI MERIDIANI DI REICHENBACH.**

Nome delle stelle.	Numero delle mie osserv.	Declinazioni apparenti a principio del 1828.	Aberr. e nutaz. lunisol.	Declinazioni medie al principio del 1828 secondo		
				Bianchi.	Bessel.	Plana.
α Pesce austr.	9	-30° 31' 59,50	+ 3,90	-30° 31' 55,40	- 2,54	+ 1,90
α Scorpione.	4	26° 2 21,10	- 9,95	26° 2 31,05	- 0,99	- 6,26
α Cane magg.	10	16° 29 27,98	+10,52	16° 29 19,26	+ 3,63	+ 3,04
2 α Libra.	11	15° 19 12,69	- 6,93	15° 19 19,62	+ 0,68	+ 0,38
1 α Libra.	7	15° 16 24,27	- 9,92	15° 16 34,19	- 2,22	...
2 α Capricor.	5	13° 4 10,72	- 6,35	13° 4 17,97	- 2,42	- 1,14
1 α Capricor.	3	13° 1 51,28	- 6,33	13° 1 57,61	- 3,20	- 3,65
α Vergine.	17	10° 15 35,48	- 1,42	10° 15 36,90	- 2,96	- 2,87
β Orione.	4	8° 24 38,19	+ 9,89	8° 24 28,30	+ 1,24	+ 1,71
α Idra.	9	7° 55 12,15	+ 8,01	7° 55 4,12	+ 0,17	- 0,09
α Aquario.	6	- 1° 9 1,86	- 6,21	- 1° 9 8,07	+ 0,22	+ 1,62
β Vergine.	3	+ 2° 43 54,81	+ 6,80	+ 2° 44 1,61	- 1,12	- 0,02
α Balena.	4	3° 24 28,48	+ 3,59	3° 24 31,87	+ 1,62	+ 1,16
α Cane min.	15	5° 59 18,60	+11,28	5° 59 29,88	+ 0,41	+ 0,66
β Aquila.	3	5° 59 9,95	- 8,91	5° 59 0,14	- 1,28	- 0,46
α Serpente.	5	6° 58 23,80	- 1,73	6° 58 22,07	- 1,45	- 0,3
α Orione.	7	7° 21 50,57	+ 9,14	7° 21 59,51	+ 1,16	+ 0,85
α Aquila.	6	8° 25 21,65	- 8,93	8° 25 12,72	+ 0,11	+ 0,78
γ Aquila.	4	10° 12 8,70	- 9,26	10° 11 59,44	+ 0,94	+ 1,72
α Oluco.	2	12° 41 37,59	- 5,51	12° 41 31,88	- 1,09	- 0,85
α Leone.	15	12° 48 2,42	+11,91	12° 48 14,33	+ 0,70	+ 1,44
γ Pegaso.	5	14° 13 44,14	- 7,44	14° 13 26,70	- 0,26	- 0,56
α Pegaso.	6	14° 17 2,27	- 9,29	14° 16 52,98	+ 0,17	+ 0,16
α Ercole.	3	14° 55 39,55	- 4,44	14° 55 34,89	- 1,23	+ 0,19
β Leone.	4	15° 31 46,90	+11,14	15° 31 58,04	+ 1,33	+ 1,11
α Toro.	3	16° 9 13,87	+ 4,66	16° 9 18,53	+ 1,33	+ 1,74
α Boote.	21	20° 4 45,09	+ 6,86	20° 4 51,95	+ 1,48	+ 2,17
α Ariete.	5	22° 38 47,78	- 5,26	22° 38 42,52	- 1,48	- 1,14
α Corona bor.	5	27° 17 51,92	+ 3,45	27° 17 55,57	- 0,70	- 3,22
α Andromeda.	10	28° 8 38,92	-12,25	28° 8 26,67	- 0,83	- 0,42
β Gemelli.	5	28° 25 48,52	+13,18	28° 26 1,70	- 1,02	- 0,82
β Toro.	5	28° 27 5,13	+ 5,67	28° 27 10,80	- 0,88	- 1,71
α Gemelli leg.	15	32° 15 10,43	+12,93	32° 15 23,36	0,00	+ 1,06
α Lira.	22	38° 37 48,44	- 8,01	38° 37 40,43	+ 1,13	+ 2,37
α Cigno.	40	44° 40 25,85	-15,52	44° 40 8,31	+ 0,74	+ 1,69
α Auriga.	24	+45° 48 42,03	+ 2,79	45° 48 44,82	- 0,14	+ 0,14

DECLINAZIONI DELLE STELLE CIRCOMPOLARI
FINO ALLA 4.^a GRANDEZZA INCLUSIVAMENTE.

Nome delle stelle.	N. delle osserv.	Declinazioni al principio del 1828		Precess. annua pel 1828.	Variaz. secol.	Moto proprio secondo		
		apparenti.	medie.			Piazz.	Bessel.	Bianchi.
ψ Orsa magg.	4	4 ⁵ 4 ⁵	2 ⁵ 3 ¹	2 ⁶ ,71 56,70	4 ⁵ 4,5	2 ⁵ 3,1	46,85 38,68	" 19,360 + 19,831
χ Andromeda.	5	4 ⁵ 4 ⁶	3 ¹ 6	56,70 10,66	4 ⁵ 6	3 ¹ 6	7,07 22,42	" 0,126 + 0,217
ε Ercole.	3	4 ⁶ 4 ⁶	1 ³ 4 ³	36,83 32,51	4 ⁶ 4 ⁶	1 ³ 4 ³	7,07 35,75	" 0,056 + 0,246
η 2 Cigno.	9	4 ⁶ 4 ⁶	4 ³ 4 ³	36,83 32,51	4 ⁶ 4 ⁶	4 ³ 4 ³	10,639 8,898	" 0,42 + 0,234
ζ Ercole.	7	4 ⁶ 4 ⁶	4 ³ 4 ³	32,51 38,65	4 ⁶ 4 ⁶	5 ² 5 ²	51,65 16,912	" 0,02 + 0,184
λ Boote.	4	4 ⁶ 4 ⁷	5 ² 13	38,65 48,46	4 ⁶ 4 ⁷	5 ² 4 ⁵	51,65 43,24	" 0,07 + 0,27
δ Perseo.	5	4 ⁷ 4 ⁷	13 45	48,46 25,33	4 ⁷ 4 ⁷	13 45	43,24 11,22	" 0,15 + 12,153
η ^a Andromeda.	9	4 ⁷ 3 ⁸	45 29	25,33 46,92	4 ⁷ 4 ⁸	11 29	11,22 36,87	" 0,488 + 18,600
ζ Perseo.	3	4 ⁸ 4 ⁸	42 42	46,92 18,25	4 ⁸ 4 ⁸	42 42	36,54 13,374	" 0,08 + 0,202
ε Orsa magg.	3	4 ⁸ 4 ⁹	43 14	36,20 32,49	4 ⁸ 4 ⁹	43 14	56,55 25,62	" 0,10 + 0,190
χ Perseo.	4	4 ⁹ 4 ⁹	14 24	32,49 19,58	4 ⁹ 4 ⁹	14 24	25,62 0,35	" 0,134 + 18,318
Lucerta 141 P.	5	4 ⁹ 5 ⁰	24 10	19,58 10,34	4 ⁹ 5 ⁰	19 10	0,35 25,88	" 0,190 + 7,811
θ Cigno.	5	4 ⁹ 5 ⁰	49 10	45,27 10,34	4 ⁹ 5 ⁰	49 10	32,71 25,88	" 0,154 + 18,138
η Orsa magg.	5	5 ¹ 5 ¹	22 30	25,76 46,77	5 ¹ 5 ¹	22 30	6,19 41,76	" 0,142 + 0,646
Lucerta 95 P.	6	5 ¹ 5 ¹	22 30	25,76 46,77	5 ¹ 5 ¹	22 30	6,19 41,76	" 0,204 + 0,204
γ Dragone.	3	5 ¹ 6 ²	30 25	46,77 34,58	5 ¹ 5 ²	30 25	41,76 48,59	" 0,07 + 0,178
ε Boote.	6	5 ² 5 ²	9 25	34,58 54,11	5 ² 5 ²	9 25	48,59 51,50	" 0,03 + 0,194
β Dragone.	5	5 ² 5 ²	27 27	54,11 0,31	5 ² 5 ²	27 20,36	51,50 15,430	" 0,00 - 0,390
ζ Orsa magg.	3	5 ² 5 ²	27 27	0,31 20,36	5 ² 5 ²	27 20,36	51,50 15,430	" 0,60 - 0,60

γ Boot.	52	38	41,15	52	38	54,58	-	16,451	+	0,178	-	0,54	-	0,44	-	0,43	
Perseo.	5	52	49	38,82	52	49	29,42	+	14,647	-	0,388	-	0,05	-	0,02	-	0,04
γ Cassiopea.	5	52	57	16,71	52	56	58,50	+	19,900	-	0,066	0,00	+	0,02	+	0,06	
α Cigno.	5	53	3	25,01	53	3	13,53	+	6,287	+	0,198	+	0,14	+	0,11	+	0,04
δ Auriga.	5	54	15	26,13	54	15	31,83	+	1,280	-	0,718	-	0,42	-	0,14	-	0,14
γ Orsa magg.	5	54	38	43,04	54	39	2,98	-	20,000	-	0,030	-	0,03	-	0,05	-	0,00
μ Dragone.	4	54	41	57,18	54	41	56,95	-	5,038	+	0,176	+	0,16	+	0,06	-	0,02
α Cassiopea.	7	55	35	45,84	55	35	25,81	+	19,866	-	0,060	-	0,07	-	0,03	-	0,29
γ Orsa mag. pr.	3	55	49	12,49	55	49	30,49	-	18,923	+	0,124	-	0,01	-	0,03	-	0,18
ζ Orsa magg.	4	55	52	52,76	55	53	10,68	-	18,883	+	0,124	-	0,18	-	0,08	-	0,04
ϵ Orsa magg.	5	56	53	22,37	56	53	40,05	-	19,634	+	0,086	-	0,10	-	0,11	-	0,08
ξ Dragone.	5	56	54	10,87	56	54	6,22	-	0,827	+	0,150	+	0,30	+	0,05	+	0,03
η Cassiopea.	4	56	54	20,82	56	54	2,18	+	19,759	-	0,088	-	0,72	-	0,47	-	0,49
β Orsa magg.	3	57	17	43,38	57	18	5,72	-	19,152	+	0,154	+	0,06	+	0,04	-	0,11
ζ Cefeo.	6	57	21	39,98	57	21	19,49	+	17,567	+	0,136	-	0,12	-	0,05	+	0,03
δ Orsa magg.	5	57	58	57,69	57	59	18,59	-	20,034	+	0,020	-	0,08	-	0,11	-	0,02
β Cassiopea.	5	58	12	22,11	58	13	1,87	+	20,048	+	0,012	-	0,25	-	0,21	-	0,18
γ Dragone.	5	59	1	29,12	59	1	35,11	-	10,121	+	0,148	+	0,30	+	0,33	+	0,23
Giraffa 2 Ev.	5	59	19	56,62	59	19	51,04	+	13,204	-	0,518	-	0,03
δ Cassiopea.	8	59	20	26,16	59	20	8,75	+	18,990	-	0,182	-	0,16	-	0,01	-	0,36
ι Dragone.	5	59	34	3,62	59	34	12,91	-	12,809	+	0,156	+	0,15	+	0,02	-	0,07
γ Cassiopea.	5	59	47	18,97	59	46	59,19	+	19,635	-	0,108	+	0,04	-	0,08	-	0,09
γ Cefeo.	6	61	10	37,64	61	10	19,72	+	12,999	+	0,132	+	0,81	+	0,82	+	0,71
α Orsa magg.	5	61	16	40,85	61	16	58,50	-	11,202	-	0,616	-	0,17	-	0,14
α Cefeo.	7	61	51	48,90	61	51	29,31	+	15,037	+	0,130	-	0,07	-	0,05	-	0,03
γ Dragone.	3	61	54	11,26	61	54	15,31	-	8,338	+	0,108	-	0,05	+	0,08	-	0,06
π Cassiopea.	6	61	59	11,28	61	58	51,02	+	19,938	-	0,060	+	0,02	-	0,01	+	0,01
α Orsa magg.	5	62	40	13,98	62	40	37,09	-	19,194	-	0,156	0,00	-	0,11	-	0,16	
ϵ Cassiopea.	3	62	49	19,43	62	49	3,03	+	18,088	-	0,266	-	0,15	-	0,04	-	0,05

DECLINAZIONI DELLE STELLE CIRCOMPOLARI
FINO ALLA 4.^a GRANDEZZA INCLUSIVAMENTE.

Nome delle stelle.	Numero delle osservazioni	Declinazioni al principio del 1828		Precess. annua	Variaz. secol.	Mot. proprio secondo		
		apparenti.	medie.			Piazzi.	Bessel.	Bianchi.
α Orsa magg.	3	63° 43' 0,98	" 22,09	- 15,233	- 0,456	" 0,04	+ 0,06	" 0,11
δ Dragone.	3	65 11 40,93	63 11 57,62	- 17,369	+ 0,126	+ 0,09	- 0,01	- 0,12
ι Cefeo.	3	65 18 10,54	65 17 48,25	+ 18,939	+ 0,094	- 0,111	- 0,15	- 0,16
π Dragone.	3	65 23 13,57	65 23 0,94	+ 6,851	+ 0,096	+ 0,04	- 0,06
σ Dragone.	5	65 55 34,40	65 55 34,07	- 4,482	+ 0,026	+ 0,04	+ 0,03	- 0,09
δ Dragone.	3	67 21 42,26	67 21 30,14	+ 6,234	+ 0,032	+ 0,02	+ 0,09	- 0,00
β Cefeo.	7	69 48 43,93	69 48 22,92	+ 15,704	+ 0,064	- 0,03	- 0,11	+ 0,02
λ Dragone.	6	70 16 19,71	70 16 43,54	- 19,755	- 0,086	- 0,09	- 0,11	- 0,12
κ Dragone.	5	70 43 50,42	70 44 12,83	- 19,913	+ 0,052	- 0,18	- 0,06	- 0,07
γ Cassiopea.	5	71 35 13,85	71 34 56,57	+ 17,823	- 0,304	+ 0,03	- 0,04
η Orsa min.	3	72 26 32,63	72 26 42,60	- 12,812	- 0,014	+ 0,08	- 0,10
β Orsa min.	4	74 51 16,14	74 51 29,54	+ 14,700	- 0,024	- 0,18	- 0,12	+ 0,03
α Orsa min.	5	76 27 22,06	76 27 37,54	- 16,013	- 0,042	- 0,06	- 0,03
γ Cefeo.	6	76 40 44,14	76 40 21,17	+ 19,897	+ 0,032	- 0,111	+ 0,14	+ 0,18
ε Orsa min.	3	82 18 19,60	82 18 19,95	- 4,863	- 0,936	+ 0,01	+ 0,04	- 0,11
δ Orsa min.	5	86 35 9,62	86 35 1,12	+ 2,109	- 3,850	+ 0,00	+ 0,16
α Orsa min.	10	88 23 52,12	88 23 30,46	+ 19,395	- 0,456	0,00	+ 0,02	+ 0,05

ASCENSIONI RETTE DELLA LUNA

OSSERVATE E PARAGONATE COLLE TAVOLE.

DA

FRANCESCO CARLINI.

Le osservazioni che qui sù presentano fatte nell'anno 1824 sono una continuazione di quelle già pubblicate nei volumi di queste Efemeridi per gli anni 1825 e 1827. Le riduzioni sono state calcolate noi medesimi ivi diffusamente spiegati e cogli elementi che seguono.

Intervalli de' fili all' equatore in tempo sidereo.

I	II	III	V	VI	VII
46",04	30",68	15",43	15",63	30",66	46",50

Differenza dei passaggi consecutivi superiore ed inferiore della Polare o valore di S—S' in secondi di tempo sidereo:

- dal 2 febbrajo al 12 — 3"
- dal 4 marzo al 21 giugno — 10,0
- dal 28 giugno all' 8 agosto — 24,0
- dal 10 agosto al 17 novemb. — 38,0
- dal 24 novemb. al 31 dicemb. — 17,0

Inclinazione dell'asse dell'istromento in secondi di tempo = i

dal 2 febbrajo al 10	$+ 0,20''$	dal 30 giug. al 2 lug.	$0,00''$
dal 10 febbrajo al 12	$- 0,09$	dal 3 luglio al 7	$+ 0,14$
il 4 marzo	$+ 0,40$	dall' 8 luglio all' 11	$+ 0,20$
dal 5 marzo al 19	$- 0,16$	dal 12 luglio al 15	$+ 0,25$
dal 3 aprile al 22	$- 0,30$	dal 16 luglio al 18	$+ 0,30$
il 24 aprile	$- 0,20$	dal 20 luglio al 22	$+ 0,35$
il 25 aprile	$0,00$	dal 23 lugl. al 2 agos.	$+ 0,40$
il 26 aprile	$+ 0,20$	il 3 agosto	$+ 0,55$
il 30 aprile	$+ 0,25$	dal 4 agosto all' 8	$- 0,31$
l' 1 maggio	$+ 0,30$	dal 10 agosto al 21	$- 0,07$
dal 4 maggio al 15	$+ 0,44$	dal 22 agos. al 19 sett.	$0,00$
dal 16 magg. al 7 giu.	$- 0,20$	dal 27 sett. al 17 ott.	$+ 0,40$
dall' 8 giugno al 21	$0,00$	dal 16 nov. al 26 dic.	$+ 0,00$
dal 28 giugno al 29	$- 0,27$		

Correzione della linea di fiducia in secondi di tempo ed all'equatore per tutto il corso dell'anno.

$$\phi = - 0'',14 \quad \text{per l'istromento diretto.}$$

La correzione del passaggio osservato d' una stella, di cui la declinazione sia $= D$ e la distanza dallo zenith $= Z$, si è calcolata colla formola

$$c = \frac{1}{\cos D} \left((S - S') \sin Z + i \cos Z \pm \phi \right),$$

presso il segno inferiore quando l'istromento era inverso.

Il paragone delle ascensioni rette osservate è stato fatto con quelle dedotte dalle longitudini e latitudini della Luna che dannosi calcolate in queste Effemeridi. Il calcolo di queste ultime si appoggia alle formole che abbiamo riferite negli avvertimenti premessi ai volumi degli anni 1812 e 1821.

La differenza fra le posizioni osservate e le calcolate, che ascende spesso a molti minuti secondi, deve in parte attribuirsi all'inesattezza delle formole suddette, le quali sono state adottate, come suol dirsi, provvisoriamente, affinchè ci servissero di punto di paragone nelle rettificazioni degli elementi che abbiamo già da qualche tempo intraprese; ma in parte ancora può provenire dalle osservazioni stesse, le quali sebbene istituite con buoni strumenti non vanno esenti da incertezza, massime in quei giorni in cui non essendo l'atmosfera perfettamente tranquilla, il lembo della Luna comparisce denato ed indistinto.

Ricorderemo a questo proposito che il signor Bouvard (*Connaiss. des tems pour 1825*, p. 245) avendo cercata la differenza dei meridiani fra gli osservatorj di Parigi e di Greenwich per mezzo d'un gran numero d'osservazioni contemporanee della Luna, trovò fra le diverse determinazioni delle discordanze che giungevano fino a $36''$ di tempo, il che è quanto dire che le ascensioni rette risultanti dalle osservazioni fatte nelle due speccole, ridotte ad un medesimo istante per mezzo del valor medio della differenza di longitudine, differivano talvolta fra di loro di quasi $10''$ di arco.

TAVOLA I
PASSAGGI DELLA LUNA E DELLE STELLE
OSSERVATI AL CANNOCCHIAZ MERIDIANO DI REICHENBACH.

1824.	Astri osservati.	FILI						Passaggio medio.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
2 Febbrajo.	Aldeb.	28' 1,9	28' 16,7	29' 53,1	4' 28' 49,9	29' 51	1' 7,7	4' 28' 49,21
	Capra.	5 36,8	5 58,5	5 20,4	5 6 43,0	7 52	7 26,2	5 5 42,29
	Rigel.	8 18,8	8 33,9	8 49,3	5' 9 44	9 20,3	9 35,3	8 6 43,63
	Sirio.	39 35,8	39 51,8	40 7,8	6 40 23,6	40 40,1	4 12,3	6 40 23,64
3	Aldeb.	28 3,2	18 19,1	28 25,0	4' 28 50,8	29 7,1	29 22,7	28 50,93
	Capra.	5 37,8	6 0,4	6 21,9	5 6 43,8	7 6,2	7 27,9	6 45,36
	Rigel.	8 19,8	8 35,1	8 56,7	5 9 6,1	9 21,4	9 37,0	8 6,09
	Sirio.	39 37,2	39 53,1	40 9,0	6 40 25,1	40 41,3	40 57,0	6 40 25,01
4	Aldeb.	28 4,8	28 40,8	28 56,2	0 6 40,3	6 56,5	7 11,8	0 6 40,43
	Capra.	5 56,3	6 1,6	6 25,0	5 6 45,3	29 8,9	29 24,0	5 52,44
	Rigel.	8 31,1	8 56,3	8 51,0	5 9 7,6	7 24,0	7 29,2	5 45,38
	Sirio.	39 38,7	39 56,8	40 10,3	6 40 26,7	9 25,1	9 58,1	5 8 37,39
7	Aldeb.	35 49,8	35 59,4	36 16,8	6 40 26,9	40 43,0	40 58,1	41 15,1
	Capra.	28 9,6	28 35,8	28 41,3	4' 28 57,2	36 49,6	37 6,1	37 23,4
	Sirio.	39 43,3	39 59,4	40 15,4	6 40 31,3	29 12,5	29 28,8	29 45,8
8	Aldeb.	33 22,7	33 39,7	33 56,7	3 34 14,0	34 3,8	34 48,1	35 5,6
	Capra.	28 11,2	28 26,9	28 42,5	4 28 59,2	29 14,6	29 36,0	4 28 58,84
	Rigel.	39 44,8	40 0,9	40 17,0	6 40 32,7	40 49,3	4 1 6,8	6 40 32,87
9	Aldeb.	28 12,2	28 28,2	28 44,2	4 29 0,4	29 16,3	29 52,2	4 29 0,17

		33 24,2	33 41,4	33 29,0	4 36 16,4	30 34,1	30 30,7	37 9,0	4 30 10,29
	Capra.	5 47,3	6 9,2	6 31,2	5 6 53,2	7 15,7	7 34,2	5 6 53,2	5 6 53,2
	Rigel.	8 44,2	9 0,0	5 9 15,3	9 46,3	10 2,3	5 9 15,5	5 9 15,5
	Sirio.	39 66,4	40 2,3	40 18,3	6 40 34,2	40 50,3	41 6,1	6 40 34,21	6 40 34,21
10	Aldeb.	28 14,1	28 30,1	28 45,8	4 29 2,1	29 18,1	29 34,2	29 50,1	4 29 1,97
	Spica.	18 21,9	18 57,2	18 51,9	13 19 8,6	19 24,2	19 39,1	13 19 8,57	13 19 8,57
	Aldeb.	28 15,2	28 31,2	28 47,2	4 29 3,0	29 19,0	29 32,1	4 29 3,06	4 29 3,06
	Capra.	5 59,3	6 11,4	6 34,3	5 6 56,3	7 19,2	7 40,4	5 6 56,43	5 6 56,43
	Rigel.	8 32,2	8 47,2	9 2,7	5 9 18,3	9 34,1	9 49,3	10 5,1	5 9 18,33
	Sirio.	39 49,1	40 5,5	40 21,2	6 40 37,2	40 53,3	41 8,7	41 25,4	6 40 37,07
	C	47 25,0	47 42,1	47 59,2	6 48 12,0	48 34,2	48 51,2	49 8,9	6 48 16,69
	Aldeb.	28 16,9	28 33,0	28 48,7	4 29 5,1	29 21,4	29 37,0 ⁺	29 53,4	4 29 4,97
12	Procione.	32 34,8	52 50,2	53 5,1	7 33 20,4	33 36,0	33 51,0 ⁺	34 7,1	7 33 20,54
	C	53 7,0	53 23,6	53 40,2	7 53 57,0	54 14,1	54 30,8	54 43,0	7 53 57,14
	Castore.	25 43,5	26 1,6	26 19,4	7 26 37,3	26 55,6	27 13,4	27 22,4	7 26 37,57
	Altair.	45 6,4	45 21,6	45 37,1	19 45 52,5	46 8,0	46 23,4	46 39,7	19 45 52,67
3	Marzo.	4	27 45,1	28 1,1	28 17,2	1 28 33,3	28 49,9	29 5,9	29 22,3
	Aldeb.	28 44,3	29 0,3	29 16,4	4 29 32,2	29 47,5	30 4,1	30 20,5	4 29 32,29
	Altair.	45 8,1	45 23,6	45 39,0	19 45 54,6	46 10,2	46 22,5	46 41,1	19 45 54,50
	Aldeb.	28 46,3	29 2,2	29 18,2	4 29 36,1	29 50,2	30 5,6	30 22,4	4 29 34,04
6	C	15 7,5	15 24,5	15 41,4	3 15 58,3	16 15,2	16 32,1	16 49,9	3 15 58,30
	Aldeb.	28 47,4	29 3,5	29 19,2	4 29 35,2	29 51,4	30 6,9	30 23,5	4 29 35,17
	Procione.	33 4,8	33 20,1	33 55,8	7 33 51,1	34 6,8	34 21,9	34 37,7	7 33 51,06
	Polluce.	37 26,2	37 43,8	38 1,2	7 38 18,5	38 36,0	38 53,1	39 11,2	7 38 18,47
	Altair.	45 10,7	45 26,0	45 41,4	19 45 54,0	46 12,5	46 27,9	46 43,5	19 45 56,69
	C	14 21,3	14 38,9	14 56,1	4 15 13,4	15 3,0	15 43,0	16 5,6	4 15 13,37
	Aldeb.	28 48,4	29 4,5	29 20,3	4 29 36,3	29 52,4	30 8,1	30 24,3	4 29 36,20
	Procione.	33 6,2	33 21,7	33 37,0	7 33 52,8	34 8,1	34 23,1	34 39,1	7 33 52,46

1824.	Astri osservati.	FILI						Passaggio medio.	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.		
7	Polluce. Spica. Aldeb. G	37' 27,7 18 57,1 26 49,4 56 39,9	37' 45,1 19 32,5 29 5,4 16 57,1	38' 2,6 29 28,2 29 21,4 17 14,4	38' 20,1 13 19 43,9 4 29 37,3 3 17 32,2	38' 37,8 19 59,4 29 53,6 17 20,1	38' 54,7 20 14,6 30 9,3 18 21,0	39' 12,8 20 31,0 30 25,8 18 26,7	38' 20,0 13 19 43,7 4 29 37,9 5 17 32,0
8	Aldeb. Proctone. Polluce. G	28 53,3 33 11,2 37 32,3 26 34,1	29 9,5 33 26,2 37 69,9 26 50,2	29 25,2 33 41,8 38 7,1 27 6,8	4 29 41,2 2 33 57,2 7 38 24,7 8 27 23,5	29 57,3 31 15,1 38 62,1 27 40,2	30 12,6 34 22,7 38 59,0 27 56,3	30 29,4 34 63,7 39 17,2 28 13,4	29 41,10 7 33 52,6 7 38 24,5 8 27 23,4
11	Altair. Proctone. Polluce. G	45 18,1 33 11,1 37 36,2 24 1,6	45 33,6 33 28,2 37 52,2 24 17,4	45 48,9 33 43,8 38 9,3 24 52,9	19 46 4,4 7 33 59,1 7 38 27,1 10 24 49,1	46 20,0 34 15,1 38 46,3 25 5,1	46 35,4 34 46,1 39 1,1 25 30,3	46 51,9 34 46,1 39 10,2 23 36,0	45 44,0 7 33 59,1 7 38 26,6 10 24 49,0
12	Aldeb. Sirio. Spica.	28 57,7 40 31,6 17 48,2 19 6,8	29 13,6 40 47,3 18 4,2 19 22,1	29 29,4 41 3,1 18 20,0 19 57,1	4 29 45,5 6 41 19,1 12 18 35,4 13 19 53,9	50 1,8 41 35,9 18 51,8 20 9,3	50 17,4 41 51,3 19 7,6 20 24,3	34 36,0 42 2,7 23 24,0 20 43,3	45 45,53 6 41 19,3 12 18 35,7 13 19 53,4
15	Aldeb. Antares. Spica.	28 57,7 21 46,3 21 48,1	29 13,6 22 3,4 22 4,7	29 29,4 22 26,3 22 21,4	4 29 45,5 6 41 19,1 16 5,1 16 22 38,1	50 1,8 41 35,9 6 9,3 22 55,8	50 17,4 41 51,3 19 7,6 23 12,3	34 36,0 42 2,7 23 24,0 20 43,3	45 45,53 6 41 19,3 12 18 35,7 13 19 53,4
18	D Antares. D Antares.	7 8,2 21 46,3 21 48,1	7 25,0 22 3,4 22 4,7	7 42,1 22 26,3 22 21,4	15 7 59,3 16 22 37,4 16 22 38,1	8 16,2 22 54,9 6 9,3 22 55,8	8 33,2 23 11,8 6 26,3 23 12,3	50,6 23 29,2 6 44,3 23 30,6	50,11 16 22 37,5 16 5 51,6 16 22 38,4
19	D Antares.	7 8,2 21 46,3 21 48,1	7 25,0 22 3,4 22 4,7	7 42,1 22 26,3 22 21,4	15 7 59,3 16 22 37,4 16 22 38,1	8 16,2 22 54,9 6 9,3 22 55,8	8 33,2 23 11,8 6 26,3 23 12,3	50,6 23 29,2 6 44,3 23 30,6	50,11 16 22 37,5 16 5 51,6 16 22 38,4
3	Altair. Aldeb. Altair.	45 25,1 56 58,1 29 18,1 45 42,1	45 40,3 57 15,2 29 33,8 45 57,9	45 55,4 57 32,2 29 49,4 46 13,1	19 46 11,2 3 57 49,3 4 30 5,6 19 46 28,7	46 41,8 58 7,3 30 22,1 46 44,3	46 41,8 58 26,0 30 32,3 46 59,3	58,1 58 41,3 30 53,6 46 15,3	58,1 57 49,5 4 30 5,6 19 46 28,5

5	C Proctone.	1 12,4	1 30,0	1 47,1	6 2 43	2 22,1	2 39,0	2 30,9	0 2 4,44
9	Regolo.	33 38,1	53 53,4	54 8,6	7 34 24,2	34 59,7	34 54,9	35 10,8	7 54 24,13
	Polluce.	2 52,9	2 48,0	3 5,3	10 3 19,5	3 35,2	5 50,8	4 6,8	10 3 19,27
		7 38 55,5	59 13,5	59 30,2	59 48,5	7 38 55,40
1	C Regolo.	0 8,2	0 24,1	0 39,8	10 55,2	1 11,5	1 27,2	1 43,4	10 0 55,56
10	Regolo.	2 36,0	2 51,3	3 7,1	10 5 22,9	3 39,0	3 54,1	4 10,8	10 5 23,01
11	Aldeib.	29 25,4	29 47,3	29 57,2	4 50 13,2	50 39,3	54 1,5	4 50	13,45
	Polluce.	37 51,4	38 23,3	38 40,3	7 38	7 38	57,53
12	C Spica.	49 30,8	49 46,4	50 2,0	11 50 18,0	50 33,7	50 49,2	51 5,3	11 50 17,83
	Spica.	19 35,8	19 51,5	18 17,2	13 30 22,7	18 38,6	20 53,7	21 10,2	13 30 22,59
	Altair.	43 50,4	48 6,0	46 21,3	19 48 36,3	18 52,2	47 6,0	47 23,8	19 46 36,57
	Aldeib.	49 27,2	49 43,1	49 59,1	4 30 15,3	30 31,3	30 47,0	31 3,4	4 30 15,10
13	C Regolo.	2 39,1	2 55,1	5 10,8	10 3 26,7	3 42,2	3 57,8	4 14,2	10 3 26,46
	Regolo.	44 14,2	44 30,1	44 46,0	12 45 20,0	15 18,0	15 33,7	15 50,4	12 45 14,49
	Spica.	19 36,8	19 51,9	20 7,3	13 30 24,1	10 59,5	20 54,1	21 10,3	13 30 15,36
	Regolo.	2 40,1	2 56,1	3 11,3	10 3 27,3	3 43,5	3 58,9	4 14,8	10 3 27,37
14	C (*)	13 40 52,0	41 8,2	41 24,1	41 41,3	13 40 51,66
	Aldeib.	43 21,0	43 37,3	43 53,4	13 42 16,1	13 26,4	13 42,4	13 59,4	13 43 9,89
	Sirio.	29 29,4	29 45,1	30 0,6	4 30 16,8	30 35,1	30 48,8	31 3,2	4 30 16,63
		41 2,5	41 18,4	41 34,4	6 41 50,3	42 6,7	42 33,2	42 58,7	6 41 50,39
17	C Antares.	39 37,5	39 54,2	40 11,1	14 40 28,2	40 45,2	41 1,3	41 18,4	14 40 27,87
	Markab.	22 16,2	22 33,0	22 50,0	16 23 7,2	23 24,9	23 46,2	23 59,2	16 23 7,27
		35 3,0	35 26,0	35 37,6	17 35 53,1	36 12,7	36 29,1	36 48,2	17 35 55,04
18	Regolo.	59 6,4	59 44	...	23 0 50,0	0 45,8	1 14,4	1 17,7	2 0 29,82
19	Aldeib.	29 33,1	29 48,9	30 5,0	4 30 20,8	30 36,7	30 52,8	31 9,4	4 30 20,86
	Sirio.	41 6,3	41 22,2	41 38,1	6 41 54,3	42 10,5	42 26,0	42 42,4	6 41 54,16
		24 40,8	24 57,3	25 14,3	19 25 31,6	25 48,6	26 5,2	26 25,0	19 25 31,41

(C) Lembo mancante.

1824.	Astri osservati.	FILLI						Passaggio medio.	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.		
19 Aprile.	Altair. Aldeb. Sirio. Altair.	46 ¹ 3, ¹ 29 33, ⁷ 41 6, ⁹ 45 57, ⁷	46 ¹ 28, ² 29 49, ⁴ 41 23, ¹ 46 13, ¹	46 ¹ 3, ¹ 30 5, ⁵ 41 58, ⁹ 46 28, ⁶	19 46 ¹ 33, ⁸ 30 21, ³ 42 11, ¹ 19 46 44, ²	46 ¹ 59, ⁴ 30 37, ⁴ 42 26, ⁴ 46 59, ⁹	47 14, ⁴ 30 53, ⁰ 42 43, ² 47 15, ⁰	47 30, ⁵ 31 9, ⁸ 42 43, ² 47 31, ⁰	19 46 ¹ 43, ⁶ 4 30 21, ³ 6 41 54, ⁸ 19 46 44, ¹
20	Aldeb. Sirio. Altair.	15 20, ⁴ 29 34, ¹ 41 7, ⁵ 45 58, ²	15 36, ⁷ 29 49, ⁹ 41 23, ² 46 13, ⁷	15 53, ⁵ 30 5, ⁸ 6 41 55, ⁵ 19 46 44, ⁶	20 16 9, ⁸ 4 30 21, ⁶ 42 11, ⁴ 47 0, ³	16 27, ⁰ 30 37, ⁶ 42 27, ² 47 15, ³	16 43, ³ 30 53, ⁴ 42 43, ⁴ 47 31, ³	17 0, ² 31 0,0 42 43, ⁴ 47 31, ³	20 16 10, ⁰ 4 30 21, ⁶ 6 41 55, ² 19 46 44, ⁵
21	Aldeb. Sirio. Altair.	3 31, ¹ 41 8, ⁸	3 47, ² 41 24, ⁵ 30 52, ¹	4 3, ³ 6 41 40, ⁴ 4 30 7, ⁷	21 4 19, ³ 6 41 56, ⁶ 4 30 23, ⁸	4 35, ⁴ 42 12, ⁰ 30 40, ⁸	4 51, ⁵ 42 27, ⁵ 30 55, ²	5 8, ³ 42 44, ² 31 11, ⁸	21 4 19, ³ 6 41 55, ⁶ 4 30 23, ⁶
22	Sirio. Sirio. Aldeb.	41 9, ⁵ 33 54, ² Rigel.	41 25, ⁴ 34 9, ⁷ 10 8, ⁸	41 41, ⁴ 34 25, ⁴ 10 8, ⁸	6 41 57, ⁴ 7 34 40, ⁰ 5 10 24, ³	6 42 13, ⁴ 34 56, ⁰ 10 55, ⁵	6 42 45, ⁶ 35 10,0 11 13, ⁹	21 4 19, ³ 6 41 55, ⁶ 4 30 23, ⁶	
24	Sirio. Procione.	41 9, ⁵ 33 53, ⁶ 33 54, ²	41 25, ⁴ 34 9, ⁷ 34 9, ⁷	41 41, ⁴ 34 25, ⁴ 10 25, ⁰	6 41 57, ⁴ 7 34 40, ⁰ 7 34 40, ⁰	6 42 13, ⁴ 34 56, ⁰ 34 56, ⁰	6 42 45, ⁶ 35 27, ² 35 27, ²	21 4 19, ³ 6 41 55, ⁶ 4 30 23, ⁶	
25	Sirio. Procione.	41 9, ⁵ 33 54, ² Rigel.	41 25, ⁴ 34 9, ⁷ 10 8, ⁸	41 41, ⁴ 34 25, ⁴ 10 24, ⁰	6 41 57, ⁴ 7 34 40, ⁰ 5 10 24, ³	6 42 13, ⁴ 34 56, ⁰ 10 55, ⁵	6 42 45, ⁶ 35 27, ² 35 27, ²	21 4 19, ³ 6 41 55, ⁶ 4 30 23, ⁶	
26	Polluce. C. Rigel.	38 15, ⁴ 38 11, ² 9 53, ⁶	38 32, ⁶ 38 28, ⁸ 10 8, ⁸	38 50, ⁰ 38 45, ⁸ 10 24, ⁰	7 39 7, ⁴ 39 30, ⁶ 5 10 39, ⁵	39 25, ⁴ 39 20, ⁸ 10 55, ⁵	39 42, ³ 39 37, ⁷ 5 10,0	40 70, ³ nuvol. 11 26, ⁵	
30	Procione. a Orione.	33 54, ² 49 27, ⁹	34 9, ⁷ 49 43, ²	34 25, ⁰ 49 58, ⁸	5 50 14, ²	5 50 29, ⁵	51 1, ²	51 1, ²	
1	Maggio.	34 10, ⁴ 47 2, ¹	34 26, ⁰ 47 18, ⁷	34 42, ³ 7 47 52, ¹	34 57, ¹ 10 36, ⁴	35 12, ⁰ 35 24, ¹	35 28, ⁰ 48 42, ⁹	7 34 41, ²⁴	
4	Procione. C.	34 10, ⁴ 47 2, ¹	34 26, ⁰ 47 18, ⁷	34 42, ³ 7 47 52, ¹	34 57, ¹ 10 36, ⁴	35 12, ⁰ 35 24, ¹	7 47 52, ¹⁰	7 47 52, ¹⁰	
5	Regolo. Rigel.	2 49, ⁴ 9 54, ⁷	5, ² 10 10, ⁴	5, ² 10 26, ⁰	5 10 41, ⁴ 5 10 41, ⁴	5 10 57, ⁰ 5 10 57, ⁰	5 10 39, ⁶ 5 10 39, ⁶	10 36, ¹⁴	

		46 0,8 19 48,2 29 38,5	46 17,1 20 3,3 29 54,6	46 33,2 20 19,1 30 10,4	8 46 49,4 13 20 4 30	47 6,1 20 50,2 30 43,7	47 21,9 21 5,8 30 58,2	47 39,1 21 2,8 31 15,0	8 46 49,54 13 20 34,63 4 30 26,43 9 43 2,70
6	C	Spica. Aldeb.							
9	C	Regolo. Spica. Aldeb.	2 50,4 22 33,1 19 49,0 29 40,3 9 36,8	3 6,1 22 49,1 20 4,8 30 12,2 10 12,0	3 21,5 13 20 30 11,8 34 27,8	10 3 37,3 13 20 34,7 4 30 27,6 7 34 43,5	3 53,3 13 20 30 43,7 34 59,0	4 8,7 21 6,0 30 59,5 35 13,8	10 3 37,31 13 20 34,75 4 30 27,71 7 34 43,26
10	D	Procione. Sirio. Spica. Aldeb. Rigel.							
11	D	Sirio. Spica.	41 13,6 19 49,8	41 29,2 20 5,4 12 16,7 33 58,2	23 4,8 13 20 30 12,2 10 26,7	12 23 20,8 13 20 35,6 4 30 28,3 5 10 43,1	23 37,1 20 51,7 30 63,7 10 56,8	25 52,4 21 6,8 31 0,0 11 13,9	12 23 20,84 13 20 35,78 4 30 28,13 5 10 42,67
15	D	Procione. Sirio.							
16	D	Spica. Antares.	19 50,2 22 29,0 7 4,8 41 15,1	20 6,2 22 46,0 7 22,2 41 30,9	20 21,2 23 2,9 7 39,2 41 47,9	13 20 37,2 16 23 20,1 18 7 57,2 6 42 3,2	20 53,2 23 37,1 8 14,3 42 19,1	21 8,2 23 54,8 8 3,1,2 42 34,7	13 20 37,04 16 23 26,16 18 7 56,86 7 34 44,26
17	D	Procione. Polluce. Spica.	33 59,1 38 20,3 19 51,2 2 16,8	34 14,7 38 37,9 20 2,0 2 33,2	34 29,9 38 55,0 20 22,2 2 50,4	7 34 45,4 7 39 12,5 13 20 38,0 19 5 7,8	35 0,5 ⁺ 39 50,2 20 53,3 5 24,7	35 16,0 39 47,5 21 9,1 3 41,4	35 31,8 40 5,5 21 25,0 3 59,3
18	D	Sirio. Procione. Polluce. α Orione.	41 15,4 38 20,8 49 33,5	41 31,4 38 38,0 49 48,7	41 47,6 34 30,5 38 55,7 50 4,0	6 4,2 3,7 7 34 45,8 2 39 12,9 5 50 19,5	42 19,6 35 1,3 39 30,9 50 35,0	42 51,9 35 32,2 40 5,9 51 6,0	6 42 3,48 7 34 45,72 7 39 13,90 5 50 19,46

1844.	Astri osservati.	F I L I						Passaggio medio.	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.		
18	Sirio. Orione. Sirio.	47 52,2 44 11,9 43 32,3	47 52,2 44 11,9 43 32,3	44 28,3 50 48,9 43 48,2	40 44 44,4 55 50 49,5 6 43 49	42 19,7 45 1,0 50 35,4	42 36,3 45 16,8 50 30,4	42 52,1 45 33,6 51 6,5	6 42 3,87 20 44 44,39 5 30 19,59
Maggio.	Procione. Polluce. Spica.	34 0,5 19 53,1 36 57,3	34 15,9 38 59,3 31 13,1	34 30,8 38 56,4 21 18,9	27 59 13,8 29 39,0 21 31 43,0	35 2,0 39 30,7 33 1,2	35 16,1 39 48,4 33 16,9	35 33,2 40 2,3 21 26,0	7 34 46,56 7 39 13,25 13 20 38,89
22	Sirio. Arturo. Andr. 32 48,5	... 11 49,2 3 27,6 23 4,9	12 6,3 5 45,2 1 23 20,7	6 42 14 42 9 4 39,0 1 23 37,3	13 39,0 13 55,0 4 37,7 24 9,1	42 37,8 42 37,8 4 37,7 24 25,6	42 54,6 13 51,8 4 35,5 1 23 37,05	6 42 5,95 14 12 21,99 0 4 2,72
24	Rigel. Sirio. Spica. Sirio.	10 1,7 41 19,3 19 55,9 41 21,1	10 17,1 41 34,8 20 10,5 41 37,3	10 52,9 41 51,0 20 25,9 41 52,9	5 10 48,2 6 42 6,9 15 20 41,5 6 42 9,2	42 33,6 42 33,6 20 52,4 42 24,8	42 38,3 42 38,3 21 22,7 42 41,3	5 10 48,27 6 42 6,79 13 20 41,34 6 42 9,07	5 10 48,27 6 42 6,79 13 20 41,34 6 42 9,07
25	Procione. Polluce. Spica.	34 5,2 38 26,9 19 57,3	34 21,4 38 44,3 20 13,1	34 35,9 39 1,8 20 28,2	7 34 51,3 7 39 19,1 13 20 44,4	35 6,7 ... 21 0,0	35 22,1 39 33,4 21 15,1	35 38,0 35 38,4 21 31,1	7 34 51,27 7 39 19,10 13 20 44,04
Giugno.	... Sirio. Procione. Regolo.	52 58,1 41 37,7 34 21,3 2 59,5	53 14,7 41 52,6 34 36,6 3 30,8	13 53 6 42 9,5 7 51 52,0 10 5 46,4	55 47,7 43 26,3 35 22,5 4 2,4	54 4,0 42 41,3 35 38,8 4 17,7	54 21,0 42 52,1 35 38,8 4 34,0	13 53 31,08 6 42 9,36 7 34 51,95 10 5 46,44	
7	... Sirio. Procione. Regolo.	... 52 58,1 41 37,7 34 21,3 2 59,5	... 41 52,6 34 36,6 3 30,8	... 6 42 9,5 7 51 52,0 10 5 46,4	... 43 26,3 35 22,5 4 2,4	... 54 4,0 42 41,3 35 38,8 4 34,0	... 54 21,0 42 52,1 35 38,8 4 34,0	13 53 31,08 6 42 9,36 7 34 51,95 10 5 46,44	
8	... Sirio. Procione. Regolo.	... 52 58,1 41 37,7 34 21,3 2 59,5	... 41 52,6 34 36,6 3 30,8	... 6 42 9,5 7 51 52,0 10 5 46,4	... 43 26,3 35 22,5 4 2,4	... 54 4,0 42 41,3 35 38,8 4 34,0	... 54 21,0 42 52,1 35 38,8 4 34,0	13 53 31,08 6 42 9,36 7 34 51,95 10 5 46,44	

Spica.	19	57,4	20	15,2	20	28,5	13	20	44,1	21	0,0	21	15,2	21	31,1	13	20	44,11
C. Antares.	48	27,0	48	63,7	49	0,8	14	49	17,4	49	34,7	49	51,1	50	8,7	14	49	17,50
Spica.	22	53,1	23	16,0	16	23	27,1	23	44,3	24	1,2	24	18,7	16	23	27,94
Spica.	19	57,4	20	13,0	20	28,4	13	26	44,1	21	0,1	21	15,1	21	31,2	13	26	44,09
C. Antares.	46	6,0	46	23,0	15	46	40,4	46	58,1	47	14,7	15	46	40,37
Spica.	22	36,1	21	53,2	23	16,1	16	23	27,2	23	44,2	24	1,0	24	18,8	16	23	27,11
Spica.	19	57,5	20	13,0	20	28,4	13	26	44,1	21	0,0	21	15,2	21	31,4	13	26	44,07
D. Spica.	20	13,0	20	28,4	13	26	44,1	21	0,1	21	15,3	21	31,4	13	26	44,13
D. Antares.	44	11,0	44	28,3	44	45,4	17	45	3,3	45	20,4	45	32,8	45	56,0	12	45	3,06
D. Spica.	19	57,4	20	13,1	20	28,4	13	26	44,3	21	0,1	21	15,3	21	31,5	13	26	44,20
D. Antares.	22	53,2	23	16,2	16	23	27,3	23	44,3	24	1,2	24	18,8	16	23	27,15
D.	40	19,0	40	36,2	40	53,2	18	41	10,4	41	28,2	41	45,0	42	2,4	18	41	10,50
Sirio.	41	21,8	41	37,8	41	53,4	6	42	10,0	42	26,1	42	41,4	42	58,0	6	42	9,63
Spica.	19	57,9	20	13,3	20	28,8	13	26	44,3	21	0,4	21	15,2	21	31,5	13	26	44,16
Alkibi.	21	..	21	..	51	18,0	51	34,0	1	51	50,6	52	23,4	52	39,8	1	51	50,50
Alkibi.	29	51,7	30	7,4	30	23,0	4	30	39,5	4	30	39,37
D. Alkibi.	45	35,2	45	52,2	46	8,0	2	46	24,8	46	41,9	46	58,6	47	16,1	2	46	25,13
D. Alkibi.	29	5,5	30	9,9	30	25,4	4	30	41,3	30	57,9	31	13,6	31	22,0	2	30	41,59
C. Arturo.	55	22,0	5	38,2	9	3	54,3	4	10,3	4	45,1	9	3	44,27
C. Arturo.	14	13	20,2	14,12
C. Regolo.	0	51,3	1	7,3	1	23,1	10	1	39,0	1	55,1	2	19,8	2	27,1	10	1	39,05
C. Regolo.	5	4,2	5	19,5	5	35,2	10	3	51,0	4	75	6	22,5	6	38,6	10	3	51,10
C. Antares.	55	58,7	56	14,4	56	50,1	10	56	45,4	57	1,8	57	12,1	57	33,2	10	56	45,67
L. E. 2	22	41,3	22	58,7	23	15,3	16	23	32,7	23	50,2	24	6,6	24	24,3	16	23	32,63
Regolo.	3	4,4	3	20,3	3	55,6	10	3	51,5	4	7,3	4	23,1	4	39,2	10	3	51,56
C. Spica.	42	37,9	42	51,0	43	9,6	12	43	25,8	43	42,1	43	57,5	44	16,2	12	43	25,79
C. Antares.	20	2,5	20	18,2	20	32,6	13	20	49,4	21	5,0	21	20,4	21	36,4	13	20	49,26
C. Antares.	22	41,5	22	58,3	23	15,4	16	23	32,7	23	49,9	24	6,4	24	24,2	16	23	32,51

1824.	Astri osservati.	F I L I						Passaggio medio.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
Luglio.	Spica.	20 2,4	20 18,1	1 " "	13 20 49,3	21 5,1	1 " "	21 36,2
	Antares.	22 41,2	22 58,2	23 15,2	16 23 32,3	23 50,0	24 6,3	15 20 49,13
	Regolo.	3 4,4	3 20,2	3 36,0	10 3 5,4	4 22,5	4 59,2	16 23 32,37
	Spica.	20 2,3	20 17,9	20 33,2	13 20 48,8	21 4,7	21 19,7	10 3 51,49
6	C	31 9,5	31 26,3	31 43,0	14 32 9,0	32 18,0	32 33,1	32 50,5
	Antares.	22 41,2	22 58,3	23 15,2	16 23 32,3	23 49,7	24 6,2	16 23 32,29
	Sirio.	41 26,2	41 42,2	41 58,1	6 42 16,0	42 30,3	42 45,9	6 42 14,09
	Regolo.	10 3 51,3	4 7,4	4 22,7	10 3 51,27
7	C	27 26,1	27 43,1	28 0,3	15 28 17,5	28 35,0	28 51,5	29 9,4
	Altair.	46 18,2	46 50,4	46 50,4	19 47 5,0	47 21,0	47 36,0	15 28 17,44
	Sirio.	41 26,3	41 42,4	41 58,1	6 42 14,2	42 30,3	42 45,7	19 47 4,98
	Antares.	22 40,9	22 57,7	23 14,4	16 23 31,7	23 49,2	24 5,9	6 42 13,94
8	C	24 43,1	25 0,5	25 17,7	16 25 35,2	25 53,0	26 9,9	26 28,1
	Regolo.	3 3,6	3 19,5	3 35,0	10 3 59,9	4 7,0	4 22,1	4 38,5
	Spica.	20 1,6	20 17,3	20 32,8	13 20 48,4	21 4,4	21 19,5	10 3 50,87
	Antares.	22 40,3	22 57,9	23 14,9	16 23 31,9	23 49,2	24 5,8	13 20 48,40
9	C	22 5,5	22 23,1	22 40,3	17 22 57,8	23 15,5	23 33,1	23 50,7
	Sirio.	41 26,6	41 42,2	41 57,9	6 42 14,0	42 30,1	42 45,8	12 22 57,93
	Spica.	20 1,4	20 17,0	20 32,4	13 20 48,2	21 3,8	21 19,2	6 42 14,03
	C	18 23,2	18 40,4	18 57,7	18 19 15,2	19 23,1	19 50,1	21 35,2
10	Altair.	46 18,2	46 33,4	46 49,0	19 47 4,4	47 20,2	47 35,3	47 51,3
	Sirio.	6 42 ...	42 30,0	42 45,8	19 47 4,46
	Spica.	20 1,0	20 16,4	20 32,2	13 20 47,5	21 3,4	21 18,5	6 42 13,53
	Antares.	22 39,9	22 57,0	23 13,9	16 23 31,2	23 48,2	24 5,1	13 20 47,7

12	Sirio.	12 37,1	12 34,0	13 10,7	19 15 27,8	10 13,2	14 1,4	14 19,1	19 13 27,7
13	Spica.	14 56,9	15 7,3	15 26,2	19 15 4,3	15 58,3	16 14,8	16 32,4	19 15 61,0
11	Antares.	41 26,1	41 4,8	41 57,2	6 42 13,4	42 36,3	42 45,1	16 2,3	6 43 15,6
	Altair.	20 0,4	20 16,3	20 31,4	13 20 46,9	22 3,1	21 18,3	21 34,2	13 20 47,10
	Sirio.	46 17,2	46 32,4	46 47,9	19 47 5,8	47 19,3	47 34,5	47 56,4	19 47 34,7
	Spica.	46 22,2	46 39,1	46 53,3	20 7 11,9	7 29,2	7 44,8	8 2,3	20 12,00
12	Antares.	41 25,3	41 ...	41 56,7	6 42 13,0	42 29,5	42 44,9	43 1,2	6 43 12,84
	Altair.	55 16,9	55 4,2	55 47,2	20 56 3,3	56 18,8	56 35,5	56 52,3	20 53,0
13	Spica.	20 0,2	20 15,4	20 51,0	13 29 66,4	21 24	21 24	21 21,5	13 29 46,64
	Antares.	23 38,6	22 55,4	23 12,9	16 25 30,0	23 42,2	24 23,2	24 21,5	16 23 28,80
	Altair.	46 16,9	46 31,9	46 47,1	19 47 3,1	47 18,9	47 33,8	47 49,9	19 47 3,00
	Sirio.	41 25,2	41 59,4	41 55,0	20 56 3,3	56 18,8	56 35,5	56 52,3	20 53,0
	Markab.	41 25,2	41 40,9	41 56,3	6 42 11,9	42 28,5	42 22,2	1 38,4	23 0 50,45
	Sirio.	49 59,4	20 16,9	20 30,4	13 29 45,6	21 1,5	21 16,8	43 1,3	6 43 12,04
	Spica.	22 38,2	22 55,2	23 12,3	16 23 29,3	23 46,8	24 3,3	21 33,0	13 20 45,80
	Antares.	41 25,2	41 59,4	41 55,0	23 12,3	23 46,8	24 3,3	24 21,1	16 23 29,31
14	Altair.	46 16,1	46 31,5	46 46,7	19 47 2,2	47 18,2	47 33,0	47 49,2	19 47 2,30
	Markab.	41 51,4	41 7,4	42 25,2	21 42 39,0	42 55,2	43 11,1	43 27,2	21 43 39,11
	Sirio.	40 2,8	0 18,0	0 34,9	23 9 59,2	4 63	1 21,4	1 38,4	23 0 50,11
	Capra.	41 25,8	41 ...	41 47	6 42 11,4	42 28,4	42 41,7	43 0,5	6 43 11,84
	Altair.	46 15,9	46 30,9	46 46,3	19 47 2,4	47 12,5	47 32,7	47 48,8	19 47 1,80
	Markab.	41 2,5	41 17,7	42 24,8	22 27 40,2	27 56,5	28 11,9	28 28,4	22 27 40,61
	Capra.	42 23,9	42 46,2	42 8,3	23 9 49,3	4 54	1 20,9	1 37,2	23 0 49,34
	Rigel.	41 1,5	40 17,0	40 21,9	20 57,0	5 10 52,7	27 8,0	27 23,5	41 1,0 52,51
15	Markab.	41 11,3	41 26,2	41 43,1	0 22,8	23 0 49,0	1 4,4	1 36,3	23 0 48,64
	Capra.	7 23,7	7 46,0	8 7,5	23 11 58,1	24 1,3	12 29,2	12 45,9	23 11 58,24
					5 8 29,8	8 52,2	9 13,7	.. .	5 8 29,28

1824.	Astri osservati.	FILI							Passaggio medio.		
		I.		II.		III.		IV.	V.		
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
15	Rigel.	10	5,8	10	20,8	10	36,5	5	10	51,8	11 22,7
Luglio.	Mark.	55	44,3	55	59,9	56	15,2	25	9	47,92	11 38,6
16	Aldeb.	29	49,1	30	5,8	30	20,7	4	30	36,3	1 35,5
	Capra.	17	23,0	7	44,9	8	27,0	5	8	28,8	23 5,6
	Rigel.	10	4,6	10	20,3	10	35,7	5	10	51,2	11 38,5
	Mark.	59	59,9	59	15,7	59	0,3	23	0	47,31	1 35,3
17	D	41	31,6	41	47,3	42	3,2	0	42	19,2	0 42 19,14
	Aldeb.	30	4,2	30	10,5	30	19,1	4	30	27,2	4 30 36,19
	Aldeb.	29	47,4	30	3,3	30	-5,6	4	30	35,0	1 30 26,88
	Capra.	7	43,7	8	-5,6	5	8	27,3	4 30 35,24
18	Rigel.	10	19,2	10	34,3	10	49,9	5	10	49,9	11 20,7
	D	17	2,2	17	18,6	17	34,2	17	33,3	18 26,5	3 35,66
	Aldeb.	29	46,5	30	1,7	30	17,6	4	30	33,7	3 33,78
	Capra.	7	20,3	7	42,3	8	4,0	5	8	26,2	5 8 26,15
19	Rigel.	10	2,4	10	17,7	10	33,1	5	10	48,8	11 19,5
	D	17	4,7	17	21,7	17	38,8	4	17	56,9	18 31,2
	Aldeb.	29	45,3	30	0,9	30	17,3	4	30	49,4	3 21,3
	Rigel.	10	17,3	10	32,4	5	10	48,2	11 19,0
20	Capra.	10	1,2	10	16,3	10	0,9	5	11	3,1	11 35,9
	Rigel.	20	35,2	20	52,6	21	9,3	5	21	27,0	11 18,3
	D	11	32,3	11	48,4	12	4,5	14	12	21,0	11 34,4
	Arturo.	5	8	24,5	5 11 47,42
21	Capra.	8	47,2	9 84	5 21 26,88
	Rigel.	5	11	3,1	11 34,4
	D	5	21	1,3	11 19,3
	Arturo.	12	37,5	13 10,4	14 12 20,95

23	Aureo.	29 44,4 7 18,8	30 0,3 7 40,5	30 10,2 7 10,5	4 00 5 8	32,2 24,3	30 48,2 8 46,7	31 2,2 9 7,8	31 20,2 9 31,0	4 30 5 8	32,07 24,35	
Capra.	Rigel.	10 16,1 29 55,2	11 42,5 20 1,8	11 58,6 13 50,7	10 47,2 20 17,4	11 12 14 14 13 20	12 15,2 14 14 13 33,1	12 31,2 14 24,5 10 48,5	11 17,2 14 46,5 21 3,9	11 13,3 14 40,6 21 20,1	5 10 4 30	46,82 27,22
Rigel.	Aldab.	29 39,3	30 11,3	4 30 5 30	30 27,2	30 43,5	30 58,8	31 15,4	31 20,2	13 20 14 12	33,11 15,10	
31												
1	Spica.	19 46,4 11 26,4	20 2,1 11 42,5	20 17,2 11 58,6	13 20 14 12 13 50,7	13 20 14 14 13 20	13 20 12 31,2 14 24,5 10 48,5	21 3,9 12 47,6 14 40,6 21 3,9	21 20,2 13 4,6 14 57,7 21 20,1	13 20 14 14 13 20	33,11 15,10 32,92	
Agosto.	Arturo.	19 46,4 11 26,4	20 1,8	20 17,4	13 20 14 14 13 20	13 20 14 14 13 20	13 20 12 31,2 14 24,5 10 48,5	21 3,9 12 47,6 14 40,6 21 3,9	21 20,2 13 4,6 14 57,7 21 20,1	13 20 14 14 13 20	33,11 15,10 32,92	
2	Spica.	19 46,4 11 26,4	20 1,8	20 17,4	13 20 14 14 13 20	13 20 14 14 13 20	13 20 12 31,2 14 24,5 10 48,5	21 3,9 12 47,6 14 40,6 21 3,9	21 20,2 13 4,6 14 57,7 21 20,1	13 20 14 14 13 20	33,11 15,10 32,92	
3	C Antares.	9 43,2 22 25,1	10 0,6 22 42,0	10 17,5 22 59,1	15 10 16 23 16 26,4	15 10 16 23 16 7	15 10 16 23 16 7	10 51,9 23 33,2 8 1,6	11 8,2 23 50,1 8 18,3	11 26,1 24 7,3 8 36,3	15 10 16 23 16 2	34,34 16,02 43,91
	C Altair.	6 52,1 45 59,8	7 9,4 46 13,4	7 26,4 46 31,0	19 46 19 46	19 46 47	19 46 47	19 46 47	19 46 47	19 46 16 23	15 10 16 23 19 46	46,30
4	Spica.	19 40,5 45 57,6	19 56,3 46 15,2	20 11,6 16 28,4	13 20 19 46	27,3 47,1	20 43,5 46 15,1	20 58,5 47 15,0	21 14,4 47 31,0	13 20 19 46	27,28 44,07	
5	Spica.	19 37,8 22 16,1	19 53,1 22 33,2	20 8,6 22 50,2	13 20 16 23	24,4 7,3	20 40,2 23 25,1	20 55,3 23 41,5	21 14,4 23 59,1	13 20 16 23	24,30 7,35	
	C Antares.	54 53,1	55 10,2	0 41,0 46 9,3	0 58,0 46 24,7	18 1 19 46	15,5 40,3	1 33,2 46 56,2	1 50,2 47 11,4	2 8,2 47 27,2	18 1 19 46	15,52 40,35
6	C Altair.	45 54,2	46 9,3	55 10,2	55 27,3	18 55	44,4	23 22,2 23 38,8	23 38,8 23 53,9	16 23 18 55	16 23 18 55	45,53 44,50
	C Antares.	54 53,1						56 20,0 56 18,9	56 36,4			
7	Altair.	45 51,7 19 31,5	46 7,2 19 47,4	46 22,5 20 2,5	19 46 13 20	38,2 18,5	46 54,0 20 34,2	47 9,2 47 11,4	47 25,1 21 55	19 46 13 20	38,18 18,27	
	C Antares.	22 10,4	22 27,3	22 44,3	16 23	1,4	23 18,7	23 35,3	23 35,3	16 23	16 23	1,51
	Altair.	45 48,2	46 3,7	46 18,3	19 46	34,8	19 46	19 46	34,67
	C Spica.	47 16,0 19 44,0	47 32,5 46 0,1	19 47 19 59,4	13 20 19 46	49,2 31,3	48 6,3 20 30,7	48 22,5 20 46,0	48 40,1 21 2,0	19 47 13 20	49,21 11,95	
8	Altair.	36 32,4	36 48,4	37 5,0	20 37	21,6	37 38,2 66 47,0	37 54,2 47 2,3	38 10,9 47 18,3	19 46 19 66	31,37 21,41	
	C											

1824.	Astri osservati.	FILI						Passeggio medio.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
Agosto.	23,5	11 39,7	11 55,0	22 12 11,3	12 26,8	12 42,2	12 58,5	22 12 11,3
	47,9	45 51,4	46 2,2	6 41 ..	6 52,2	6 26,3	6 41 ..	6 41 35,79
	36,2	19 46 22,2	46 58,3	46 53,3	47 9,3	19 46 22,2
12	36,2	22 56 38,2	56 54,4	57 9,6	57 20,8	22 56 38,2

13	Markab.	59 39,2	59 54,3	23 0 10,2	0 26,2	0 41,9	0 58,1	23 0 10,26
	Sirio.	59 35,8	59 51,3	6	42 19,3	6 41 30,80
	Markab.	40 26,3	40 41,8	23 40 52,4	41 13,3	41 28,4	0 58,8	23 0 7,98
14	Sirio.	40 39,3	40 55,3	41 11,3	6 41 22,5	41 43,5	41 59,3	42 15,6
	Altair.	45 29,7	45 45,1	46 9,9	19 46 16,2	46 31,7	46 47,9	47 3,1
	Altair.	45 26,5	45 41,9	45 57,2	19 46 12,9	46 28,2	46 43,6	19 46 12,67
15	1 31,3	1 47,4	2 2	3,7	2 20,4	2 36,4	2 35,5
	2 3,2

16	Aldeb.	28 58,8	29 14,6	29 30,7	4 29 46,3	30 24,1	30 18,2	30 34,5
	Alt. inv.	45 19,6	45 36,0	45 51,0	19 46 6,7	46 22,3	46 37,5	46 53,0
	Altair i.	45 16,7	45 32,5	45 48,6	19 46 3,4	46 19,1	46 50,2	19 46 3,13
17	Inv.	50 30,3	50 48,0	51 4,5	51 21,6	51 39,1	52 12,8	51 21,87
	Ald. i.
	Capra i.	6 25,4	6 48,0	7 9,1	6 7 3,9	7 54,3
(*)	Rigel i.	9 7,3	9 23,3	9 58,5	6 9 53,8	10 9,7	10 24,7	10 40,5
	Sirio.	40 23,7	40 40,4	40 55,2	6 41 12,3	41 43,2	42 9,7

18	Altair i.	45 15,3	45 31,6	45 46,3	19 46 2,1	46 12,7	46 33,0	46 48,8
	Ald. i.	29 7,7	29 23,4	4 29 39,4	29 55,6	30 11,5	30 27,4	6 7 31,79
	i.	51 9,2	51 26,2	4 51 64,1	52 1,3	52 18,4	52 36,0	4 51 43,0
19	Canna i.	6 6,5	6 16,8	7 10,1	7 56,2	8 15,3	8 38,2	8 32,5

	Rigel.	i.	9	38,5	5	9	54,6	10	10,2	10	25,2	10	40,7	5	9	56,28				
19	Proc.	i.	..	23,7	..	7	53	54,5	54,27				
	Spica	i.	18	58,0	19	16,2	13	19	45,2	20	0,8	20	31,5	13	19	45,17				
	Arturo	i.	10	37,6	11	54,4	14	11	37,0	11	43,5	12	15,8	14	11	26,99				
	Ant.	i.	21	57,2	21	54,7	22	11,4	16	22	38,5	22	45,6	23	2,6	16	22	28,62		
	Altair	i.	54	1,5	54	18,2	54	36,1	19	46	23,2	46	18,0	46	33,0	19	46	33,25		
	dir.		40	24,2	40	40,3	40	56,5	6	61	12,4	55	11,2	55	22,6	5	54	53,95		
	Sirio.															6	41	12,57		
	Procione.		35	7,7	35	23,4	33	38,4	7	33	64,0	34	9,2	34	40,6	7	33	54,00		
	Arturo.		10	55,2	11	11,4	14	11	27,6	11	64,2	12	0,2	13	17,2	14	11	27,68		
	Antares.		21	55,2	23	12,4	16	23	29,9	22	67,3	23	3,3	23	21,5	16	22	29,58		
	Altair.		45	16,2	45	32,0	45	67,0	19	46	2,5	46	18,0	46	33,9	19	46	2,57		
	Capra.		6	48,7	7	18,5	6	7	52,5	7	55,2	8	16,7	8	49,1	5	7	32,64		
	Quavolo.		58	22,9	58	39,0	58	55,-	6	59	42,5+	59	28,5	59	47,0	0	4,2	6	59	13,71
21	Arturo.		10	55,1	11	11,4	14	11	27,6	11	64,1	12	0,1	13	17,0	14	11	27,58		
	Aldeb.		28	52,8	29	8,1	29	24,2	4	29	39,9	30	56,3	31	12,8	4	39	46,27		
	Sirio.		40	25,1	40	41,2	40	57,0	6	41	12,9	41	29,5	41	45,0	42	14	6 41 13,92		
	Quavolo.		2	9,3	2	24,6	2	41,4	8	3	57,3	3	14,2	3	46,7	8	2	57,66		
	Arturo.		10	39,1	10	55,1	11	11,5	14	11	28,2	11	64,5	12	0,6	13	17,2	14	11	27,83
	c Serp.		38	49,4	38	56,1	39	11,2	15	39	27,1	39	43,0	39	58,0	40	13,3	15	39	26,98
	Altair.		45	17,1	45	32,2	45	47,7	19	46	3,1	46	34,3	19	46	3,32
23	a Erc.		9	61,1	9	57,1	10	13,0	17	10	28,2	10	64,9	11	0,0	11	16,4	17	10	28,64
24	c Erc.		9	41,8	9	57,4	10	13,3	17	10	29,4	10	64,3	11	0,5	11	17,2	17	10	29,22
	Altair.								15	46	4,1	46	20,0	46	35,4	46	51,3	19	46	4,55
	Arturo.		10	40,8	10	57,5	11	13,4	14	11	29,8	11	46,2	12	1,8	12	18,4	14	11	29,58
	a Ofiuco.		29	51,7	30	7,3	30	23,0	17	36	38,8	30	54,5	31	9,9	31	26,0	17	38	38,70
	B Ofiuco.		37	53,8	38	9,2	38	24,4	17	38	40,0	38	55,4	39	10,4	39	26,4	17	38	39,90
	Aldeb.		28	54,7	29	11,1	29	27,0	4	29	42,9	29	59,4	30	14,9	4	39	43,98	33	133

(*) Accorciato il Pendolo a 5° 47' di tempo siderico.

1824.	Astri osservati.	FILI						Passaggio medio.
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	
Agosto.	Capra. Rigel. Arturo. Antares.	6' 294 " 294 10 41,4 21 57,8	6' 51,6 9 26,6 10 57,7 nuvolo	7 14,4 9 43, 11 16,	5' 7 35,4 5' 9 57, 14 11 36, 16	7 52,7 10 13,3 11 47,0	8' 19,4 10 28,5 12 2,8	8' 42, 5' 7 35, 5' 9 57, 16 11 36, 16 22 31,
	Aldeb. Antares. Aldeb. Capra.	28 55,7 21 41,6 6 53,1	29 11,7 21 58,7 7 15,1	29 27,5 16 23 33, 4 29 44, 5 7 37,0	4' 29 43,8 16 23 50, 30 0,1 7 59,4	30 50,3 22 50,3 30 0,4 8 20,9	30 15,4 23 6,8 30 16,1	4 29 43,6, 16 22 32, 6 29 44,2, 5 7 37,02
	Rigel. α Orione. Antares. Aldeb.	9 12,5 21 42,5 28 57,0	9 27,8 21 59,5 29 29,1	9 43,4 22 16,5 4 29 45,1	5' 9 59,0 16 22 33, 30 1,3	10 15,0 22 51,0 30 1,3	10 29,8 23 7,5 30 16,7	5 9 58,9, 5 49 32, 16 22 33, 4 29 45,90
	Capra. Rigel. Arturo. C	6 31,5 9 13,0 10 43,5 47 59,0	6 53,7 9 28,2 10 59,8 48 13,5	7 15,4 9 44,0 11 16,1 14 48 49,5	5' 7 37,4 10 9 59,5 14 11 32,4 14 48 49,5	7 59,8 10 15,5 11 49,1 49 8,6	8 21,0 10 30,4 12 5,1 49 25,1	5 7 37,44 5 9 59,47 12 21,7 14 48 49,71
Settembre.	Antares. Arturo. C Antares. 10 44,0 21 43,8 11 0,4 22 0,6 46 55,1 22 18,5 14 11 33,0 15 47 12,5 16 22 33,0	22 51,3 12 49,4 47 30,1 22 50,5+	23 8,0 12 5,4 47 42,0 23 8,3	16 22 35,65 14 11 32,83 15 47 12,53 16 22 34,23
	Antares. C Altair. Sirio.	45 23,1 40 30,2	45 54,0 45 37,7 40 46,0	45 53,1 45 37,7 41 2,2	16 45 29,0 19 46 8,7 6 4, 18,4	22 52,1 45 46,9 46 24,3 41 34,4	23 9,0 46 3,3 46 39,0 41 50,5	16 22 34,92 16 45 28,90 16 45 28,94 6 4, 18,38

1824.	Astri osservati.	FILLI						Pausaggio medio.	
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.		
15 Settembre	Aldeb. Capra. Rigel. D	29' 6,8 6 41,0	29' 23,1 7 43,1	29' 39,0 7 25,2	4' 29' 55,0 5 7 47,3	30' 11,0 8 10,0	30' 26,8 8 31,5	30' 42,8 8 33,3	4' 29' 55,0 5 7 47,6,1
16	Arturo. Altair. Sirio.	10 52,2 31 49,3 49 39,9	11 9,3 12 6,7 40 56,2	11 25,2 19 46 32 23,3	14 11 41,5 19 46 32 41,0	11 58,2 46 32,7 32 58,2	12 14,4 46 48,1 33 14,9	12 30,5 42 3,0 32 32,2	
17	Procione. Polluce. Arturo. Sirio.	33 25,2 57 44,4 10 52,7 40 40,6	33 39,5 38 2,4 11 9,0 40 56,8	33 54,4 38 19,3 11 25,9 41 12,3	7 34 10,0 2 38 37,3 14 11 42,2 6 41 28,8	34 25,4 38 34,7 11 58,8 41 45,0	34 40,8 39 22,2 12 15,0 42 0,7	34 56,5 39 29,4 12 31,2 42 16,8	
18	Polluce. Altair. Procione.	33 44,3 37 45,3 33 24,7	34 1,5 38 3,3 65 47,2	34 18,2 38 29,4 46 3,0	7 34 35,2 7 38 37,8 19 46 18,7	34 51,7 38 55,3 46 34,0	35 8,5 39 12,8 47 5,1	34 25,3 39 39,0 12 31,2	
19	Polluce. Arturo. Altair.	37 45,5 34 36,5 45 32,3	38 3,8 34 53,5 45 49,4	38 21,1 35 9,5 11 11,3	7 38 38,3 8 35 26,3 14 11 43,6	38 55,8 35 45,0 12 0,5	39 13,3 38 38,0 12 16,5	34 35 2,2 35 2,1 12 25,5	
20	Arturo. Altair.	11 0,0 21 9,1 45 38,7 17 30,2	11 17,3 21 27,2 45 56,7 17 48,0	14 1,5 16 22 19 46 18 5,2	22 18,8 22 4,3 46 56,8 18 ..	22 36,1 46 56,8 47 ..	12 39,9 22 53,5 47 ..	14 11 49,8,0 16 22 1,4,8 19 46 25,5,1 18 18 32,8,0	

			istruzione	verso.	
Altair.	45 40,9	45 56,9	46 11,8	19 46 27,7	19 46 27,7
Altair.	45 45,2	46 1,3	46 16,3	19 46 32,2	19 46 32,2
(C	38 49,8	39 6,5	39 21,7	21 39 58,9	39 38,0
Mark.	59 56,1	0 11,2	23 0 27,3	23 0 27,3
Ottobre.	9	Vega.	34 45,6	35 4,7	18 35 24,2
	10	Altair.	21 40,3	21 56,2	19 46 39,0
	11	D Aldeh.	29 30,8	29 47,2	2 22 13,4
	12	Mark.	59 42,0	59 58,2	0 15,8
	13	Vega.	34 28,7	34 49,1	18 35 28,4
	14	Aldeh.	29 34,2	29 51,2	3 30 6,2
	15	Capra.	7 9,2	7 31,8	5 8 16,0
	16	Rigel.	9 51,2	10 2,0	10 22,2
	17	D Sirio.	12 2,3	12 3,3	12 19,5
	18	Sirio.	41 2,3	41 23,8	6 41 55,7
	19	Sirio.	43 15,0	43 31,3	6 42 2,8
	20	α Aquar.	1 20,1	1 35,2	1 50,9
	21	α Aquar.	1 21,1	1 36,3	1 51,8
	22	Spica.	20 43,4	20 59,0	21 14,5
	23	(C	13 1,2	13 17,9	13 34,1
	24	α Aquar.	1 34,0	1 49,2	2 44,5
	25	Altair.	47 1,3	47 16,7	47 32,0
	26	α Aquar.	2 16,1	2 32,2	2 48,3
	27	Spica.	20 48,4	21 44,2	21 51,9
	28	Arturo.	12 28,0	47 19,9	13 33,4
		Altair.	47 4,5	47 35,2	14 13 16,5
		α Aquar.	34 26,1	19 47 50,7
		(C		34 41,4	22 2 25,1
				22 34 51,1	35 12,8
					35 44,5
					35 44,5

26
26
Altair.
G. St. John.

47
47
Altair.
G. St. John.

58
58
Altair.
G. St. John.

69
69
Altair.
G. St. John.

80
80
Altair.
G. St. John.

91
91
Altair.
G. St. John.

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	Passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variaz. diurna.
Feb. 2	Aldeb.	"	2 28 49,22	2 25 51,91	2 57,31	"
	Capra.	+ 0,08	5 6 42,37	5 3 45,03	2 57,34	
	Rigel.	- 0,03	5 9 4,63	5 6 6,96	2 57,67	
	Sirio.	- 0,09	6 40 23,55	6 37 25,65	2 57,90	
	Aldeb.	+ 0,01	4 28 50,91	4 25 51,90	2 59,01	+ 1,44
3	Capra.	+ 0,08	5 6 43,64	5 3 45,02	2 58,61	
	Rigel.	- 0,07	5 9 6,02	5 6 6,95	2 59,07	
	Sirio.	- 0,09	6 40 24,92	6 37 25,64	2 59,28	
	Aldeb.	+ 0,01	4 28 52,45	4 25 51,88	3 0,57	+ 1,50
	Capra.	+ 0,08	5 6 45,38	5 3 45,00	3 0,38	
4	Rigel.	- 0,07	5 9 7,53	5 6 6,94	3 0,38	
	Sirio.	- 0,09	6 40 26,50	6 37 25,63	3 0,87	
	Aldeb.	+ 0,01	4 28 57,20	4 25 51,85	3 5,35	+ 1,57
	Sirio.	- 0,09	6 40 31,11	6 37 25,61	3 5,50	+ 1,75
	Aldeb.	+ 0,01	4 28 58,85	4 25 51,83	3 7,02	
7	Sirio.	- 0,09	6 40 32,78	6 37 25,61	3 7,17	
	Aldeb.	+ 0,01	4 29 0,18	4 25 51,82	3 8,38	+ 1,35
	Capra.	+ 0,08	5 6 53,31	5 3 44,91	3 8,40	
	Rigel.	- 0,07	5 9 15,28	5 6 6,88	3 8,40	
	Sirio.	- 0,09	6 40 34,12	6 37 25,60	3 8,52	+ 1,81
8	Aldeb.	+ 0,01	4 29 1,98	4 25 51,81	3 10,17	
	Spica.	- 0,29	13 19 8,28	13 15 57,96	3 10,32	+ 0,84
	Aldeb.	- 0,25	4 29 2,81	4 25 51,79	3 11,02	
	Capra.	- 0,32	5 6 56,11	5 3 44,87	3 11,24	
	Rigel.	- 0,24	5 9 18,09	5 6 6,85	3 11,24	
9	Sirio.	- 0,23	6 40 36,84	6 37 25,58	3 11,26	+ 1,93
	Aldeb.	- 0,25	4 29 4,72	4 25 51,77	3 12,95	
	Procione.	- 0,24	7 35 20,50	7 30 7,04	3 12,66	
	Castore.	- 0,27	7 26 37,30	7 23 24,19	3 13,11	
	Altair.	- 0,24	19 45 52,43	19 42 11,81	3 40,62	
10	Aldeb.	+ 0,12	4 29 32,32	4 25 51,43	3 40,89	+ 1,33
	Altair.	- 0,38	19 45 54,12	19 42 12,41	3 41,71	+ 1,36
	Aldeb.	- 0,38	4 29 33,66	4 25 51,41	3 42,25	+ 1,15
	Aldeb.	- 0,38	4 29 34,79	4 25 51,39	3 43,40	
	Procione.	- 0,39	7 33 50,67	7 30 7,44	3 43,23	
11	Aldeb.	+ 0,12	4 29 32,32	4 25 51,43	3 40,89	+ 1,33
	Altair.	- 0,38	19 45 54,12	19 42 12,41	3 41,71	+ 1,36
	Aldeb.	- 0,38	4 29 33,66	4 25 51,41	3 42,25	+ 1,15
	Aldeb.	- 0,38	4 29 34,79	4 25 51,39	3 43,40	
	Procione.	- 0,39	7 33 50,67	7 30 7,44	3 43,23	
12	Sirio.	- 0,23	6 40 36,84	6 37 25,58	3 11,26	+ 1,93
	Aldeb.	- 0,25	4 29 4,72	4 25 51,77	3 12,95	
	Procione.	- 0,24	7 35 20,50	7 30 7,04	3 12,66	
	Castore.	- 0,27	7 26 37,30	7 23 24,19	3 13,11	
	Altair.	- 0,24	19 45 52,43	19 42 11,81	3 40,62	
Marz. 3	Aldeb.	+ 0,12	4 29 32,32	4 25 51,43	3 40,89	+ 1,33
	Altair.	- 0,38	19 45 54,12	19 42 12,41	3 41,71	+ 1,36
	Aldeb.	- 0,38	4 29 33,66	4 25 51,41	3 42,25	+ 1,15
	Aldeb.	- 0,38	4 29 34,79	4 25 51,39	3 43,40	
	Procione.	- 0,39	7 33 50,67	7 30 7,44	3 43,23	
4	Aldeb.	+ 0,12	4 29 32,32	4 25 51,43	3 40,89	+ 1,33
	Altair.	- 0,38	19 45 54,12	19 42 12,41	3 41,71	+ 1,36
	Aldeb.	- 0,38	4 29 33,66	4 25 51,41	3 42,25	+ 1,15
	Aldeb.	- 0,38	4 29 34,79	4 25 51,39	3 43,40	
	Procione.	- 0,39	7 33 50,67	7 30 7,44	3 43,23	

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Corren. dell' istrome.	Passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variaz. diurna.
Mar. 6	Polluce.	- 0,40	7 38 18,07	7 34 34,78	3 43,29	"
	Altair.	- 0,38	19 45 56,31	19 42 19,46	3 43,85	+ 1,53
	Aldeb.	- 0,38	4 29 35,82	4 25 51,38	3 44,44	
	Procione.	- 0,39	7 33 52,07	7 30 7,43	3 44,04	
	Polluce.	- 0,40	7 38 19,60	7 34 34,77	3 44,83	
7	Spica.	- 0,40	13 19 43,31	13 15 58,39	3 44,92	
	Aldeb.	- 0,38	4 29 37,01	4 25 51,36	3 45,65	+ 1,21
	Aldeb.	- 0,38	4 29 40,79	4 25 51,31	3 49,41	+ 1,25
	Procione.	- 0,39	7 33 56,77	7 30 7,38	3 49,39	
	Polluce.	- 0,40	7 38 24,10	7 34 34,71	3 49,39	
12	Altair.	- 0,38	19 46 4,02	19 42 12,59	3 51,43	
	Procione.	- 0,39	7 33 58,78	7 30 7,36	3 51,42	+ 1,05
	Polluce.	- 0,40	7 38 26,26	7 34 34,69	3 51,07	
	Aldeb.	- 0,38	4 29 45,15	4 25 51,29	3 53,86	+ 1,20
	Siria.	- 0,40	6 41 18,93	6 37 25,14	3 53,79	
18	Spica.	- 0,45	13 19 52,71	13 15 58,95	3 53,96	
	Antares.	- 0,41	16 22 37,09	16 18 40,04	3 57,05	+ 1,03
	Antares.	- 0,41	16 22 38,02	16 18 40,01	3 58,01	+ 0,93
	Altair.	- 0,38	19 46 10,79	19 42 12,34	3 58,45	
	Aldeb.	- 0,52	4 30 5,08	4 25 50,97	4 14,11	
19	Altair.	- 0,51	19 46 28,05	19 42 13,18	4 14,87	
	Procione.	- 0,51	7 34 23,62	7 30 6,99	4 16,63	+ 1,09
	Regolo.	- 0,52	10 3 18,75	9 59 2,06	4 16,69	+ 0,95
	Polluce.	- 0,57	7 38 54,83	7 34 34,26	4 20,57	
	Regolo.	- 0,52	10 3 22,49	9 59 2,02	4 20,47	+ 1,23
10	Aldeb.	- 0,52	4 30 12,63	4 25 50,89	4 21,74	
	Polluce.	- 0,57	7 38 56,08	7 34 34,16	4 23,83	+ 0,98
	Spica.	- 0,49	13 20 22,20	13 15 59,00	4 23,11	
	Altair.	- 0,51	19 46 36,16	19 42 13,43	4 23,73	+ 0,69
	Aldeb.	- 0,52	4 30 14,58	4 25 50,88	4 23,70	
13	Regolo.	- 0,52	10 3 25,04	9 59 1,99	4 23,95	+ 0,82
	Spica.	- 0,49	13 20 22,81	13 15 59,03	4 23,78	
	Regolo.	- 0,52	10 3 26,75	9 59 1,98	4 24,77	+ 0,78
	Aldeb.	- 0,52	4 30 16,11	4 25 50,86	4 25,25	
	Siria.	- 0,48	6 41 49,91	6 37 24,53	4 25,38	

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	Passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Varianz. diurna.
Apr. 14	Antares.	- 0,47	16 23' 6,80	16 18' 41,24	4 25,56	"
17	Markab.	- 0,53	23 0 29,29	22 56 0,66	4 28,63	+ 0,78
18	Regolo.	- 0,52	10 3 30,58	9 59 1,92	4 28,66	+ 0,78
19	Aldeb.	- 0,52	4 30 20,34	4 25 50,83	4 29,51	+ 0,85
	Sirio.	- 0,47	6 41 53,69	6 37 24,45	4 29,24	
20	Altair.	- 0,50	19 46 43,10	19 42 13,66	4 29,44	
	Aldeb.	- 0,51	4 30 20,83	4 25 50,82	4 30,01	+ 0,61
	Sirio.	- 0,47	6 41 54,39	6 37 24,43	4 29,96	
21	Altair.	- 0,50	19 46 43,63	19 42 13,69	4 29,94	
	Aldeb.	- 0,51	4 30 21,16	4 25 50,78	4 30,38	+ 0,37
	Sirio.	- 0,47	6 41 54,76	6 37 24,42	4 30,34	
22	Altair.	- 0,50	19 46 44,03	19 42 13,72	4 30,31	+ 0,42
24	Sirio.	- 0,47	6 41 55,16	6 37 24,40	4 30,76	+ 0,49
25	Sirio.	- 0,42	6 41 56,09	6 37 24,37	4 31,72	+ 0,50
	Aldeb.	- 0,24	4 30 23,58	4 25 50,80	4 32,58	
26	Sirio.	- 0,22	6 41 57,08	6 37 24,35	4 32,73	
30	Procione.	- 0,12	7 34 39,01	7 30 6,67	4 32,34	
	Rigel.	- 0,15	5 10 39,69	5 6 5,69	4 34,00	+ 0,22
	Procione.	- 0,08	7 34 40,23	7 30 6,61	4 33,62	
	Polluce.	+ 0,04	7 39 7,55	7 34 33,84	4 33,71	
Mag. 1	Rigel.	- 0,12	5 10 39,64	5 6 5,64	4 34,00	0,00
	α Orione.	- 0,03	5 50 13,83	5 45 39,71	4 34,13	
4	Procione.	+ 0,06	7 34 41,30	7 30 6,56	4 34,74	+ 0,18
5	Regolo.	+ 0,12	10 3 36,58	9 59 1,71	4 34,87	+ 0,31
	Rigel.	- 0,04	5 10 41,23	5 6 5,66	4 35,57	
6	Spica.	- 0,06	13 20 34,57	13 15 50,12	4 35,45	
	Aldeb.	+ 0,16	4 30 26,59	4 25 50,78	4 35,81	+ 0,12
	Regolo.	+ 0,12	10 3 37,43	9 59 1,70	4 35,73	
9	Spica.	- 0,16	13 20 34,69	13 15 50,12	4 35,57	+ 0,43
	Aldeb.	+ 0,16	4 30 27,87	4 25 50,78	4 37,09	
	Procione.	+ 0,06	7 34 43,32	7 30 6,50	4 36,82	
	Spica.	+ 0,09	13 20 35,87	13 15 50,12	4 36,75	
10	Aldeb.	+ 0,16	4 30 28,29	4 25 50,79	4 37,50	+ 0,41
	Rigel.	- 0,04	5 10 42,63	5 6 5,64	4 36,99	
	Sirio.	- 0,10	6 42 1,14	6 37 24,17	4 36,97	+ 0,26

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	Passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variaz. diurna.
Mag. 11	Spica.	+ 0,09	13 20 36,39	13 15 59,12	4 37,27	"
	Procione.	+ 0,26	7 34 44,32	7 30 6,44	4 37,88	+ 0,18
	Spica.	+ 0,09	13 20 37,13	13 15 59,11	4 38,02	
	Antares.	- 0,90	16 23 19,96	16 18 41,72	4 38,24	
	Sirio.	- 0,42	6 42 2,52	6 37 24,12	4 38,40	+ 0,49
16	Procione.	- 0,42	7 34 44,81	7 30 6,44	4 38,37	
	Polluce.	- 0,44	7 39 12,15	7 34 33,65	4 38,50	
	Spica.	- 0,42	13 20 37,45	13 15 59,10	4 38,35	+ 0,49
	Sirio.	- 0,42	6 42 3,06	6 37 24,11	4 38,95	
	Procione.	- 0,42	7 34 45,30	7 30 6,43	4 38,87	
18	Polluce.	- 0,44	7 39 12,56	7 34 33,64	4 38,92	
	α Orione.	- 0,41	5 50 19,05	5 45 39,69	4 39,36	+ 0,39
	Sirio.	- 0,42	6 42 3,45	6 37 24,11	4 39,34	+ 0,29
	α Orione.	- 0,42	5 50 19,27	5 45 39,69	4 39,58	
	Sirio.	- 0,42	6 42 3,68	6 37 24,10	4 39,58	
22	Procione.	- 0,42	7 34 46,14	7 30 6,41	4 39,73	
	Polluce.	- 0,44	7 39 12,79	7 34 33,62	4 39,17	
	Spica.	- 0,42	13 20 38,47	13 15 59,10	4 39,37	+ 0,62
	Arturo.	- 0,43	14 12 21,56	14 7 41,28	4 40,28	
	Sirio.	- 0,42	6 42 5,53	6 37 24,08	4 41,45	+ 0,28
24	α Andr.	- 0,44	0 4 2,28	23 59 19,84	4 42,44	+ 0,28
	Rigel.	- 0,42	5 10 47,85	5 6 5,62	4 42,23	
	Sirio.	- 0,42	6 42 6,37	6 37 24,07	4 42,30	
	Spica.	- 0,42	13 20 41,00	13 15 59,08	4 42,01	+ 0,19
	Sirio.	- 0,42	6 42 8,65	6 37 24,04	4 44,61	
Giu. 6	Procione.	- 0,42	7 34 50,85	7 30 6,33	4 44,52	+ 0,36
	Procione.	- 0,42	7 34 51,20	7 30 6,32	4 44,88	
	Polluce.	- 0,44	7 39 18,66	7 34 33,52	4 45,14	
	Spica.	- 0,42	13 20 43,62	13 15 59,01	4 44,61	+ 0,20
	Sirio.	- 0,32	6 42 9,04	6 37 24,04	4 45,00	
9	Procione.	- 0,27	7 34 51,66	7 30 6,32	4 45,34	
	Regolo.	- 0,25	10 3 46,19	9 59 1,32	4 44,87	
	Spica.	- 0,31	13 20 43,80	13 15 59,01	4 44,79	
	Antares.	- 0,36	16 23 26,68	16 18 42,19	4 44,49	+ 0,05
	Spica.	- 0,31	13 20 43,78	13 15 59,00	4 44,78	

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	Passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variaz. diurna.
Ciu. 9	Antares.	- 0,36	16 23 26,75	16 18 42,20	4 44,55	" 0,00
10	Spica.	- 0,31	13 20 43,76	13 15 58,99	4 44,77	+ 0,06
11	Spica.	- 0,31	13 20 43,84	13 15 58,99	4 44,83	+ 0,08
12	Spica. Antares.	- 0,31 - 0,36	13 20 43,89 16 23 26,79	13 15 58,98 16 18 42,18	4 44,91 4 44,61	
13	Sirio. Spica.	- 0,32 - 0,31	6 42 9,31 13 20 44,09	6 37 24,02 13 15 58,97	4 45,29 4 45,13	+ 0,21 + 0,31
21	Aldeb.	- 0,24	4 30 39,13	4 25 51,52	4 47,81	+ 0,28
28	Aldeb.	- 0,28	4 30 41,22	4 25 51,48	4 49,74	0,00
29	Arturo.	- 0,36	14 12 30,34	14 7 40,76	4 49,58	0,00
30	Regolo.	- 0,40	10 3 50,70	9 59 1,09	4 49,61	
Lug. 2	Antares.	- 0,65	16 23 31,97	16 18 42,28	4 49,69	0,00
3	Regolo. Spica. Antares.	- 0,28 - 0,46 - 0,60	10 3 51,28 13 20 48,80 16 23 31,91	9 59 1,55 13 15 58,81 16 18 42,28	4 50,13 4 49,99 4 49,63	0,00
4	Spica. Autares.	- 0,46 - 0,60	13 20 48,67 16 23 31,77	13 15 58,80 16 18 42,28	4 49,87 4 49,49	- 0,14
5	Regolo. Spica. Antares.	- 0,28 - 0,46 - 0,50	10 3 51,21 13 20 48,38 16 23 31,79	9 59 1,15 13 15 58,79 16 18 42,28	4 50,06 4 49,59 4 49,51	- 0,21
6	Sirio. Regolo. Altair.	- 0,50 - 0,48 - 0,41	6 42 13,59 10 3 50,99 19 47 4,57	6 37 24,23 9 59 1,14 19 42 15,58	4 49,36 4 49,85 4 48,99	
7	Sirio. Antares.	- 0,50 - 0,50	6 42 13,44 16 23 31,30	6 37 24,25 16 18 42,27	4 49,19 4 49,03	0,00
8	Regolo. Spica. Antares. Sirio, Spica.	- 0,23 - 0,43 - 0,58 - 0,47 - 0,43	10 3 50,64 13 20 47,97 16 23 31,28 6 42 13,56 13 20 47,64	9 59 1,13 13 15 58,76 16 18 42,27 6 37 24,26 13 15 58,75	4 49,51 4 49,21 4 49,01 4 49,30 4 48,89	
9	Altair. Sirio. Spica, Antares. Sirio,	- 0,26 - 0,47 - 0,43 - 0,49 - 0,47	19 47 4,20 6 42 13,06 13 20 47,24 16 23 30,55 6 42 13,15	19 42 15,62 6 37 24,27 13 15 58,74 16 18 42,26 6 37 24,28	4 48,58 4 48,79 4 48,50 4 48,29 4 48,87	- 0,42 - 0,59

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	Passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variez. diurna.
Lug. 11	Spica.	- 0,43	13 20 46,67	13 15 58,73	4 47,94	"
	Antares.	- 0,49	16 23 29,93	16 18 42,26	4 47,67	
	Altair.	- 0,26	19 47 3,21	19 42 15,64	4 47,57	
	Sirio.	- 0,47	6 42 12,35	6 37 24,30	4 48,05	
	Spica.	- 0,40	13 20 46,24	13 15 58,72	4 47,52	- 0,52
12	Antares.	- 0,57	16 25 29,23	16 18 42,25	4 46,98	
	Altair.	- 0,22	19 47 2,78	19 42 15,65	4 47,13	
	Markab.	- 0,18	23 0 50,27	22 56 3,51	4 46,76	
	Sirio.	- 0,45	6 42 11,59	6 37 24,31	4 47,28	
	Spica.	- 0,40	13 20 45,40	13 15 58,71	4 46,69	- 0,53
13	Antares.	- 0,57	16 23 28,74	16 18 42,25	4 46,49	
	Altair.	- 0,22	19 47 2,08	19 42 15,66	4 46,42	
	Markab.	- 0,18	23 0 49,93	22 56 3,53	4 46,40	
	Sirio.	- 0,44	6 42 11,36	6 37 24,33	4 47,03	
	Altair.	- 0,22	19 47 1,58	19 42 15,68	4 45,90	- 0,66
14	Markab.	- 0,18	23 0 49,16	22 56 3,56	4 45,60	
	Capra.	+ 0,15	5 8 30,52	5 3 44,42	4 46,10	
	Rigel.	- 0,35	5 10 52,17	5 6 6,39	4 45,78	
	Markab.	- 0,18	23 0 48,46	22 56 3,59	4 44,87	
	Capra.	+ 0,15	5 8 29,93	5 3 44,49	4 45,44	
15	Rigel.	- 0,36	5 10 51,46	5 6 6,41	4 45,05	
	Markab.	- 0,14	23 0 47,78	22 56 3,61	4 44,17	- 0,69
	Aldeb.	- 0,11	4 30 36,54	4 25 51,95	4 44,59	
	Capra.	+ 0,22	5 8 29,10	5 3 44,48	4 44,62	
	Rigel.	- 0,35	5 10 50,92	5 6 6,43	4 44,49	- 0,62
16	Markab.	- 0,14	23 0 47,17	22 56 3,64	4 43,53	
	Aldeb.	- 0,11	4 30 35,99	4 25 51,98	4 44,01	
	Aldeb.	- 0,11	4 30 35,13	4 25 52,00	4 43,13	
	Capra.	+ 0,22	5 8 27,80	5 3 44,55	4 43,25	
	Rigel.	- 0,33	5 10 49,48	5 6 6,50	4 42,98	- 0,66
17	Aldeb.	- 0,07	4 30 33,71	4 25 52,06	4 41,65	
	Capra.	+ 0,30	5 8 26,45	5 3 44,62	4 41,83	
	Rigel.	- 0,30	5 10 48,38	5 6 6,53	4 41,85	- 0,66
	Aldeb.	- 0,07	4 30 33,01	4 25 52,09	4 40,92	
	Rigel.	- 0,30	5 10 47,78	5 6 6,55	4 41,23	- 0,69

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	Passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variaz. diurna.
Lug. 22 23	Capra.	+ 0,30	5 8 24,85	5 3 44,66	4 40,19	"
	Rigel.	- 0,30	5 10 47,13	5 6 6,58	4 40,54	- 0,59
	Arturo.	+ 0,02	14 12 20,97	14 7 40,84	4 40,13	"
	Aldeb.	- 0,02	4 30 32,05	4 25 52,15	4 39,90	"
	Capra.	+ 0,37	5 8 24,72	5 3 44,72	4 40,00	"
Ag. 1 2	Rigel.	- 0,27	5 10 46,55	5 6 6,60	4 39,95	- 0,64
	Aldeb.	- 0,02	4 30 27,20	4 25 52,39	4 34,81	- 0,41
	Spica.	- 0,51	13 20 32,80	13 15 58,49	4 34,31	"
	Arturo.	+ 0,02	14 12 15,12	14 7 40,72	4 34,40	- 0,19
	Spica.	- 0,31	13 20 32,61	13 15 58,49	4 34,12	"
3 4 5	Antares.	- 0,50	16 23 15,53	16 18 4,08	4 33,64	- 2,96
	Altair.	+ 0,02	19 46 46,32	19 42 15,77	4 30,55	- 2,96
	Spica.	- 0,72	13 20 26,56	13 15 58,36	4 28,20	"
	Altair.	- 0,67	19 46 43,40	19 42 15,78	4 27,62	- 3,11
	Spica.	- 0,72	13 20 23,58	13 15 58,49	4 25,09	"
6 7	Antares.	- 0,66	16 23 6,69	16 18 42,06	4 24,63	"
	Altair.	- 0,67	19 46 39,68	19 42 15,77	4 23,91	- 2,49
	Antares.	- 0,66	16 23 3,87	16 18 42,05	4 21,82	"
	Altair.	- 0,67	19 46 37,51	19 42 15,77	4 21,74	- 3,42
	Spica.	- 0,72	13 20 17,55	13 15 58,44	4 19,11	"
8 10	Antares.	- 0,76	16 23 0,55	16 18 42,03	4 18,52	"
	Altair.	- 0,67	19 46 34,00	19 42 15,80	4 18,20	- 3,30
	Spica.	- 0,72	13 20 14,23	13 15 58,42	4 15,81	"
	Altair.	- 0,67	19 46 30,70	19 42 15,80	4 14,90	- 3,02
	Sirio.	- 0,85	6 41 34,85	6 37 24,84	4 10,01	- 3,02
11 12	Altair.	- 0,64	19 46 21,68	19 42 15,79	4 5,89	"
	Markab.	- 0,61	23 0 9,65	22 56 4,17	4 5,48	"
	Sirio.	- 0,85	6 41 29,95	6 37 24,86	4 5,09	- 3,25
	Markab.	- 0,61	23 0 6,17	22 56 4,18	4 2,49	"
13 14 15 16 17	Sirio.	- 0,85	6 41 26,45	6 37 24,88	4 1,37	"
	Altair.	- 0,64	19 46 15,51	19 42 15,78	3 59,73	- 3,48
	Altair.	- 0,64	19 46 19,03	19 42 15,78	3 56,25	- 3,00
	Aldeb.	- 0,58	4 29 45,82	4 25 52,82	3 53,00	"
16 17	Altair.	- 0,64	19 46 6,03	19 42 15,78	3 50,25	- 3,20
	Aldeb.	- 0,30	4 29 39,16	4 25 52,91	3 46,25	- 3,38

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variaz. giurna.
Ag. 17	Capra.	+ 0,19	5 7 31,89	5 3 45,70	3 46,19	"
	Rigel.	- 0,50	5 9 53,55	5 6 7,26	3 46,29	
	Sirio.	- 0,57	6 41 11,48	6 37 25,00	3 46,48*	
	Altair.	- 0,36	19 46 1,84	19 42 15,77	3 46,07	0,00
	Aldeb.	- 0,40	4 29 39,25	4 25 52,94	3 46,31	
18	Capra.	+ 0,19	5 7 32,52	5 3 45,74	3 46,78	
	Rigel.	- 0,50	5 9 53,78	5 6 7,20	3 46,49	
	Procione.	- 0,40	7 33 53,87	7 30 7,08	3 46,79	
	Spica.	- 0,54	13 19 44,63	13 15 58,31	3 46,51	
	Arturo.	- 0,45	14 11 26,54	14 7 40,47	3 46,07	
19	Antares.	- 0,66	16 22 27,96	16 18 41,84	3 46,12	
	Altair.	- 0,36	19 46 1,89	19 42 15,76	3 46,13	
	Sirio.	- 0,85	6 41 11,52	6 37 25,05	3 46,47	
	Procione.	- 0,68	7 33 53,32	7 30 7,10	3 46,22	
	Arturo.	- 0,75	14 11 26,93	14 7 40,45	3 46,48	
20	Antares.	- 0,96	16 22 28,62	16 18 41,83	3 46,79	
	Altair.	- 0,64	19 46 1,95	19 42 15,76	3 46,17	
	Capra.	- 0,31	5 7 32,43	5 3 45,82	3 46,61	
	Arturo.	- 0,75	14 11 26,83	14 7 40,44	3 46,39	
	Aldeb.	- 0,58	4 29 39,69	4 25 53,03	3 46,66	
21	Sirio.	- 0,85	6 41 12,17	6 37 25,10	3 47,07	
	Arturo.	- 0,69	14 11 27,14	14 7 40,43	3 46,71	
	Altair.	- 0,59	19 46 2,73	19 42 15,74	3 46,99	
	α Ercole.	- 0,55	17 10 28,09	17 6 40,75	3 47,34	+ 0,50
	α Ercole.	- 0,55	17 10 28,67	17 6 40,75	3 47,92	+ 0,58
22	Altair.	- 0,59	19 46 3,76	19 42 15,73	3 48,03	
	Arturo.	- 0,59	14 11 28,99	14 7 40,38	3 48,61	
	α Ophiuco.	- 0,55	17 30 38,15	17 26 49,32	3 48,83	
	Aldeb.	- 0,50	4 29 42,48	4 25 53,15	3 49,33	
	Capra.	- 0,20	5 7 35,44	5 3 46,03	3 49,41	
23	Rigel.	- 0,74	5 9 56,76	5 6 7,49	3 49,27	
	Arturo.	- 0,69	14 11 29,62	14 7 40,37	3 49,25	
	Antares.	- 0,84	16 22 31,01	16 18 41,73	3 49,98	
	Aldeb.	- 0,52	4 29 43,12	4 25 53,19	3 49,93	
	Antares.	- 0,94	16 22 31,90	16 18 41,72	3 50,18	+ 0,77

* Accorciato il pendolo.

TAVOLA III

Giorai 1934.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	Passaggio correto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variaz. diurna.
Ago. 27	Aldeb.	- 0,42	4 29 43,80	4 25 53,21	3 50,58	"
	Capra.	- 0,20	5 7 36,82	5 3 46,11	3 50,71	
	Rigel.	- 0,74	5 9 58,23	5 6 7,55	3 50,88	
	α Orionis.	- 0,59	5 49 32,27	5 45 41,44	3 50,83	
	Antares.	- 0,94	16 22 32,04	16 18 41,70	3 50,94	+ 0,46
28	Aldeb.	- 0,52	4 29 44,48	4 25 53,25	3 51,23	
	Capra.	- 0,20	5 7 37,24	5 3 46,15	3 51,09	
	Rigel.	- 0,74	5 9 58,23	5 6 7,58	3 50,75	
	Arturo.	- 0,69	14 11 31,70	14 7 40,33	3 51,37	+ 0,09
	Antares.	- 0,94	16 22 32,71	16 18 41,68	3 51,03	
29	Arturo.	- 0,69	14 11 32,14	14 7 40,31	3 51,83	+ 0,47
	Antares.	- 0,94	16 22 33,29	16 18 41,67	3 51,52	
	Antares.	- 0,94	16 22 33,98	16 18 41,66	3 52,32	
	Altair.	- 0,59	19 46 7,95	19 42 15,67	3 52,28	
	Sirio.	- 0,54	6 41 17,84	6 37 25,35	3 52,49	
Sett. 1	Antares.	- 0,64	16 22 34,18	16 18 41,64	3 52,54	+ 0,22
	Antares.	- 0,64	16 22 35,44	16 18 41,58	3 53,86	+ 0,44
	Altair.	- 0,31	19 46 9,54	19 42 15,63	3 53,91	
	Antares.	- 0,64	16 22 36,71	16 18 41,55	3 55,16	+ 0,60
	Altair.	- 0,31	19 56 10,71	19 42 15,61	3 55,10	
7	Antares.	- 0,64	16 22 37,20	16 18 41,53	3 55,67	+ 0,51
	Aldeb.	- 0,24	4 29 49,81	4 25 53,59	3 56,22	+ 0,62
	Aldeb.	- 0,24	4 29 51,11	4 25 53,65	3 57,46	+ 0,83
	Altair.	- 0,31	19 46 13,71	19 42 15,55	3 58,10	
	Aldeb.	- 0,24	4 29 51,97	4 25 53,68	3 58,29	
8	Procione.	- 0,35	7 34 6,32	7 30 7,64	3 58,68	
	Polluce.	- 0,10	7 38 33,84	7 34 35,02	3 58,82	+ 0,62
	Arturo.	- 0,59	14 11 39,32	14 7 40,14	3 59,18	
	Altair.	- 0,31	19 46 14,96	19 42 15,52	3 59,34	
	Aldeb.	- 0,24	4 29 53,43	4 25 53,73	3 59,60	
13	Procione.	- 0,35	7 34 7,62	7 30 7,70	3 59,82	
	Polluce.	- 0,10	7 38 35,02	7 34 35,07	3 59,95	
	Arturo.	- 0,39	14 11 39,82	14 7 40,13	3 59,69	+ 0,61
	Altair.	- 0,31	19 46 15,66	19 42 15,51	4 0,05	
	Aldeb.	- 0,24	4 29 54,78	4 25 53,79	4 0,99	+ 0,76
14						
15						

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	Passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variaz. diurna.
Sett. 15	Capra.	+ " 0,20	5 7 47,81	5 3 46,90	4 0,91	"
	Rigel.	- 0,46	5 10 9,04	5 6 8,11	4 0,93	+ 0,76
	Arturo.	- 0,59	14 11 41,33	14 7 40,11	4 1,22	
	Altair.	- 0,31	19 46 16,34	19 42 15,49	4 0,85	
	Sirio.	- 0,54	6 41 27,58	6 37 25,79	4 1,79	
16	Procione.	- 0,35	7 34 9,70	7 30 7,77	4 1,93	
	Polluce.	- 0,10	7 38 37,11	7 34 35,16	4 1,95	+ 0,68
	Arturo.	- 0,39	14 11 41,98	14 7 40,10	4 1,89	
	Sirio.	- 0,54	6 41 28,27	6 37 25,81	4 2,46	
	Polluce.	- 0,10	7 38 37,85	7 34 35,19	4 2,66	
17	Altair.	- 0,31	19 46 18,22	19 42 15,45	4 2,77	+ 0,46
	Procione.	- 0,35	7 34 11,00	7 30 7,83	4 3,17	
18	Polluce.	- 0,10	7 38 38,36	7 34 35,21	4 3,12	
	Arturo.	- 0,39	14 11 42,85	14 7 40,08	4 2,77	
	Altair.	- 0,31	19 46 18,96	19 42 15,44	4 3,52	+ 0,75
	Arturo.	- 0,01	14 11 49,79	14 7 40,02	4 9,77	+ 0,83
19	Altair.	- 0,01	19 46 25,50	19 42 15,32	4 10,18	
	Altair.	- 0,01	19 46 27,71	19 42 15,29	4 12,42	+ 0,62
Ott. 3	Altair.	- 0,01	19 46 32,14	19 42 15,22	4 16,92	+ 1,32
	Markab.	+ 0,08	23 0 27,33	22 56 4,46	4 22,87	
9	Vega.	+ 0,57	18 35 24,97	18 31 0,79	4 24,18	
	Altair.	- 0,01	19 46 39,06	19 42 15,12	4 23,94	
	Aldeb.	+ 0,12	4 30 19,24	4 25 54,46	4 24,78	
10	Markab.	+ 0,08	23 0 29,83	22 56 4,42	4 25,41	+ 1,26
	Vega.	+ 0,57	18 35 28,91	18 31 0,72	4 28,19	+ 1,26
11	Aldeb.	+ 0,12	4 30 22,87	4 25 54,54	4 28,33	
	Capra.	+ 0,77	5 8 16,42	5 3 47,97	4 28,45	
	Rigel.	- 0,22	5 10 37,00	5 6 8,83	4 29,07	
	Sirio.	- 0,34	6 41 55,34	6 37 26,54	4 28,80	
	Sirio.	- 0,34	6 42 2,57	6 37 26,69	4 57,88	+ 1,82
Nov. 16	α Aquar.	- 0,67	22 2 5,31	21 56 48,20	4 17,02	
	α Aquar.	- 0,67	22 2 6,50	21 56 48,28	4 18,22	+ 1,20
	Spica.	- 0,42	13 21 29,75	13 15 58,85	4 30,90	+ 1,64
	α Aquar.	- 0,37	22 2 19,54	21 56 48,18	4 31,36	+ 1,64
	Altair.	- 0,34	19 47 47,24	19 42 14,44	4 32,80	+ 1,50

TAVOLA II.

Giorni 1824.	Stelle osservate.	Correz. dell' istrom.	Passaggio corretto.	Asc. retta delle stelle.	Correz. dell' orologio.	Variaz. diurna.
Nov. 26 27 28	α Aquar.	"	22 2 21,03	21 56 48,17	5 32,86	"
	Spica.	- 0,37	13 21 34,72	13 15 58,90	5 35,82	
	Arturo.	- 0,42	14 13 16,40	14 7 40,43	5 35,97	
	Altair.	- 0,30	19 47 50,46	19 42 14,43	5 36,03	+ 1,55
	α Aquar.	- 0,34	22 2 24,50	21 56 48,15	5 36,35	
Dic. 29 3	Markab.	- 0,32	23 1 39,90	22 56 3,92	5 35,98	
	Spica.	- 0,42	13 21 36,50	13 15 58,96	5 37,34	
	Arturo.	- 0,35	14 13 18,03	14 7 40,48	5 37,55	
	Arturo.	- 0,35	14 13 19,59	14 7 40,50	5 39,09	+ 1,54
	Capra.	- 0,20	5 9 35,25	5 3 49,42	5 45,83	+ 1,75
8 11 12	Rigel.	- 0,41	5 11 55,80	5 6 9,35	5 46,25	
	Altair.	- 0,34	19 48 8,58	19 42 14,37	5 54,21	+ 1,70
	Altair.	- 0,34	19 48 14,24	19 42 14,36	5 59,88	+ 1,89
	Regolo.	- 0,32	10 5 5,56	9 59 3,90	6 1,46	+ 1,88
	Arturo.	- 0,30	14 13 44,01	14 7 40,82	6 3,19	
13 14 16	Altair.	- 0,34	19 48 18,01	19 42 14,36	6 3,65	+ 1,75
	Arturo.	- 0,30	14 13 45,78	14 7 40,84	6 4,94	
	Spica.	- 0,42	13 22 6,45	13 15 59,43	6 7,02	+ 2,04
	Arturo.	- 0,30	14 13 47,84	14 7 40,86	6 6,98	
	Spica.	- 0,42	13 22 10,59	13 15 59,49	6 11,10	+ 2,04
24 26 27	Arturo.	- 0,30	14 13 52,01	14 7 40,92	6 11,09	
	Altair.	- 0,34	19 48 41,03	19 42 14,36	6 26,67	+ 1,96
	Aldeb.	- 0,31	4 52 27,69	4 25 55,64	6 32,05	
	Altair.	- 0,34	19 48 47,76	19 42 14,36	6 33,40	+ 2,24

TAVOLA III.

Giorni 1824.	Correz. dell' orologio.	Tempo sid. dell' osservazione	Corre- zione dell' istro- mento	Ascens. retta del lembo della Luna.	Semi- diametro sul parall.	Ascens. retta del centro della Luna.
Feb. 4	-3' 0,18	h 3' 46,25 - 0,03	" 55' 3,3	+15' 4,1	° 10' 7,4	
7	-3 5,24	2 33 27,55 + 0,01	38 21 53,4	+16 52,3	38 38 25,7	
8	-3 7,04	3 31 6,85 + 0,01	52 46 42,9	+17 10,7	53 3 55,6	
9	-3 8,48	4 33 7,81 + 0,01	68 16 57,5	+17 42,0	68 34 39,5	
11	-3 11,22	6 45 5,47 - 0,26	101 16 18,2	+17 59,5	101 34 17,7	
12	-3 12,75	7 50 44,39 - 0,28	117 41 1,6	+17 43,5	117 58 45,1	
Mar. 4	-3 41,35	1 24 52,09 + 0,11	21 13 3,0	+15 42,2	21 28 45,2	
6	-3 43,32	3 12 14,98 - 0,38	48 3 59,0	+16 47,4	48 20 26,4	
7	-3 44,47	4 11 28,90 - 0,40	62 52 7,5	+17 16,6	63 9 24,1	
8	-3 45,67	5 13 46,42 - 0,40	78 26 30,3	+17 36,1	78 44 6,4	
11	-3 49,36	8 23 34,05 - 0,40	125 53 24,7	+17 15,0	126 10 59,7	
13	-3 51,71	10 20 57,26 - 0,39	155 14 13,1	+16 37,3	155 30 50,4	
15	-3 54,03	12 14 41,76 - 0,40	183 40 20,4	-16 26,6	183 23 53,8	
18	-3 56,99	15 4 2,12 - 0,42	226 0 25,5	-16 48,1	225 43 37,4	
19	-3 58,03	16 1 53,60 - 0,43	240 28 17,5	-16 50,3	240 11 27,2	
Apr. 3	-4 14,12	3 53 35,44 - 0,55	58 23 43,4	+17 6,4	58 40 49,8	
5	-4 16,53	5 57 47,91 - 0,56	89 26 50,2	+17 31,3	89 44 21,5	
9	-4 20,56	9 56 35,00 - 0,52	149 8 37,2	+16 28,6	149 25 5,8	
11	-4 23,09	11 45 54,71 - 0,50	176 28 33,6	+16 17,3	176 44 50,9	
12	-4 23,84	12 40 38,15 - 0,48	190 9 25,0	+16 23,6	190 25 48,6	
13	-4 24,85	13 38 45,04 - 0,48	204 41 8,4	-16 54,8	204 24 33,6	
14	-4 25,57	14 36 2,30 - 0,48	219 0 27,3	-16 47,4	218 43 39,9	
17	-4 28,47	17 31 26,57 - 0,48	262 51 31,3	-16 42,8	262 34 48,5	
19	-4 30,06	19 21 1,55 - 0,48	290 15 13,0	-16 0,1	289 59 12,9	
20	-4 30,18	20 11 39,85 - 0,48	302 54 50,5	-15 35,9	302 39 14,6	
21	-4 30,42	20 59 48,91 - 0,48	314 57 6,4	-15 15,2	314 41 51,2	
Mag. 1	-4 33,95	4 34 29,28 + 0,06	68 37 20,1	+17 27,7	68 54 47,8	
4	-4 34,89	7 43 17,21 + 0,17	115 49 20,7	+17 9,0	116 6 29,7	
5	-4 35,34	8 42 14,20 + 0,14	130 33 35,0	+16 45,1	130 50 20,1	
6	-4 35,64	9 38 26,66 + 0,10	144 36 41,4	+16 24,5	144 53 5,9	
9	-4 36,84	12 18 44,00 - 0,03	184 40 59,6	+16 8,3	184 57 7,9	
11	-4 37,29	14 8 29,24 - 0,12	212 7 16,8	+16 35,0	212 23 51,8	
15	-4 38,14	18 3 18,72 - 0,20	270 49 37,8	-16 35,0	270 53 2,8	
16	-4 38,63	18 58 28,91 - 0,43	284 57 7,2	-16 12,3	284 20 54,9	
18	-4 39,63	20 40 4,76 - 0,42	310 1 5,1	-15 23,7	309 45 41,4	
19	-4 39,77	21 27 5,26 - 0,42	321 46 12,6	-15 4,9	321 51 7,7	
24	-4 40,14	1 18 54,91 - 0,42	19 43 37,4	-15 48,0	19 27 49,4	

TAVOLA III.

Giorni 1824.	Correz. dell' orologio.	Tempo sid. dell' osservazione	Corre- zione dell' istro- mento	Ascens. retta del lembo della Luna.	Semi- diametro sul parall.	Ascens. retta del centro della Luna.
Giu. 7	-4 44,74	13 48 46,34	- 0,42	207 11 28,8	+16 21,3	207 27 50,1
8	-4 44,92	14 44 32,58	- 0,34	221 8 3,6	+16 36,4	221 24 40,0
9	-4 44,67	15 41 55,70	- 0,35	235 28 50,2	+16 46,5	235 45 36,7
11	-4 44,84	17 40 18,22	- 0,37	265 4 27,8	+16 59,1	264 47 48,7
12	-4 44,93	18 36 25,57	- 0,35	279 6 18,3	+16 20,7	278 49 57,6
21	-4 47,78	1 47 2,72	- 0,24	26 45 37,2	-15 59,3	26 29 57,9
22	-4 47,99	2 41 37,14	- 0,39	40 24 11,3	-16 58,7	40 7 32,6
29	-4 49,66	8 59 4,61	- 0,63	134 46 4,2	+17 2,0	135 3 6,2
30	-4 49,61	9 56 49,42	- 0,43	149 12 14,9	+16 54,3	149 28 49,2
Lug. 1	-4 49,65	10 51 56,02	- 0,48	162 58 53,1	+16 16,8	163 15 9,9
3	-4 49,90	12 38 35,89	- 0,47	189 38 51,3	+16 10,3	189 55 1,6
5	-4 49,65	14 27 10,14	- 0,56	216 47 23,7	+16 29,1	217 3 52,8
6	-4 49,40	15 23 28,04	- 0,56	230 51 52,2	+16 58,9	231 8 31,1
7	-4 49,10	16 20 46,14	- 0,61	245 11 22,9	+16 43,0	245 28 5,9
8	-4 49,26	17 18 8,67	- 0,56	259 32 1,6	+16 58,4	259 48 40,0
9	-4 48,79	18 14 26,47	- 0,55	273 36 28,8	+16 24,1	273 52 52,9
10	-4 48,28	19 8 39,49	- 0,55	287 9 44,1	+16 2,1	287 25 46,2
10	-4 48,28	19 10 52,77	- 0,55	287 43 3,3	-16 2,1	287 27 1,2
11	-4 47,81	20 2 24,19	- 0,52	300 35 55,0	-15 58,5	300 20 16,5
12	-4 47,23	20 51 15,97	- 0,44	312 48 52,9	-15 15,2	312 33 37,7
13	-4 46,57	21 37 52,54	- 0,40	324 28 2,1	-14 57,7	324 13 4,4
14	-4 45,99	22 22 54,62	- 0,34	335 43 34,2	-14 47,2	335 28 47,0
15	-4 45,11	23 7 13,13	- 0,30	346 48 12,4	-14 45,6	346 33 26,8
16	-4 44,50	23 51 46,61	- 0,23	357 56 35,7	-14 53,4	357 41 42,3
17	-4 43,84	0 32 35,50	- 0,07	9 23 48,5	-15 11,2	9 8 37,5
18	-4 43,22	1 25 43,63	- 0,14	21 25 52,8	-15 57,6	21 10 15,2
20	-4 41,82	3 12 53,84	0,00	48 13 27,6	-16 48,8	47 56 38,8
21	-4 41,02	4 12 57,99	+ 0,01	63 14 30,0	-17 22,1	62 57 7,9
22	-4 40,55	5 16 46,53	+ 0,01	79 11 38,1	-17 46,6	78 53 51,5
Agos. 1	-4 34,45	14 9 32,97	+ 0,06	212 23 15,4	+16 35,8	212 39 49,2
2	-4 33,58	15 6 0,76	- 0,46	226 30 4,5	+16 41,2	226 46 45,7
3	-4 30,96	16 3 12,95	- 0,43	240 48 7,8	+16 44,2	241 4 52,0
5	-4 24,81	17 56 50,70	- 0,78	269 12 29,7	+16 26,6	269 28 56,3
6	-4 21,63	18 51 22,87	- 0,76	282 50 31,7	+16 7,2	283 6 38,9
7	-4 18,18	19 43 31,05	- 0,75	295 52 34,2	+15 44,1	296 8 18,5
8	-4 14,80	20 33 6,61	- 0,72	308 16 28,4	+15 21,1	308 31 49,5
10	-4 11,00	22 7 59,94	- 0,79	331 59 47,3	-14 49,0	331 44 58,3

TAVOLA III.

Giorni 1824.	Cotrez. dell' orologio.	Tempo sid. dell' osservazione	Corre- zione dell' istro- mento	Ascens. retta del lembo della Luna.	Semi- diametro sul parall.	Ascens. retta del centro della Luna.
Ag. 11	-4 5,67	22 52 32,70	-0,73	343 1 59,5	-14 43,7	342 47 15,8
12	-4 2,44	23 36 55,03	-0,68	354 13 35,3	-14 47,0	353 58 48,3
15	-3 53,32	1 58 10,50	-0,58	29 33 28,8	-15 48,7	29 16 40,1
17	-3 46,37	3 47 35,50	-0,22	56 53 49,2	-16 54,9	56 36 54,3
18	-3 46,51	4 47 57,30	-0,21	71 59 17,7	-17 21,9	71 41 55,8
19	-3 46,22	5 51 7,03	-0,43	87 46 39,0	-17 37,4	87 29 1,6
20	-3 46,59	6 55 26,12	-0,42	103 51 25,5	-17 38,8	103 33 46,7
21	-3 46,78	7 59 10,88	-0,49	119 47 35,9	-17 4,5	119 30 31,4
29	-3 51,13	14 44 58,58	-0,87	221 14 25,7	+16 51,2	221 31 16,9
30	-3 51,60	15 43 20,92	-0,91	235 50 0,2	+16 53,5	236 6 53,7
31	-3 52,28	16 41 36,62	-0,64	250 23 59,7	+16 47,9	250 40 47,6
Sett. 1	-3 52,57	17 38 51,20	-0,64	264 42 38,4	+16 35,9	264 59 14,3
4	-3 53,93	20 17 17,12	-0,53	304 19 8,9	+15 28,2	304 34 32,1
8	-3 56,09	23 20 42,25	-0,59	350 10 27,9	+14 45,4	350 25 13,3
8	-3 56,09	23 22 44,13	-0,59	350 40 56,1	-14 45,4	350 26 10,7
9	-3 56,70	0 7 46,65	-0,35	1 56 34,5	-14 54,2	1 41 40,3
10	-3 57,47	0 54 8,04	-0,28	13 31 56,4	-15 10,8	13 16 45,6
11	-3 58,43	1 42 37,91	-0,28	25 39 24,5	-15 35,0	25 23 49,5
12	-3 59,04	2 33 57,48	-0,23	38 29 18,8	-16 3,4	38 13 15,4
13	-3 59,62	3 28 33,25	-0,15	52 8 16,5	-16 33,2	51 51 43,3
15	-4 0,84	5 26 48,47	-0,14	81 42 5,0	-17 16,1	81 24 48,9
16	-4 1,07	6 28 39,23	-0,15	97 9 46,5	-17 22,6	96 52 23,9
17	-4 2,29	7 30 32,78	-0,23	112 38 8,3	-17 17,1	112 20 51,2
18	-4 3,02	8 31 23,19	-0,24	127 50 44,3	-17 5,0	127 33 39,3
27	-4 9,96	16 17 51,52	-0,49	244 27 45,5	+17 3,1	244 44 48,6
29	-4 11,36	18 14 11,54	-0,49	273 32 45,8	+16 30,4	273 49 16,2
Ott. 3	-4 17,02	21 35 20,99	-0,37	323 50 9,3	+14 57,7	324 5 7,0
9	-4 24,60	2 17 48,51	+0,12	34 27 6,5	-15 56,1	34 11 10,4
12	-4 28,53	5 8 8,85	+0,26	77 2 16,6	-17 4,5	76 45 12,1
Nov. 25	-5 31,25	20 8 19,42	-0,46	302 4 44,4	+15 42,6	302 20 27,0
26	-5 32,08	20 57 32,26	-0,45	314 22 57,2	+15 17,1	314 38 14,3
28	-5 35,75	22 29 21,32	-0,40	337 20 13,8	+14 48,6	337 35 2,4
Dic. 3	-5 45,86	2 26 18,49	-0,32	36 34 32,6	+16 10,6	36 50 43,2
11	-6 1,24	10 22 5,67	-0,36	155 31 19,6	-16 13,2	155 15 6,4
12	-6 2,34	11 15 44,18	-0,39	168 55 56,9	-16 7,2	168 39 49,7
14	-6 6,95	13 3 30,56	-0,41	195 52 32,3	-16 20,1	195 36 12,2
26	-6 31,58	22 55 16,40	-0,39	343 49 0,2	+14 45,4	344 3 45,6

TAVOLA IV.

Giorni 1824.	Tempo vero dell'osserv.	Longitud. della Luna.	Latitudine della Luna.	Parall. equa- toriale.	Asc. retta calcolata della Luna	Corr. delle tavole.
Feb. 4	2 54' 34,9	3° 28' 26"	+ 5° 3' 23"	54' 59"	1° 10' 5"	+ "
7	5 11 55,7	42 38 17	+ 4 45 55	56 58	38 38 35	- 9
8	6 5 26,5	56 25 43	+ 4 6 52	57 51	53 4 8	- 14
9	7 3 19,2	70 40 47	+ 3 11 35	58 47	68 34 55	- 16
11	9 7 1,7	100 35 14	+ 0 42 1	60 28	101 34 29	- 11
12	10 8 54,4	116 7 31	- 0 42 47	61 2	117 59 8	- 13
Mar. 4	2 23 50,8	25 13 22	+ 5 1 50	55 49	21 28 22	+ 23
6	4 3 32,6	51 55 22	+ 4 9 24	57 1	48 20 22	+ 4
7	4 58 56,2	65 42 44	+ 3 20 10	57 41	63 9 40	- 16
8	5 57 23,3	79 50 1	+ 2 17 39	58 24	78 44 42	- 36
11	8 55 41,6	124 13 55	- 1 52 59	60 18	126 10 48	- 8
13	10 45 28,5	155 4 33	- 3 48 20	60 59	155 30 42	+ 8
15	12 31 38,5	185 51 33	- 4 57 53	59 54	183 23 51	+ 3
18	15 9 38,5	229 25 0	- 4 11 43	57 20	225 44 6	- 29
19	16 3 45,5	242 58 25	- 3 25 4	56 25	240 11 53	- 26
Apr. 3	3 2 51,3	61 32 40	+ 3 22 49	57 28	58 40 39	+ 11
5	4 59 28,8	89 45 53	+ 1 12 48	58 27	89 44 28	- 6
9	8 43 4,7	148 30 35	- 3 33 25	59 47	149 25 10	- 4
11	10 24 48,8	178 33 46	- 4 51 4	59 38	176 44 53	- 2
12	11 15 43,8	193 29 6	- 5 0 47	59 15	190 25 44	+ 5
13	12 10 1,6	208 12 28	- 4 50 21	58 41	204 24 26	+ 8
14	13 3 29,6	222 35 12	- 4 21 30	57 59	218 43 35	+ 5
17	15 47 25,0	263 16 35	- 1 39 34	55 37	262 35 2	- 14
19	17 29 16,0	288 31 43	+ 0 52 51	54 36	289 59 23	- 10
20	18 16 3,5	300 48 16	+ 1 36 34	54 18	302 39 15	+ 0
21	19 0 21,7	312 59 3	+ 2 35 25	54 12	314 41 46	+ 5
Mag. 1	1 59 56,1	70 55 30	+ 2 33 50	58 15	68 54 48	+ 0
4	4 56 46,1	114 25 7	- 1 11 7	59 7	116 6 34	- 4
5	5 51 43,5	129 5 47	- 2 24 26	59 12	130 50 30	- 10
6	6 43 55,7	143 43 48	- 3 28 21	59 13	144 53 25	- 19
9	9 12 10,9	187 36 25	- 5 6 2	58 42	184 57 10	- 2
11	10 53 51,3	216 19 19	- 4 36 31	57 53	212 23 49	+ 3
15	1 32 21,2	270 30 23	- 0 52 18	55 28	270 33 20	- 17
16	15 23 25,4	283 14 12	+ 0 16 26	54 56	284 21 10	- 15
18	16 56 49,2	307 59 27	+ 2 25 5	54 19	309 45 47	- 6
19	17 39 45,4	320 11 0	+ 3 19 59	54 13	321 31 5	+ 3
24	21 10 52,8	23 7 6	+ 5 5 1	56 21	19 27 40	+ 9

TAVOLA IV.

Giorni 1824.	Tempo vero dell'osserv.	Longitud. della Luna.	Latitudine della Luna.	Parall. equa- toriale.	Aso. retta calcolata della Luna.	Corr. delle tavole.
Giu.	7 8 45 37,1	211° 22' 54"	- 4° 53' 1"	57° 33'	207° 27' 58"	- 8"
	8 9 37 6,8	225° 12' 43"	- 4° 15' 56"	57° 3	221° 24' 51"	- 11"
	9 10 30 12,6	238° 48' 40"	- 3° 25' 48"	56° 53	235° 45' 36"	+ 1"
	11 12 19 59,5	265° 16' 27"	- 1° 17' 37"	55° 32	264° 47' 58"	- 9"
	12 13 11 49,3	278° 6' 30"	- 0° 7' 47"	55° 4	278° 50' 12"	- 14"
	13 19 43 54,2	30° 24' 43"	+ 4° 56' 16"	56° 27	26° 29' 56"	+ 2"
	22 20 34 10,3	43° 58' 28"	+ 4° 21' 40"	57° 20	40° 7' 35"	- 2"
Lug.	29 2 25 41,5	133° 27' 36"	- 2° 57' 36"	60° 39	135° 3' 33"	- 27"
	30 3 19 8,5	148° 44' 55"	- 4° 0' 41"	60° 12	149° 29' 16"	- 27"
	1 4 9 57,9	163° 48' 57"	- 4° 46' 10"	59° 42	163° 15' 27"	- 17"
	3 5 48 5,4	193° 2' 58"	+ 5° 16' 50"	58° 25	189° 55' 2"	0"
	5 7 28 8,0	220° 59' 2"	- 4° 30' 57"	57° 3	217° 3' 50"	+ 3"
	6 8 20 10,3	234° 30' 6"	- 3° 44' 51"	56° 26	231° 8' 34"	- 3"
	7 9 13 13,1	247° 45' 7"	- 2° 47' 30"	55° 54	245° 28' 9"	- 3"
Ag.	8 10 8 20,8	260° 45' 36"	- 1° 42' 24"	55° 25	259° 48' 46"	+ 6"
	9 10 58 24,3	273° 32' 56"	- 0° 33' 14"	54° 59	273° 53' 3"	- 10"
	10 11 48 23,6	286° 8' 28"	+ 0° 38' 27"	54° 37	287° 25' 55"	- 9"
	11 11 50 36,7	286° 9' 35"	+ 0° 38' 33"	54° 37	287° 27' 6"	- 5"
	12 12 37 55,6	298° 35' 5"	+ 1° 43' 32"	54° 20	300° 20' 1"	+ 15"
	13 13 22 35,7	310° 52' 47"	+ 2° 44' 59"	54° 6	312° 33' 42"	- 4"
	14 14 5 1,5	323° 5' 12"	+ 3° 38' 21"	54° 0	324° 13' 5"	- 1"
Ag.	14 14 45 53,6	335° 15' 36"	+ 4° 21' 37"	54° 1	335° 28' 47"	0"
	15 15 26 2,6	347° 27' 16"	+ 4° 53' 8"	54° 9	346° 33' 51"	- 4"
	16 16 6 26,9	359° 44' 39"	+ 5° 11' 29"	54° 28	357° 41' 38"	+ 4"
	17 16 48 7,4	12° 12' 26"	+ 5° 15' 33"	54° 56	9° 8' 37"	+ 0"
	18 17 32 7,4	24° 55' 36"	+ 5° 4' 27"	55° 33	31° 10' 24"	- 9"
	20 19 11 0,4	51° 28' 52"	+ 3° 54' 44"	57° 14	47° 56' 45"	- 6"
	21 20 6 55,9	65° 26' 46"	+ 2° 56' 47"	58° 12	62° 57' 7"	+ 1"
Ag.	22 21 6 35,6	79° 55' 52"	+ 1° 45' 38"	59° 12	78° 53' 53"	- 1"
	1 5 22 38,6	216° 36' 16"	- 4° 38' 30"	57° 46	212° 39' 50"	- 1"
	2 6 15 5,5	230° 21' 15"	- 3° 58' 19"	56° 55	226° 46' 42"	+ 4"
	3 7 8 17,2	243° 43' 15"	- 3° 2' 15"	56° 11	241° 4' 43"	+ 9"
	5 8 53 56,2	269° 31' 50"	- 0° 52' 55"	55° 1	269° 29' 5"	- 9"
	6 9 44 30,2	282° 5' 23"	+ 0° 15' 32"	54° 36	283° 7' 4"	- 25"
	7 10 32 41,2	294° 28' 55"	+ 1° 22' 11"	54° 18	296° 8' 29"	- 11"
Ag.	8 11 18 20,7	306° 45' 44"	+ 2° 24' 15"	54° 5	308° 51' 48"	+ 1"
	10 12 45 24,5	331° 10' 24"	+ 4° 4' 50"	53° 56	331° 45' 7"	- 9"

TAVOLA IV.

Giorni 1824.	Tempo vero dell'osserv.	Longitud. della Luna.	Latitudine della Luna.	Parall. equa- toriale.	Asc. retta calcolata dellaLuna.	Corr. delle tavole.
Ag. 11	13 26 3,8	343° 22' 0"	+ 4° 39' 12"	54° 1'	342° 53' 17"	- 1"
12	14 6 33,3	355 36 39	+ 5 0 54	54 11	353 58 49	- 1
15	16 16 12,4	33 10 24	+ 4 40 47	55 30	29 16 50	- 10
17	17 57 53,6	59 34 36	+ 5 14 7	57 3	56 57 5	- 11
18	18 54 23,4	73 24 5	+ 2 10 57	57 58	71 42 10	- 14
19	19 53 40,9	87 42 36	+ 5 57 36	58 58	87 29 8	- 6
20	20 54 8,8	102 30 52	- 0 21 57	59 50	103 33 54	- 7
21	21 54 2,1	117 46 29	- 1 42 18	60 39	119 50 20	+ 11
29	4 13 10,8	225 15 25	- 4 2 44	58 0	221 31 39	- 22
30	5 7 46,2	239 5 37	- 3 11 8	57 2	236 7 7	- 13
31	6 2 15,6	252 27 47	- 2 10 31	56 8	250 40 55	- 7
Sett. 1	6 55 44,3	265 26 19	- 1 4 56	55 27	264 59 18	- 4
4	9 22 56,3	302 48 30	+ 2 9 55	54 9	304 34 44	- 7
8	12 11 34,6	351 38 55	+ 4 56 53	54 8	350 25 9	+ 4
8	12 13 32,3	351 39 56	+ 4 50 54	54 8	350 26 4	+ 6
9	12 54 52,6	4 1 34	+ 5 0 59	54 22	1 41 29	+ 11
10	13 37 31,9	16 30 37	+ 4 56 49	54 41	13 16 36	+ 9
11	14 22 19,5	29 9 9	+ 4 38 9	55 6	25 23 38	+ 11
12	15 9 56,4	41 59 32	+ 4 5 13	55 36	38 13 8	+ 7
13	16 0 49,0	55 4 38	+ 3 18 48	56 13	51 51 40	+ 3
15	17 51 36,8	82 11 22	+ 1 12 44	57 43	81 25 1	- 12
16	18 49 43,4	96 18 48	- 0 1 25	58 36	96 52 38	- 14
17	19 47 52,8	110 51 44	- 1 17 35	59 24	112 21 0	- 9
18	20 44 59,2	125 49 42	- 2 30 31	60 8	127 33 39	0
27	4 1 34,2	247 0 57	- 2 21 19	57 15	244 45 18	- 29
Ott. 29	5 50 24,2	273 50 3	- 0 6 57	55 33	273 49 8	+ 8
3	8 56 36,7	322 50 21	+ 3 45 18	54 1	324 5 10	- 3
9	13 16 26,6	37 57 44	+ 4 7 59	55 35	34 11 5	+ 5
12	15 55 18,4	77 56 22	+ 1 19 17	57 8	76 45 27	- 15
Nov. 25	4 2 58,0	300 43 28	+ 2 38 30	55 0	302 20 24	- 3
26	4 47 47,1	313 12 14	+ 3 33 34	54 34	314 37 59	- 15
Dic. 28	6 10 47,4	337 42 11	+ 4 50 7	54 12	337 34 46	+ 16
3	9 45 29,7	40 35 50	+ 4 0 53	56 11	36 50 47	- 4
11	17 4 53,1	155 10 42	- 4 46 59	59 17	155 15 4	+ 2
12	17 53 57,6	169 52 39	- 5 11 41	59 9	168 39 37	+ 12
14	19 32 34,9	199 0 56	- 5 0 19	58 39	195 36 9	+ 3
26	4 33 48,3	344 49 27	+ 5 5 44	54 8	344 3 38	+ 7

OSSERVAZIONI
DELLA COMETA PERIODICA DELL'ENKE
FATTE AL SETTORE EQUATORIALE DI CINQUE PIEDI
DA
FRANCESCO CARLINI.

Diamo riunite in questa pagina le poche osservazioni della Cometa periodica che ci fu concesso d'istituire durante l'ultima sua apparizione dello scorso anno. Le posizioni apparenti delle stelle di confronto, desunte dal catalogo di Piazzi, risultano come segue:

		Asc. retta.	Declinaz.
β Pegaso.	4 novembre.	343° 52' 33,4	+ 27° 9' 42,6
56 Pegaso.	4 novembre.	344 42 3,1	+ 24 33 6,0
λ Pegaso.	4 novembre.	339 34 48,7	+ 22 40 28,2
γ Equul.	3 dicembre.	315 30 10,0	+ 9 27 8,8
2 Equul.	6 dicembre.	313 26 31,8	+ 6 30 58,2

Nel calcolo della prima delle suddette stelle si è fatto uso della precessione annua e del valor medio del moto proprio dato nel catalogo inserito nelle nostre Effemeridi pel 1822. Le ascensioni rette e le declinazioni della Cometa sono corrette dalla differenza di rifrazione, ma non dall'aberrazione e dalla parallasse.

giorni 1828.	Stelle di confronto	Tempo medio a Milano.	Differ. fra la Cometa e le stelle		Asc. retta della Cometa.	Declinaz. della Cometa.
			in asc. retta	in declin.		
nov. 1	β Pegaso.	10 31 59 +0	b 1 15,5 -2	° 9 40	345° 41' 25,9	+ 24 59 59,7
.	.	10 46 54 +0	7 13,0 -2	9 40	345 40 48,4	+ 24 59 59,7
.	56 Pegaso.	10 24 15 -0	5 47,5 -0	20 30	343 15 10,6	+ 24 12 35,6
.	5 λ Pegaso.	9 57 22 +0	5 17,0 +0	42 15	340 54 3,7	+ 23 22 44,0
.	.	10 16 55 +0	5 6,0 +0	42 10	340 51 18,7	+ 23 22 39,0
dic. 2	γ Equul.	6 39 5 -0	10 42,7 -0	46 9	312 49 29,1	+ 8 40 58,2
3	.	6 16 36 -0	14 29,5 -1	22 11	311 52 46,8	+ 8 4 55,1
4	.	6 43 41 -0	18 24,8 -2	0 5	310 53 56,6	+ 7 26 59,6
5	2 Equul.	6 20 57 -0	14 0,7 +0	17 57	309 56 21,5	+ 6 48 55,8
6	.	8 22 23 -0	18 17,5 -0	24 20	308 52 7,3	+ 6 6 35,6

*Osservazioni meteorologiche fatte alla Specola di Milano l'anno 1827
da ANGELO CESARIS.*

1827 GENNAJO.

Giorni.	MATTINA.			SERÀ.				
	Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.
I 27	10,1	+ 2,2	E	Sereno.	27	10,3	+ 5,6	Ser. nuv.
2 27	8,4	+ 3,5	N O	Nuv. pioggia.	27	6,0	+ 4,0	Pioggia.
3 27	5,4	+ 1,1	N	Sereno.	27	4,4	+ 4,0	Nuv. ser.
4 27	0,8	+ 1,6	O	Piogg. neve.	26	11,2	+ 2,0	Nuv. piogg.
5 27	1,1	+ 2,5	E	Piogg. nuv.	27	4,6	+ 4,6	Nuv. ser.
6 27	6,2	- 0,2	S S O	Sereno.	27	5,9	+ 0,5	Nuvolo.
7 27	6,8	+ 0,2	O	Nebbioso.	27	7,7	+ 2,7	Sereno.
8 27	9,0	+ 0,9	O	Sereno, nuv.	27	8,7	+ 2,1	Ser. nuv.
9 27	8,1	+ 0,5	N	Sereno.	27	6,5	+ 3,9	Nuv. ser.
10 27	7,4	+ 2,7	O	Sereno.	27	8,5	+ 6,0	Sereno.
11 27	5,8	+ 1,1	N	Sereno.	27	5,0	+ 4,3	Sereno.
12 27	4,3	+ 0,0	N	Sereno.	27	3,8	+ 4,3	Sereno.
13 27	6,4	+ 0,5	E	Sereno.	27	8,4	+ 3,9	Sereno.
14 27	9,7	+ 0,0	N	Sereno.	27	8,5	+ 3,5	Sereno.
15 27	5,0	+ 0,0	N N O	Sereno.	27	9,6	+ 4,5	Sereno.
16 27	10,4	+ 0,9	O	Sereno.	27	8,4	+ 4,1	Sereno.
17 27	5,0	+ 2,5	O	Sereno.	27	6,6	+ 6,3	Sereno.
18 27	8,5	+ 0,0	N	Sereno.	27	8,2	+ 2,5	Sereno.
19 27	8,0	- 1,4	N	Sereno, nuv.	27	8,0	+ 1,2	Ser. nuv.
20 27	8,0	- 3,0	O	Sereno, nuv.	27	7,9	+ 0,4	Sereno.
21 27	7,9	- 3,3	N	Sereno.	27	7,2	+ 0,2	Ser. nuv.
22 27	5,4	- 3,0	S O	Neve.	27	2,0	- 2,2	Neve.
23 27	2,5	- 6,0	N	Nebb. ser.	27	2,5	- 3,5	Nuv. poc. nev.
24 27	5,8	- 4,7	N	Sereno.	27	8,0	- 1,5	Sereno.
25 27	9,8	- 6,3	O	Ser. nuv.	27	9,8	- 1,8	Nuvolo.
26 27	8,8	- 3,5	O	Nuv. neve.	27	8,4	+ 0,0	Nuvolo.
27 27	8,0	- 1,0	N O	Nuv. neve.	27	8,0	+ 0,0	Neve.
28 27	9,5	+ 0,4	O	Nuvolo.	27	10,9	+ 2,8	Ser. nebbia.
29 27	11,2	- 1,5	E	Ser. nebb.	27	10,9	+ 2,2	Ser. nuv.
30 27	9,5	+ 1,5	N	Nuv. nebb.	27	8,0	+ 4,4	Nuv. pioggia.
31 27	5,8	+ 2,2	O	Pioggia.	27	6,5	+ 3,6	Nuv. nebb.

Altezza mass. del bar. poll. 27 lin. 11,2 Altezza mass. del term. - 6,3
minima " 26 " 11,2 minima + 6,3
media " 27 " 7,03 media + 0,88
Quantità della pioggia e neve sciolta linee 49,60.

N.B. Il termometro esposto all'azione diretta del vento segna un grado maggiore di freddo.

1827 FEBBRAJO.

MATTINA.						SERÀ.					
Giorni.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro.	Direzione del vento.	Stato del cielo.		Altezza del barometro.	Altezza del termometro.	Direzione del vento.	Stato del cielo.		
1 27	6,8	+ 1,0	s o	Nebbia.		27	6,6	+ 2,5	o	Nuvolo.	
2 27	6,6	+ 1,5	z	Pioggia.		27	5,7	+ 3,3	z	Nuv. pioggia.	
3 27	3,7	+ 2,5	z	Piogg. nuv.		27	6,2	+ 4,5	s	Nuv. ser. nuv.	
4 27	10,5	+ 3,0	z	Nuv. nebb.		28	0,4	+ 5,2	x	Ser. nuv.	
5 28	1,4	+ 2,2	x	Sereno.		28	0,5	+ 6,0	s	Sereno.	
6 27	11,2	+ 1,4	n	Sereno.		27	8,1	+ 5,6	s s o	Ser. nebbia.	
7 27	5,9	+ 0,5	n o	Neb. nuv. ser.		27	7,8	+ 2,2	s x	Poc. piog. nev.	
8 27	8,8	+ 1,2	x s z	Nuv. ser.		27	10,3	+ 2,5	n n o	Nuvolo.	
9 27	11,9	- 0,5	z	Neve.		28	0,5	+ 0,3	n	Neve.	
10 28	0,3	+ 0,5	z	Nebbioso.		27	11,3	+ 3,6	n z	Nuv. poc. nev.	
11 27	10,0	+ 1,3	n z	Nuv. poc. nev.		27	8,8	+ 2,2	n z	Nuv. neve.	
12 27	5,8	+ 1,0	n o	Neve.		27	4,6	+ 2,4	o	Nuvolo.	
13 27	4,6	+ 1,0	s e	Ser. nebb.		27	6,0	+ 4,5	n*	Sereno.	
14 27	8,2	+ 1,0	n	Sereno.		27	9,1	+ 2,7	s o	Sereno.	
15 27	8,6	- 3,0	n o	Sereno.		27	7,5	+ 1,5	o	Sereno.	
16 27	6,6	- 3,5	n o	Sereno.		27	7,0	+ 2,3	o	Sereno.	
17 27	8,5	- 0,8	z	Nuv. neve.		27	8,8	+ 0,0	z	Nuvolo.	
18 27	10,0	- 2,4	o	Nuv. ser.		27	10,8	+ 0,5	s	Nuvolo.	
19 27	11,3	- 0,5	n n o	Neve.		27	11,0	+ 0,4	s o	Nuv. neve.	
20 27	9,0	- 1,4	o	Nuv. nevoso.		27	7,6	+ 2,0	s o	Nuv. ser.	
21 27	6,6	- 2,5	o	Nuv. neve.		27	5,8	+ 2,5	n o	Nev. nu. piog.	
22 27	4,3	+ 0,6	o	Nuv. nebbia.		27	3,8	+ 2,0	n	Nuv. nebb.	
23 27	5,0	- 4,0	z	Neb. solt. ser.		27	8,8	+ 3,0	z	Sereno.	
24 27	9,2	- 2,4	n	Ser. nebb.		27	9,4	+ 1,4	o	Sereno.	
25 27	9,6	- 3,6	o	Sereno.		27	11,6	+ 1,6	n o	Ser. nebb.	
26 28	2,0	- 3,0	n	Sereno.		28	2,8	+ 2,0	s	Sereno.	
27 28	1,8	- 3,5	o s o	Ser. nebbioso.		28	1,0	+ 2,5	s o	Nebb. ser.	
28 28	0,0	- 0,0	o	Nuv. ser.		27	11,8	+ 3,5	s o	Nuvolo.	

Altezza mass. del bar. poll. 28 lin. 2,8 Altezza mass. del term. + 6,0
 minima " 27 " 3,7 minima - 4,0
 media " 27 " 8,95 media + 1,10
 Quantità della pioggia e neve sciolta linee 27,57.

1827 MARZO.

MATTINA.					SERÀ.				
	Altezza del barometro. poll. lin.	Altezza del termometro Dir. del vento.	Stato del cielo.		Altezza del barometro. poll. lin.	Altezza del termometro Dir. del vento.	Stato del cielo.		
1	27 11,0	+ 1,7	N	Nuvolo.	27 10,4	+ 4,0	S O	Nuv. piovoso.	
2	27 9,8	+ 2,5	S O	Nuv. nebb.	27 8,8	+ 5,3	E	Nuvolo.	
3	27 8,2	+ 3,4	N O	Nebb. folta.	27 8,2	+ 5,4	SSE	Nuv. pioggia.	
4	27 8,0	+ 4,5	E	Nebb. pioggia.	27 5,0	+ 4,6	E	Piogg. nebb.	
5	27 5,1	+ 3,6	O	Piog..nuv. ser.	27 7,6	+ 7,8	S	Sereno.	
6	27 9,8	+ 3,0	E	Sereno.	27 9,4	+ 7,5	S O	Nuv. . . ser.	
7	27 9,2	+ 4,0	O	Nuv. rotto.	27 10,1	+ 6,5	S	Nuv. . . piogg.	
8	27 9,7	+ 5,7	S	Piov. nebb.	27 8,6	+ 8,8	N E	Nuv. ser.	
9	27 7,0	+ 6,5	E	Pioggia.	27 5,9	+ 10,3	S	Nuv. ser. nuv.	
10	27 4,7	+ 4,6	N E	Nu. rot... tuon.	27 7,1	+ 7,0	E	Nuv. ser. neb.	
11	27 10,0	+ 3,0	N O	Sereno.	27 11,0	+ 9,3	O	Ser. neb. ser.	
12	27 11,6	+ 3,6	N E	Ser. nebb.	27 9,8	+ 9,7	S O	Ser. neb. ser.	
13	27 9,3	+ 5,0	O	Ser. nebb.	27 7,6	+ 11,8	O	Sereno.	
14	27 6,6	+ 5,8	E	Nebb. ser.	27 5,0	+ 14,3	O	Sereno.	
15	27 8,0	+ 7,0	N O	Sereno.	27 5,9	+ 12,5	N O	Ser. neb. nuv.	
16	27 3,6	+ 5,5	NNO*	Nuv. ser.	27 7,5	+ 9,5	N*	Ser. nuv. ser.	
17	27 9,0	+ 4,2	N	Ser. nebb.	27 4,8	+ 8,5	E	Nebb. nuv.	
18	27 1,8	+ 4,0	O	Nuv. ser..	27 1,3	+ 8,0	NNO*	Ser. nuv.	
19	27 5,5	+ 4,0	N	Nuvolo.	27 8,4	+ 7,5	N	Nuvolo.	
20	27 10,3	+ 2,5	O	Sereno.	27 10,5	+ 9,5	N E	Sereno.	
21	27 10,8	+ 5,0	E	Nebb... ser.	27 9,1	+ 11,2	S O	Ser. neb. ser.	
22	27 8,7	+ 6,0	S O O	Ser. nebb.	27 8,2	+ 14,6	S O O*	Ser. neb. ser.	
23	27 9,0	+ 7,0	S O	Sereno.	27 8,8	+ 15,7	S O	Sereno.	
24	27 9,0	+ 7,5	O	Sereno.	27 9,2	+ 15,5	S O	Sereno.	
25	27 9,0	+ 9,0	N O	Nuv. rotto.	27 7,7	+ 15,5	S S O	Sereno.	
26	27 7,3	+ 7,5	O	Sereno.	27 9,0	+ 15,0	N*	Sereno.	
27	27 11,0	+ 5,2	N E	Sereno.	27 10,5	+ 10,7	S E	Ser. . . nebb.	
28	27 10,2	+ 6,0	E	Nuv. rotto.	27 9,7	+ 11,6	S O	Nuv. ser. nuv.	
29	27 9,2	+ 8,0	N E	Nuv. piovoso.	27 7,0	+ 9,0	N E	Piov. nuv.	
30	27 5,0	+ 8,5	S	Nuv. ser.	27 3,5	+ 12,0	N E	Ser. nebbioso.	
31	27 2,8	+ 7,8	O*	Nuv. ser.	27 6,9	+ 11,5	N*	Sereno.	

Altezza mass. del bar. poll. 27 lin. 11,6 Altezza mass. del term. + 15,7
minima " 27 " 1,3 minima + 1,7
media " 27 " 7,94 media + 7,52
Quantità della pioggia linee 24,130.

1827 APRILE.

MATTINA.						SERÀ.					
Giorni.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.		Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.		
1 27	7,0	+ 4,7	N N O*	Sereno.		27	8,3	+ 10,3	N*	Sereno.	
2 27	9,2	+ 3,5	N N O	Sereno.		27	9,4	+ 10,5	N O	Sereno.	
3 27	10,0	+ 3,0	N E E	Sereno.		27	9,5	+ 11,5	S O	Sereno.	
4 27	10,8	+ 5,5	E	Sereno.		27	11,0	+ 13,2	E	Sereno.	
5 28	0,0	+ 6,5	N	Sereno.		27	11,8	+ 14,0	S O	Ser. nchh.	
6 28	0,5	+ 8,5	N N E	Sereno.		27	11,7	+ 15,0	S	Sereno.	
7 27	11,2	+ 8,5	N	Sereno.		27	9,5	+ 15,5	S O	Sereno.	
8 27	9,7	+ 8,5	N E	Sereno.		27	10,0	+ 16,0	E	Ser. nuv.	
9 28	0,0	+ 10,0	N E	Nuv. rotto.		27	11,4	+ 14,7	E	Nuv. ser.	
10 27	11,2	+ 10,3	E	Nuvolo.		27	10,0	+ 13,3	N N E	Nuv... ser.	
11 27	10,0	+ 7,5	S O	Sereno.		27	9,8	+ 14,6	N O	Sereno.	
12 27	10,7	+ 7,6	N	Sereno.		27	11,0	+ 15,0	S O	Sereno.	
13 27	11,4	+ 10,0	O	Nuv. ser.		27	11,0	+ 16,6	S O	Neb. ser. nuv.	
14 27	10,7	+ 10,0	N N O	Nuv. ser. nuv.		27	9,6	+ 14,0	N	Nuvolo.	
15 27	8,9	+ 9,6	N O	Nuv. ser.		27	8,2	+ 10,7	E	Nuv. piogg.	
16 27	8,2	+ 8,5	O	Nuv. ser.		27	8,0	+ 15,0	S	Ser. tem. piog.	
17 27	7,8	+ 7,4	E N	Sereno.		27	7,3	+ 13,3	E	Nuv. tem. piog.	
18 27	8,0	+ 6,6	N	Sereno.		27	7,8	+ 13,3	S O	Sereno.	
19 27	8,0	+ 8,0	E E S	Ser. nebb.		27	7,5	+ 13,0	N	Nuvolo.	
20 27	7,3	+ 9,0	E	Nuvolo.		27	7,2	+ 11,5	E N E	Nuv. piogg.	
21 27	6,6	+ 9,3	N E	Pioggia.		27	6,3	+ 10,6	E*	Pioggia.	
22 27	5,8	+ 9,0	N E	Piov. nuv.		27	4,2	+ 11,7	E	Nu. piogg. tuon.	
23 27	4,7	+ 9,4	S O	Ser. nebbioso.		27	5,0	+ 12,8	S	Ser. nuv.	
24 27	4,6	+ 7,7	N E	Pioggia.		27	6,0	+ 10,4	O	Nuv. ser.	
25 27	7,7	+ 6,4	N N O	Sereno.		27	8,8	+ 13,0	S O ...	Se.te. piogg. n.r.	
26 27	9,2	+ 9,0	S	Ser. neb. ser.		27	9,4	+ 14,0	S O	Sereno.	
27 27	10,0	+ 9,0	N E	Sereno.		27	10,4	+ 15,5	O	Sereno.	
28 27	11,0	+ 9,0	N E	Sereno.		27	10,7	+ 15,3	S	Sereno.	
29 27	11,0	+ 10,8	N	Nuv. ser.		27	10,5	+ 16,0	S O	Sereno.	
30 27	10,8	+ 10,0	N	Sereno.		27	10,3	+ 17,5	O	Sereno.	

Altezza mass. del bar. poll. 28 lin. 0,5 Altezza mass. del term. + 17,5
minima " 27 " 4,2 minima + 3,5
media " 27 " 8,96 media + 10,76
Quantità della pioggia linee 67,96.

1827 MAGGIO.

MATTINA.						SERÀ.					
Giorni.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.		Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.		
1 27	10,3	+11,0	o	Sereno.		9,2	+17,5	s o	Sereno.		
2 27	8,8	+11,0	o	Sereno.		8,2	+18,7	s	Sereno.		
3 27	9,4	+12,3	n	Ser. la notte prec. piogg.		9,0	+17,4	s e	Sereno.		
4 27	9,0	+12,0	n e	Sereno.		9,2	+17,0	s	Ser... temp.		
5 27	9,2	+12,5	n o	Nuv. ser.		9,0	+17,7	s o	Ser. nebb.		
6 27	8,8	+12,0	n o	Sereno.		7,0	+17,5	s e	Nebb. nuv.		
7 27	6,4	+13,5	o	Sereno.		6,0	+18,0	o	Se.te.gr.piog.		
8 27	7,0	+10,7	e	Ser. piogg. ser.		7,0	+15,4	s	Nuv. ser.		
9 28	8,0	+11,0	e	Neb. ser. nuv.		8,2	+15,0	s...e	Piov. ser. nuv.		
10 27	7,7	+11,3	e*	Pioggia.		6,5	+12,5	e*	Pioggia.		
11 27	6,7	+11,7	e*	Nuv. ser.		8,0	+16,7	s...o	Temp. piog.		
12 27	7,3	+11,3	o n	Piog. nu. piog.		5,8	+11,0	n	Nuv. pioggia.		
13 27	5,0	+11,5	e	Nuv. piogg.		6,7	+13,6	s s o	Piog... nuv.		
14 27	7,2	+11,5	n	Nuv. neb. rot.		7,8	+15,8	s	Nuv. ser.		
15 27	8,2	+10,5	e n	Sereno.		8,0	+16,0	s o	Ser. nuv. piov.		
16 27	8,2	+12,0	n e e	Nuy. rott. ser.		8,2	+17,0	s o	Nu. pio. se. nu.		
17 27	8,2	+12,0	n	Nu.la not. pio.		9,0	+16,0	o	Nuv. ser.		
18 27	9,0	+11,5	o n	Sereno.		9,0	+18,0	o	Sereno.		
19 27	9,0	+13,2	e	Ser. nebbioso.		8,8	+19,0	e	Ser. neb.. tem.		
20 27	8,6	+13,5	n e	Neb. ser. nuv.		8,3	+19,0	s e	Nuv. tem.piog.		
21 27	8,3	+14,0	n e	Nuv. rotto.		9,0	+18,0	e**	Temp. piogg.		
22 27	9,6	+11,8	s o	Sereno.		9,0	+17,6	s e	Nuv. ser.		
23 27	8,7	+13,0	s o	Neb. nuv. ser.		6,6	+18,5	s o	Nuv. ser.		
24 27	6,5	+12,0	n o	Sereno.		5,6	+19,7	s	Neb. nuv. ser.		
25 27	4,5	+13,5	e	Ne. pio. tuo. se.		5,2	+16,0	n..n e	Te.nu.pi.se.nu.		
26 27	6,0	+10,0	s o	Sereno.		6,6	+16,6	s e	Nuv. tem.piog.		
27 27	7,2	+11,5	e	Piogg. nuv.		8,0	+16,3	s s e	Se. nu.te.pi.se.		
28 27	8,8	+9,8	n n o	Sereno.		9,2	+17,5	s o	Sereno.		
29 27	10,0	+12,5	e	Ser. nebb.		9,6	+19,0	s	Sereno.		
30 27	9,8	+13,0	n n o	Sereno.		9,3	+20,3	s	Sereno.		
31 27	9,3	+14,5	n	Sereno.		9,0	+21,7	s s e	Ser. nuv. ser.		

Altezza mass. del bar. poll. 27 lin. 10,3 Altezza mass. del term. + 21,7
minima " 27 " 5,0 minima + 9,8
media " 27 " 8,00 media + 14,54
Quantità della pioggia linee 93,76.

1827 GIUGNO.

MATTINA.							SERÀ.						
Giorni.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro.	Direzione del vento.	Stato del cielo.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro.	Direzione del vento.	Stato del cielo.					
1 27	9,0	+16,0	n o	Ser. nuv. ser.	27	8,8	+22,0	•	Sereno.				
2 27	8,7	+16,0	o	Sereno.	27	8,5	+22,3	s o	Sereno.				
3 27	8,5	+15,8	n q	Sereno.	27	7,3	+21,8	s	Ser. nuv. neb.				
4 27	6,3	+15,8	z	Nu. ne. pie. tu.	27	7,0	+18,0	s	Nuv. rotto.				
5 27	7,3	+13,5	o	Ser. nuv.	27	7,7	+19,1	o	Nuv. ser.				
6 27	2,5	+13,1	n	Ser. nuv.	27	5,5	+19,0	s z	Ser. nuv.				
7 27	4,0	+13,3	s o	Ser. nuv. piov.	27	4,6	+14,8	z	Nuv. piov.				
8 27	5,4	+12,9	n o	Sereno.	27	6,4	+17,1	s o	Nuvolo.				
9 27	6,7	+13,1	s	Nuvolo.	27	7,0	+17,0	s	Ser. nuv.				
10 27	7,6	+15,0	n s	Nuv. piov.	27	6,6	+19,3	s e	Se. temp. piog.				
11 27	9,5	+13,0	z	Ser. nuv.	27	8,0	+17,7	z	Sereno.				
12 27	7,8	+12,5	z	Piog.. . ser.	27	7,9	+17,0	o	Ser. nuv.				
13 27	8,0	+14,0	z	Ser. nuv. ser.	27	8,8	+19,5	z	Sereno.				
14 27	9,0	+14,6	n z	Sereno.	27	8,0	+21,0	s o	Ser. nuv. ser.				
15 27	8,0	+15,5	n z	Sereno.	27	7,0	+21,5	s o	Ser. nebbioso.				
16 27	7,3	+16,0	n n o	Nuv. ser. nuv.	27	7,3	+20,8	s o	Nebbioso.				
17 27	7,6	+16,0	n o	Poc. pio. nu se.	27	7,9	+21,0	s	Nuv. temp.				
18 27	8,0	+16,0	o	Nuv. rot. ser.	27	8,0	+20,0	z	Neb. ser. nuv.				
19 27	8,3	+16,3	n n o	Neb. rot. nuv.	27	8,3	+20,6	z	Ne. se. poc. pi.				
20 27	8,3	+17,0	n n o	Ser. nebb.	27	8,5	+20,5	n	Nuv. temp.				
21 27	9,0	+16,5	n o	Sereno.	27	9,0	+22,0	n o	Nuv. ser.				
22 27	9,3	+17,0	o	Sereno.	27	8,8	+22,6	s o	Ser. nebb.				
23 27	9,0	+17,5	z	Nuvolo.	27	8,5	+22,5	z	Ser. nuv. ser.				
24 27	8,8	+16,7	n e	Nuv. ser.	27	8,7	+21,5	s *	Sereno.				
25 27	9,0	+16,5	z	Ser. nebb.	27	8,5	+21,6	s e *	Ser. nuv.				
26 27	8,5	+15,5	z	Nuv. tem. piog.	27	7,8	+18,7	s o	Nuv. tem. piog.				
27 27	8,0	+13,8	n	Sereno.	27	8,2	+18,6	z *	Nu. te. pio. ser.				
28 27	9,2	+11,7	n e	Sereno.	27	9,7	+19,5	s o	Sereno.				
29 27	10,0	+14,0	n	Sereno.	27	10,0	+21,0	s	Sereno.				
30 27	10,0	+15,0	n	Sereno.	27	9,4	+22,3	e	Ser. nebb. nuv.				

Altezza mass. del bar. poli. 27 h. 10,0 Altezza mass. del term. + 22,6
 minima " 27 " 4,0 minima + 11,7
 media " 27 " 8,025 media + 15,834
 Quantità della pioggia hmece 21,120.

1827 LUGLIO.

Giorni.	MATTINA.				SERÀ.			
	Altezza del barometro. poll. lin.	Altezza del termometro. °	Direzione del vento.	Stato del cielo.	Altezza del barometro. poll. lin.	Altezza del termometro. °	Direzione del vento.	Stato del cielo.
1 27	9,8	+17,5	S O	Nuv. ser.	27	9,7	+22,7	S Sereno.
2 27	10,5	+17,3	N..E	Sereno.	27	10,8	+23,8	S Sereno.
3 27	10,8	+18,5	N	Sereno.	27	9,8	+25,2	Ser. nuv.
4 27	10,2	+17,3	O	Sereno.	27	10,4	+24,4	Sereno. ser.
5 27	11,0	+18,0	N E	Nuv.tem.piog.	27	11,0	+20,2	Sereno.
6 27	11,0	+16,3	N E	Nuv...piogg.	28	0,0	+16,7	N Nuv. rot. piog.
7 28	0,0	+15,0	N N O	Piog..nuv.ser.	27	10,3	+20,8	O Ser. nebb.
8 27	10,5	+16,6	N O	Nuv. temp.	27	10,5	+22,7	S S S E Ser. neb. ser.
9 28	0,0	+17,0	N	Nuv. ser.	27	11,5	+21,6	S S Sereno.
10 27	11,3	+17,5	N E	Sereno.	27	10,0	+23,3	N O Sereno.
11 27	9,7	+19,0	O	Sereno.	27	9,0	+24,5	S Sereno.
12 27	8,8	+18,7	O	Sereno.	27	8,2	+24,3	S...O Sereno.
13 27	9,0	+19,0	E	Nuv. neb. ser.	27	9,3	+22,7	E Sereno.
14 27	10,0	+18,0	E	Neb. nuv. ser.	27	9,3	+23,3	S Nebb. ser.
15 27	10,0	+19,0	E	Sereno.	27	10,0	+24,6	S E.... no* Tem. pio.
16 27	9,0	+16,4	N E	Sereno.	27	9,3	+23,2	S O S* Tem. gr. pieg.
17 27	9,3	+16,5	N	Nuv.tem.piog.	27	9,0	+16,4	O Nuv... ser.
18 27	9,0	+14,7	S O	Nebb. ser.	27	9,0	+21,6	O Sereno.
19 27	10,0	+15,0	E	Sereno.	27	10,0	+21,8	S S E Sereno.
20 27	10,2	+16,0	O	Sereno.	27	9,5	+22,5	S Sereno.
21 27	9,2	+17,0	E	Sereno.	27	8,8	+22,5	O Ser. nuv. ser.
22 27	9,5	+15,5	N E	Sereno.	27	9,7	+22,4	N E Ser. nuv. ser.
23 27	9,7	+17,5	N N E..	S O* Te. pi. gr.	27	10,0	+21,8	S S E* Temp. piog.
24 27	10,3	+15,4	E	Sereno.	27	10,2	+21,5	S Sereno.
25 27	10,3	+16,0	N	Sereno.	27	10,0	+22,7	E Sereno.
26 27	10,6	+17,4	N E	Sereno.	27	10,7	+23,7	S O Ser. nebb.
27 27	11,0	+18,5	E	Sereno.	27	10,6	+24,5	O Sereno.
28 27	11,0	+19,0	N O	Sereno.	27	11,5	+25,3	E Sereno.
29 28	0,0	+19,5	N E	Sereno.	27	10,7	+25,3	O Sereno.
30 27	10,9	+20,0	E	Sereno.	27	9,8	+26,0	S Ser. nuv. ser.
31 27	10,2	+20,4	O	Sereno.	27	10,8	+26,0	O* Nuv. temp.

Altezza mass. del bar. poll. 28 lin. 0,0 Altezza mass. del term. + 26,0
 minima " 27 " 8,2 minima + 14,7
 media " 27 " 10,0 media + 20,12
 Quantità della pioggia linee 57,72.

1827 AGOSTO.

MATTINA.							SERÀ.						
Giorni.		Altezza del barometro.	Altezza del termometro.	Direzione del vento.	Stato del cielo.			Altezza del barometro.	Altezza del termometro.	Direzione del vento.	Stato del cielo.		
1	27	11,7	+17,0	N	Sereno.			27	11,0	+23,8	N E	Sereno.	
2	27	10,8	+18,5	N O	Nebb. ser.			27	10,2	+24,0	E	Sereno.	
3	27	10,1	+18,0	E	Sereno.			27	9,6	+24,5	S O	Sereno.	
4	27	9,8	+20,0	E	Ser. nuv. ser.			27	9,1	+25,0	S	Ser. nch. nuv.	
5	27	9,8	+19,0	N E	Nu. poc. piog.			27	9,2	+25,0	E NO	Se. tem. pi. dir.	
6	27	9,6	+17,7	S O	Tem. pr. piog.			27	9,2	+20,7	S O O	Sereno.	
7	27	9,7	+15,6	N E	Sereno.			27	10,0	+21,3	E.... S	Sereno.	
8	27	10,2	+15,8	N E	Sereno.			27	10,0	+22,0	S E	Sereno.	
9	27	10,0	+17,0	N E	Sereno.			27	9,2	+22,6	S	Ser. nebb.	
10	27	9,5	+17,0	S O	Te. po. pi. ser.			27	8,0	+21,6	S O	Sereno.	
11	27	7,6	+17,5	N E	Nuv. piog.			27	6,0	+22,5	S S O	Nu. te. po. piog.	
12	27	6,3	+15,0	E	Ser. neb. ser.			27	7,2	+20,4	O	Sereno.	
13	27	7,6	+13,0	E	Sereno.			27	8,0	+20,3	S O	Sereno.	
14	27	9,0	+13,7	N E	Sereno.			27	9,0	+20,0	E	Sereno.	
15	27	9,2	+13,6	N	Sereno.			27	8,0	+21,6	S S E	Nuv. rotto.	
16	27	7,6	+16,5	E	Piog. pr. nu. pi.			27	7,0	+16,8	E	Nuv. piog.	
17	27	8,5	+15,5	E	Nuv. neb. ser.			27	9,5	+20,4	E	Nuv. ser.	
18	27	10,3	+16,0	S	Nuv. piogg.			27	11,0	+16,5	S O	Temp. piogg.	
19	27	10,0	+15,6	O	Nuv. ser.			27	9,4	+19,5	S O	Sereno.	
20	27	9,4	+16,5	N E	Ser. nebb.			27	9,0	+22,0	N E	Sereno.	
21	27	8,8	+16,7	E	Tem. pr. pi. se.			27	8,0	+21,5	N N O	Ser. nuv.	
22	27	7,8	+16,4	N N O	Sereno.			27	7,6	+21,3	O	Nu. te. po. piog.	
23	27	7,5	+15,5	O	Pio. pr. nu. ser.			27	7,4	+18,0	S	Nuv. tem. piog.	
24	27	7,0	+12,6	N N O	Sereno.			27	10,0	+18,0	S S O	Ser. nuv. ser.	
25	27	9,0	+12,3	N	Sereno.			27	7,0	+18,8	S	Nuv. tem. piog.	
26	27	6,9	+12,0	N N E	Sereno.			27	6,3	+16,7	N O	Nuv. ser. nuv.	
27	27	7,8	+10,0	E	Ser. neb. ser.			27	7,8	+17,5	N E	Nuv. ser. nuv.	
28	27	8,0	+12,0	E	Nuv. ser.			27	9,0	+18,0	S E	Sereno.	
29	27	9,8	+11,0	N	Sereno.			27	10,5	+18,6	S O	Ser. nuv. ser.	
30	27	11,2	+11,5	N E	Nebb. ser.			27	10,8	+17,5	O	Sereno.	
31	27	10,6	+13,0	E	Nuv. piog.			27	10,8	+14,8	S E	Nuvolo.	

Altezza mass. del bar. poll. 27 lin. 11,7 Altezza mass. del term. + 25,0
minima " 27 " 6,0 minima + 10,0
media " 27 " 8,97 media + 17,79
Quantità della pioggia linee 57,410.

1827 SETTEMBRE.

Giorni.	MATTINA.				SERÀ.			
	Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.
1 28	0,0	+12,5	s	Piog. pre. nuv.	28	0,7	+15,0	Nuvolo.
2 28	0,6	+12,0	N O	Nuv. rotto.	27	11,9	+17,0	Sereno.
3 27	11,3	+12,0	O N	Sereno.	27	10,5	+17,0	Nuv...piogg.
4 27	10,3	+13,5	S E	Nuv. rott. ser.	27	10,0	+17,0	Te.pio. ser.nu.
5 27	10,0	+11,0	O	Sereno.	27	9,8	+17,8	Sereno.
6 27	10,2	+12,5	E	Sereno.	27	10,3	+18,8	Sereno.
7 27	10,6	+13,0	N	Sereno.	27	10,3	+19,0	Ser. nuv.
8 27	10,2	+13,2	N	Nuv. ser.	27	9,8	+17,6	Nuv.tem. piov.
9 27	10,2	+13,0	N E	Nuv. piogg. ser.	27	10,0	+18,5	E Sereno.
10 28	0,8	+14,0	E	Ser. nuv. ser.	28	0,8	+18,0	Sereno.
11 28	1,0	+13,0	E N E	Ser. nebbioso.	28	0,8	+18,0	Sereno.
12 28	0,0	+12,0	N	Sereno.	27	11,5	+18,5	Ser. neb. ser.
13 27	11,2	+13,0	N O	Sereno.	27	11,0	+19,0	Sereno.
14 27	10,2	+14,5	E N	Nuv.tem. piogg.	27	9,8	+14,0	Ser.nuv..piogg.
15 27	10,0	+12,0	O	Piog.pr. nu. pi.	27	10,0	+15,4	Nuv. ser.
16 27	10,2	+11,0	O	Sereno.	27	10,0	+17,0	Sereno.
17 27	10,8	+12,2	N N O	Tem.pr. nu.se.	27	11,5	+17,5	Sereno.
18 27	11,8	+11,7	N	Nuv. ser.	27	10,8	+17,6	Sereno.
19 27	9,8	+12,0	N	Sereno.	27	8,0	+18,0	Se. neb. nu. se.
20 27	6,5	+11,0	N .. E	T.pr.pi.gr. nu.	27	5,6	+15,0	Nuv. ser.
21 27	6,0	+8,0	N E	Nuv. ser.	27	7,5	+14,0	Sereno.
22 27	8,8	+8,0	N	Sereno.	27	8,8	+14,8	Sereno.
23 27	9,0	+9,0	N	Ser. nebbioso.	27	9,3	+15,2	Nebb. ser.
24 27	10,0	+9,7	N	Sereno.	27	10,0	+15,7	Sereno.
25 27	10,3	+11,0	E	Ser. nebb.	27	10,2	+17,0	Nebb. ser.
26 27	9,7	+13,0	E	Nuv.rott.piov.	27	9,0	+14,4	Nuvolo.
27 27	9,0	+12,8	N E	Nuv. piov.	27	9,0	+14,7	Nuv. piogg.
28 27	9,0	+12,8	E	Piog. pr...nuv.	27	9,8	+15,5	Piog. nuv.ser.
29 27	8,6	+15,0	E	Piog. nuv. tuo.	27	8,7	+16,0	Nuv. rott. tuo.
30 27	8,8	+10,0	O N	Sereno.	27	9,0	+15,0	Ser. nuv.

Altezza mass. del bar. poll. 28 lin. 1,0 Altezza mass. del term. + 19,0
 minima > 27 " 5,6 minima + 8,0
 media > 27 " 10,98 media + 14,25
 Quantità della pioggia linee 51,89.

1827 OTTOBRE.

MATTINA.						SERÀ.					
Giorni.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.		Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.		
1	poll. 9,5	+10,7	•	Nebb. ser.		poll. 10,0	+15,0	s	Nuv. rotto.		
2	10,3	+11,5	N E	Nuv. neb. ser.		11,0	+15,6	s o	Nuv. rotto.		
3	11,0	+11,8	N	Nuv. rotto.		11,0	+15,7	s s z	Nuv. ser.		
4	11,0	+11,4	E	Nuv. rott. ser.		10,7	+16,3	s s z	Ser.nu.te. pio.		
5	10,2	+11,7	N O	Nuv. ser. nuv.		10,0	+15,2	s...s	Nuv..po. piog.		
6	27 9,5	+11,5	N O	Nuv. ser.		27 9,4	+15,0	s....s	Ser. nuv.		
7	27 9,6	+11,5	E	Nuvolo.		27 10,0	+14,3	s	Nuv. ser. neb.		
8	27 10,0	+10,9	O	Ser...neb. nuv.		27 9,0	+14,5	s o	Ser. nuv. ser.		
9	27 9,0	+9,8	N	Ser. nuv. ser.		27 9,0	+14,2	s	Nuv. rotto.		
10	27 9,0	+11,0	E	Ser. nebbia.		27 9,3	+14,0	s E	Neb. nuv. ser.		
11	27 8,2	+12,0	E*	Piov. nuv.		27 6,6	+14,8	E*	Nuv. rotto. ser.		
12	27 5,4	+12,5	E	Ser. neb. f. ser.		27 6,2	+16,0	s o	Sereno.		
13	27 7,5	+11,7	SSE	Ser. nuv.		27 7,0	+15,0	s	Nuvolo.		
14	27 6,0	+12,0	E	Nuv.... ser.		27 7,0	+16,0	s o	Ser. nebbioso.		
15	27 8,6	+11,2	N E	Se. nu. neb. pi.		27 9,5	+12,3	N E	Nuv. ser.		
16	27 11,0	+10,5	N.E.	Nuv. rotto ser.		27 11,3	+14,0	N	Nuvolo.		
17	27 11,0	+9,5	N	Sereno.		27 10,4	+14,0	N	Sereno.		
18	27 10,0	+11,0	S	Nuv. neb. ser.		27 9,7	+15,0	N E	Ser. nuv.		
19	27 9,2	+11,0	E	Nuv. ser.		27 9,0	+15,0	s E	Nuv. piov.		
20	27 8,2	+11,6	E	Nuv. piov.		27 6,0	+12,2	N E	Piog. nu. piog.		
21	27 5,8	+11,0	O	Nuv. nebb.		27 5,8	+14,5	s	Nuv. ser.		
22	27 5,8	+10,5	N	Nuv. neb. ser.		27 6,0	+14,5	s E	Nu. se. nu. pio.		
23	27 6,0	+11,0	N E E	Nuv. ser.		27 6,8	+14,5	s	Nu. lam. po. pi.		
24	27 7,0	+11,0	N E	Nuv. neb. ser.		27 8,0	+13,0	s o	Sereno.		
25	27 9,6	+ 8,0	N O	Sereno.		27 9,8	+14,3	O	Sereno.		
26	27 10,8	+ 8,5	N E	Sereno.		27 11,2	+13,0	s o	Sereno.		
27	27 10,8	+ 7,0	O	Sereno.		27 9,7	+12,0	O	Sereno.		
28	27 7,8	+ 9,0	S O	Nuvolo.		27 7,0	+10,0	E	Piog... piov.		
29	27 5,7	+10,0	S	Nuvolo.		27 4,8	+12,0	S	Nuv. ser.		
30	27 7,0	+10,0	E*	Neb. nuv. ser.		27 8,3	+10,0	S E	Ser. nuv. ser.		
31	27 7,6	+ 4,3	N E	Neb. ser. nuv.		27 6,0	+ 8,0	E	Ser. nuv. rotto.		

Altezza mass. del bar. poll. 27 lin. 11,3 Altezza mass. del term. 16,3

minima . . . » 27 » 4,8 minima . . . + 4,3

media " 27 » 8,54 media + 12,16

Quantità della pioggia linee 21,73.

1827 NOVEMBRE.

Giorni.	MATTINA.				SERÀ.			
	Altezza del barometro.	Altezza del termometro.	Direzione del vento.	Stato del cielo.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro.	Direzione del vento.	Stato del cielo.
1 27	7,0	+ 3,3	N O	Sereno.	27	5,5	+ 10,2	N*
2 27	7,0	+ 5,3	O	Sereno.	27	6,4	+ 10,0	Nuv... ser.
3 27	7,0	+ 4,0	N NE	Sereno.	27	9,0	+ 9,6	N N O
4 27	11,0	+ 3,5	O	Sereno.	27	11,8	+ 8,5	S O
5 28	0,5	+ 2,5	N O	Sereno.	28	1,0	+ 8,0	Ser. nebbioso.
6 28	0,7	+ 2,0	O	Sereno.	27	10,8	+ 9,5	Ser. nebb.
7 27	8,0	+ 2,0	S O	Ser. nebb.	27	7,5	+ 9,5	nebb. ser.
8 27	8,7	+ 5,6	N E	Nuv. rotto.	27	8,2	+ 8,0	Nuv.... ser.
9 27	8,7	+ 3,0	N	Ser. nebbia.	27	9,0	+ 7,5	Nuv. neb. ser.
10 27	8,6	+ 4,2	N N O	Nuv. neb. ser.	27	7,8	+ 8,3	Sereno.
11 27	8,8	+ 3,0	E	Nebbia.	27	9,3	+ 7,6	S E
12 27	7,5	+ 2,8	E	Sereno.	27	8,0	+ 7,3	Sereno.
13 27	6,8	+ 0,7	E	Ser. nebbia.	27	7,7	+ 7,0	E*
14 27	6,8	+ 0,6	O	Sereno.	27	5,3	+ 4,8	Nuv.... ser.
15 27	4,6	+ 1,8	N E	Nuvolo.	27	6,2	+ 4,5	Nuv. poc. piog.
16 27	7,8	+ 4,0	O	Nuv. piòv.	27	10,7	+ 6,0	S O
17 27	11,2	+ 4,7	O	Nuv. rotto.	27	11,7	+ 7,6	S O
18 27	11,8	+ 2,0	N	Sereno.	27	11,8	+ 6,6	Sereno.
19 27	11,5	+ 2,5	N O	Sereno.	27	11,5	+ 7,0	S E
20 27	11,3	+ 2,0	O	Sereno.	27	10,6	+ 6,0	S O
21 27	9,0	+ 1,0	O	Sereno.	27	8,0	+ 5,3	Sereno.
22 27	2,0	+ 4,0	N E	Nuvolo.	27	5,8	+ 4,5	Nuv. piogg.
23 27	5,6	+ 2,5	O	Nuv. ser.	27	3,2	+ 5,5	N O*
24 27	3,3	+ 0,3	N O	Sereno.	27	5,6	+ 4,0	N N E
25 27	8,7	+ 1,0	N O	Sereno.	27	10,6	+ 4,0	Sereno.
26 27	11,0	+ 0,7	N	Nuv. ser.	28	0,0	+ 2,5	Sereno.
27 28	0,8	- 2,0	S O	Sereno.	27	11,0	+ 2,0	Sereno.
28 27	9,2	- 1,6	E	Sereno.	27	10,0	+ 2,5	Sereno.
29 27	9,8	+ 0,6	S	Nuvolo.	27	8,0	+ 1,5	Nu.neb.p. nev.
30 27	7,2	+ 0,0	O	Nuv. ser. neb.	27	7,0	+ 1,8	S S O Nebbioso.

Altezza mass. del ber. poll. 28 lin. 1,0 Altezza mass. del term. + 10,2
 minima " 27 " 3,2 minima . . . - 2,0
 media " 27 " 8,73 media + 4,30

Quantità della pioggia linee 3,850.

1827 DICEMBRE.

Giorni.	MATTINA.				SERÀ.			
	Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.	Altezza del barometro.	Altezza del termometro	Direzione del vento.	Stato del cielo.
1 27	6,8	- 1,0	s s o	Nebbia.	27	5,5	+ 1,5	Neb. piov.
2 27	3,7	+ 1,5	o	Nuv. nebbia.	27	4,0	+ 2,0	Nebbia.
3 27	5,0	+ 1,5	z	Nuvolo.	27	7,0	+ 2,5	Nuvolo.
4 27	10,4	+ 1,0	n o	Nuvolo.	27	11,0	+ 1,5	Nuv. nebbia.
5 27	11,0	- 1,0	s o	Sereno.	27	11,0	+ 6,7	Sereno.
6 27	10,3	+ 0,6	z	Nebbia.	27	8,9	+ 3,0	Nuv. nebbia.
7 27	7,6	+ 3,0	z	Nuv. piov.	27	11,0	+ 5,0	Sereno.
8 28	0,3	+ 1,0	o	Sereno.	28	0,0	+ 4,0	Ser. neb. nuv.
9 27	11,0	+ 0,6	s z	Ser. neb. ser.	27	11,0	+ 2,6	Sereno.
10 27	11,0	+ 1,5	z	Ser. nebbia.	27	10,8	+ 3,6	Ser. neb. nuv.
11 27	9,8	- 0,6	o	Nebbia.	27	9,2	+ 0,6	Nebbia.
12 27	9,0	- 1,0	n o	Nebbia.	27	8,8	+ 1,0	Nebbia.
13 27	8,7	+ 1,0	z	Nuv. piogg.	27	8,2	+ 1,8	Pioggia.
14 27	10,0	+ 1,6	s o	Nuvolo.	28	0,0	+ 3,6	Nuv. neb. piog.
15 28	0,3	+ 2,5	s	Nuvolo.	28	1,0	+ 4,5	Nuvolo.
16 28	1,0	+ 3,8	s o	Nuv. nebbia.	28	0,2	+ 3,8	Nuv. nebbia.
17 28	0,0	+ 2,5	n o	Nuvolo.	28	0,0	+ 3,0	Nuv....piog.
18 28	0,0	+ 3,5	n	Nuv. ser.	27	11,8	+ 5,8	Sereno.
19 27	11,6	+ 1,0	n	Sereno.	27	11,7	+ 4,0	Sereno.
20 27	11,0	- 0,0	s o	Sereno.	27	10,8	+ 3,0	Sereno.
21 27	10,0	+ 0,5	z	Ser. nuv.	27	10,0	+ 3,0	Ser. nuvolo.
22 27	9,4	+ 0,2	s o	Neb. ser. nuv.	27	8,5	+ 3,0	Nuvolo.
23 27	7,0	- 0,6	n z	Nuv. nebb.	27	8,0	+ 2,0	Nebb. ser.
24 27	9,2	+ 6,5	n	Sereno.	27	10,6	+ 7,2	Sereno.
25 27	10,8	+ 1,7	o n	Sereno.	28	0,0	+ 7,8	Sereno.
26 28	1,0	+ 6,0	n	Sereno.	28	2,0	+ 6,4	Sereno.
27 28	2,4	+ 1,0	n z	Sereno.	28	2,0	+ 4,3	Sereno.
28 28	1,2	- 0,0	s	Sereno.	28	0,2	+ 3,6	Nebb. ser.
29 28	0,0	- 0,0	s o	Sereno.	27	10,5	+ 2,0	Sereno.
30 27	11,3	- 0,6	s o	Sereno.	28	0,0	+ 3,0	Sereno.
31 27	11,8	- 1,6	s o	Sereno.	27	10,0	+ 2,7	Sereno.

Altezza mass. del bar. poll. 28 lin. 2,4 Altezza mass. del term. + 7,8
minima " 27 " 3,7 minima - 1,6
media " 27 " 10,20 media + 2,33
Quantità della pioggia linee 16,90.



